

レジメン名	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	診療科・区分
ベムプロリズマブ q3w	1	20	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	0 共通
M S I – H ニボルマブ q2w	1	13	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m L * :240m g Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	0 共通
FEC100	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :10m l Day1 エビルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):100m g /m l Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :500m g /m l Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :500m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
FEC100 (E≤120mg)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :10m l Day1 エビルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):100m g /m l Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :500m g /m l Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :500m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
EC90	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :10m l Day1 エビルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):90m g /m l Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
EC90 (E≤120mg)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :10m l Day1 エビルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):90m g /m l Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
EC75	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :10m l Day1 エビルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):75m g /m l Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
ddFEC100	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :10m l Day1 エビルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):100m g /m l Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :500m g /m l Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :500m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
ddEC90	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :10m l Day1 エビルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):90m g /m l Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
ddPTX	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:175m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	1 乳腺外科
AC	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :60m g /m l Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科

ddAC	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):1A Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :60m g /m l Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
Epirubicin単独	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):1A Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :10m l Day1 エピルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):60m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
wPTX 初回	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
wPTX 2回目～	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
wPTX+Carbo (5AUC) 初回	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /m l Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day8 Day15 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day8 Day15	1 乳腺外科
wPTX+Carbo (5AUC) 2回目～	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /m l Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day8 Day15	1 乳腺外科
DTX	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l 「HK」:1袋 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	1 乳腺外科
TC (DTX+CPA)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m l Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
TCb (DTX+Cb)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m l Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
TAC	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m l Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :500m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50m g /m l Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
nabPTX q3w	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260mg/m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
w-nabPTX+前投薬	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科

w-nabPTX（前投薬なし）	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/㎡ Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
w-nabPTX+前投薬（28日レジメン）	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/㎡ Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day15	1 乳腺外科
w-nabPTX（前投薬なし）（28日レジメン）	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/㎡ Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day15	1 乳腺外科
Eribulin+前投薬（7日レジメン）	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg（リン酸塩2mg相当）:2A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g「日医工」:1.4mg/㎡ Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
Eribulin 〔前投薬なし〕（7日レジメン）	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g「日医工」:1.4mg/㎡ Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
Eribulin+前投薬（21日レジメン）	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg（リン酸塩2mg相当）:2A Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g「日医工」:1.4mg/㎡ Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
Eribulin 〔前投薬なし〕（21日レジメン）	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g「日医工」:1.4mg/㎡ Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
Vinorelbine+前投薬	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg（リン酸塩2mg相当）:2A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/㎡ Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
Vinorelbine（前投薬なし）	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/㎡ Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
Vinorelbine+前投薬（21日レジメン）	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg（リン酸塩2mg相当）:2A Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/㎡ Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
Vinorelbine（前投薬なし）（21日レジメン）	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/㎡ Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
Carboplatin 6AUC	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 カルボプラチン注射液（オーダー用）:0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
Carboplatin 2AUC	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 カルボプラチン注射液（オーダー用）:0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
Gemcitabine	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 ゲムシタビン点滴静注液「N K」（オーダー用）:1250m g /㎡ Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
Gemcitabine（21日レジメン）	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注液「N K」（オーダー用）:1250m g /㎡ Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
Gemcitabine+Carb 2AUC（21日レジメン）	8	13	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 カルボプラチン注射液（オーダー用）:0m g /A Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注液「N K」（オーダー用）:1000m g /㎡ Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
CPT-11	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):100m g /㎡ Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ®「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
CMFオリジナル	1	5	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg（リン酸塩2mg相当）:1A Day1 デキスト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 注射用メノトレキセート 5 0 mg :40m g /㎡ Day1 フルオウラシル注「トーフ」（オーダー用）:500m g /㎡ Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	1 乳腺外科

CMF点滴	1	17	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 注射用メソトレキセート 5 0 mg:80m g /m Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :500m g /m Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :500m g /m Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK) 初回	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g「マルイシ」:1錠 Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK) 2回目～	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
H(BS NK)+DTX 初回	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g「マルイシ」:1錠 Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
H(BS NK)+DTX 2回目～	1	20	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+TCb (DTX+Cb) 初回	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g「マルイシ」:1錠 Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0m g /A Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+TCb (DTX+Cb) 2回目以降	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0m g /A Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+TC (DTX+CPA) 初回	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g「マルイシ」:1錠 Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+TC (DTX+CPA) 2回目以降	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m Day1	1 乳腺外科

H (BS NK)+wPTX 初回	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g / m l Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day15 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+wPTX 2回目以降	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g / m l Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day15	1 乳腺外科
H (BS NK)+Eribulin 初回	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g 「日医工」:1.4mg/ m l Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+Eribulin 2回目以降	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g 「日医工」:1.4mg/ m l Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+VNR 初回	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/ m l Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+VNR 2回目以降	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/ m l Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+GEM 初回	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day8 Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1250m g / m l Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+GEM 2回目以降	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day8 Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1250m g / m l Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+nabPTX q3w 初回	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260mg/ m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+nabPTX q3w 2回目以降	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260mg/ m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科

H (BS NK) +PER 初回	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :840mg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK) +PER 2回目～	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420mg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK) +PER【混合】	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420mg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
H(BS NK)+PER+DTX 初回	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :840mg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1	1 乳腺外科
H(BS NK)+PER+DTX 2回目～	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420mg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER【混合】 + DTX	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420mg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER+TCb (DTX+Cb) 初回	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :840mg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0m g /A Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER+TCb (DTX+Cb) 2回目以降	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420mg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0m g /A Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER【混合】 +TCb (DTX+Cb)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420mg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0m g /A Day1	1 乳腺外科

H (BS NK)+PER+TC (DTX+CPA) 初回	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :840m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m <sup>l</sup> Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m <sup>l</sup> Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER+TC (DTX+CPA) 2回目以降	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m <sup>l</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m <sup>l</sup> Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER【混合】+TC (DTX+CPA)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m <sup>l</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m <sup>l</sup> Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER+wPTX 初回	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20m g 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :840m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /m <sup>l</sup> Day1 Day8 Day15 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day8 Day15	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER+wPTX 2回目以降	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20m g 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /m <sup>l</sup> Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day8 Day15	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER【混合】+wPTX	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20m g 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /m <sup>l</sup> Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day8 Day15	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER+GEM 初回	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :840m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day8 Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1250m g /m <sup>l</sup> Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day8 Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER+GEM 2回目以降	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day8 Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1250m g /m <sup>l</sup> Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科

H(BS NK)+PER+nabPTX(q3w) 初回	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :840m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260mg/㎡ Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
H(BS NK)+PER+nabPTX(q3w) 2回目以降	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260mg/㎡ Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
H(BS NK)+PER+nabPTX(q3w) 2回目以降 (前投薬無し)	1	20	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260mg/㎡ Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER+Eribulin 初回	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :840m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g 「日医工」:1.4mg/㎡ Day1 Day8 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER+Eribulin 2回目以降	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g 「日医工」:1.4mg/㎡ Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER+Eribulin 2回目以降 (前投薬なし)	8	13	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g 「日医工」:1.4mg/㎡ Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER+VNR 初回	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :840m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/㎡ Day1 Day8 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER+VNR 2回目以降	8	13	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/㎡ Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
H (BS NK)+PER+VNR 2回目以降 (前投薬なし)	8	13	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/㎡ Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
フェスゴ【初回】	1	20	フェスゴ配合皮下注IN (15mL/瓶) *:15m l Day1 生食注 2 0 m l :1A Day1	1 乳腺外科
フェスゴ [2回目以降]	1	20	フェスゴ配合皮下注MA (10mL/瓶) *:10m l Day1 生食注 2 0 m l :1A Day1	1 乳腺外科
フェスゴ+DTX 初回	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/㎡ Day1 フェスゴ配合皮下注IN (15mL/瓶) :15m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 生食注 2 0 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	1 乳腺外科

フェスゴ+DTX 2回目以降	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 フェスゴ配合皮下注MA (10mL/瓶):10mL Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 生食注 20mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	1 乳腺外科
フェスゴ+TCb (DTX+Cb) 初回	1	20	アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用):0mg/A Day1 フェスゴ配合皮下注IN (15mL/瓶):15mL Day1 生食注 20mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	1 乳腺外科
フェスゴ+TCb (DTX+Cb) 2回目以降	1	20	アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用):0mg/A Day1 フェスゴ配合皮下注MA (10mL/瓶):10mL Day1 生食注 20mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	1 乳腺外科
フェスゴ+TC (DTX+CPA) 初回	1	20	アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 エンドキサン注 (オーダ用):600mg/m <sup>2</sup> Day1 フェスゴ配合皮下注IN (15mL/瓶):15mL Day1 生食注 20mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	1 乳腺外科
フェスゴ+TC (DTX+CPA) 2回目以降	1	20	アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 エンドキサン注 (オーダ用):600mg/m <sup>2</sup> Day1 フェスゴ配合皮下注MA (10mL/瓶):10mL Day1 生食注 20mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	1 乳腺外科
フェスゴ+wPTX 初回	15	6	デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day15 フェスゴ配合皮下注IN (15mL/瓶):15mL Day1 生食注 20mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	1 乳腺外科
フェスゴ+wPTX 2回目以降	15	6	デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day15 フェスゴ配合皮下注MA (10mL/瓶):10mL Day1 生食注 20mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	1 乳腺外科
フェスゴ+GEM 初回	8	13	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day8 Day1 ゲムシタビン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1250mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1 フェスゴ配合皮下注IN (15mL/瓶):15mL Day1 生食注 20mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8	1 乳腺外科
フェスゴ+GEM 2回目以降	8	13	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day8 Day1 ゲムシタビン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1250mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1 フェスゴ配合皮下注MA (10mL/瓶):10mL Day1 生食注 20mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	1 乳腺外科
フェスゴ+nabPTX(q3w) 初回	1	20	デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 フェスゴ配合皮下注IN (15mL/瓶):15mL Day1 生食注 20mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	1 乳腺外科

フェスゴ+nabPTX(q3w) 2回目以降	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260mg/ml Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 フェスゴ配合皮下注MA (10mL/瓶) :10m l Day1 生食注 2 0 m l :1A Day1	1 乳腺外科
フェスゴ+Eribulin 初回 (前投薬あり)	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 フェスゴ配合皮下注IN (15mL/瓶) :15m l Day1 生食注 2 0 m l :1A Day1 エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g「日医工」:1.4mg/ml Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
フェスゴ+Eribulin 2回目以降 (前投薬あり)	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 フェスゴ配合皮下注MA (10mL/瓶) :10m l Day1 生食注 2 0 m l :1A Day1 エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g「日医工」:1.4mg/ml Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
フェスゴ+Eribulin 初回 (前投薬なし)	8	13	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 フェスゴ配合皮下注IN (15mL/瓶) :15m l Day1 生食注 2 0 m l :1A Day1 エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g「日医工」:1.4mg/ml Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
フェスゴ+Eribulin 2回目以降 (前投薬なし)	8	13	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 フェスゴ配合皮下注MA (10mL/瓶) :10m l Day1 生食注 2 0 m l :1A Day1 エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g「日医工」:1.4mg/ml Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
フェスゴ+VNR 初回	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 フェスゴ配合皮下注IN (15mL/瓶) :15m l Day1 生食注 2 0 m l :1A Day1 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/ml Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
フェスゴ+VNR 2回目以降	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 フェスゴ配合皮下注MA (10mL/瓶) :10m l Day1 生食注 2 0 m l :1A Day1 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/ml Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1	1 乳腺外科
カドサイラ (初回)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 カドサイラ点滴静注用 (オーダ用) *:3.6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g「マルイシ」:1錠 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
カドサイラ (前投薬あり)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 カドサイラ点滴静注用 (オーダ用) *:3.6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
カドサイラ (前投薬なし)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 カドサイラ点滴静注用 (オーダ用) *:3.6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
Enhertu (抗HER2抗体初回)	1	20	ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g「マルイシ」:1錠 Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1	1 乳腺外科
Enhertu	1	20	ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1	1 乳腺外科
Bevacizumab (BS CTNK)	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ベバシズマブBS「CTNK」点滴静注 (オーダ用) :10m g /kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
Bev+wPTX 初回 [Bev BS CTNK]	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 ベバシズマブBS「CTNK」点滴静注 (オーダ用) :10m g /kg Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 バクタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」:90m g /ml Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day8 Day15	1 乳腺外科

Bev+wPTX 2回目以降 [Bev BS CTNK]	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 ヘパシズマブBS「CTNK」点滴静注 (オーダー用) :10m g/kg Day1 Day15 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:90m g / m l Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	1 乳腺外科
転移・再発 Pembrolizumab	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
転移再発 : Pembro + PTX (2剤投与日) (初回)	1	6	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パクリタキセル注1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	1 乳腺外科
転移再発 : Pembro + PTX (2剤投与日) (2回目以降)	1	6	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パクリタキセル注1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	1 乳腺外科
転移再発 : Pembro + PTX (PTXのみ)	1	6	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パクリタキセル注1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	1 乳腺外科
転移再発 : Pembro + PTX (Pembroのみ)	1	6	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	1 乳腺外科
転移再発 : Pembro+w-nabPTX (2剤投与日)	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 アブラキサン点滴静注用1 0 0 m g :100mg / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
転移再発 : Pembro+w-nabPTX (nabPTXのみ)	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用1 0 0 m g :100mg / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
転移再発 : Pembro + nabPTX (Pembroのみ)	1	6	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	1 乳腺外科
転移再発 : Pembro+GEM+Carbo	8	13	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day8 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day8 Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用) :1000m g / m l Day8 Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day8 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day8 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g / A Day8 Day1 キイトルーダ点滴静注1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day15	1 乳腺外科
周期期 Pembro+PTX+Cb1.5	15	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day15 パクリタキセル注1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g / m l Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day8 Day15 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g / A Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
周期期 Pembro + EC 【アロカリス】	1	20	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 エピルビン塩酸塩注射液「NK」(オーダー用):90m g / m l Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :10m l Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 エンドキサン (C P A) 注 5 0 0 m g :600m g / m l Day1	1 乳腺外科
周期期 Pembro200mg	1	20	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	1 乳腺外科
Atezolizumab単剤	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 テセントリク点滴静注 8 4 0 m g / 1 4 m L * :840m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
Atezo+w-nabPTX+前投薬	15	13	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day15 テセントリク点滴静注 8 4 0 m g / 1 4 m L * :840m g Day1 Day15 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用1 0 0 m g :100mg / m l Day1 Day15 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day15	1 乳腺外科

Atezo+w-nabPTX (前投薬なし)	15	13	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day15 テセントリク点滴静注 840mg/14mL *:840mg Day1 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg/mL Day1 Day15 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホカ」10mL:1筒 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8	1 乳腺外科
サシツマブ ゴビデカン (トロデルビ) 療法	8	13	アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 トロデルビ点滴静注用200mg*:10mg/kg Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホカ」10mL:1筒 Day1 Day8 アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」:1錠 Day1 Day8	1 乳腺外科
ダトボタマブ デルクステカン (ダトロウェイ) 療法	1	20	大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day1 ダトロウェイ点滴静注用 100mg *:6mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホカ」10mL:1筒 Day1 アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」:1錠 Day1	1 乳腺外科
Zoladex 3M毎	1	77	ゾラデックスL A10.8mgデボ:1筒 Day1	1 乳腺外科
Zoladex 1M毎	1	20	ゾラデックス 3.6mgデボ:1A Day1	1 乳腺外科
Leuprorelin 6M毎	1	161	リュープリンPRO注射用キット22.5mg:1筒 Day1	1 乳腺外科
Leuprorelin 3M毎	1	77	リュープリンSRキット11.25mg:1筒 Day1	1 乳腺外科
Fasolodex	1	20	フェソロデックス筋注250mg/5mL:2筒 Day1	1 乳腺外科
Fasolodex+Zol 1M	1	20	フェソロデックス筋注250mg/5mL:2筒 Day1 ゾラデックス 3.6mgデボ:1A Day1	1 乳腺外科
Fasolodex+Zol 3M	1	20	フェソロデックス筋注250mg/5mL:2筒 Day1 ゾラデックスL A10.8mgデボ:1筒 Day1	1 乳腺外科
Fasolodex+Leup 3M	1	20	フェソロデックス筋注250mg/5mL:2筒 Day1 リュープリンSRキット11.25mg:1筒 Day1	1 乳腺外科
ゾレドロン酸 (ニプロ)	1	20	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」:1袋 Day1	1 乳腺外科
ゾレドロン酸 (ニプロ) (高Ca血症)	1	6	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」:1袋 Day1	1 乳腺外科
Ranmark (シリンジ製剤)	1	27	ランマークHI皮下注 120mgシリンジ1.0mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
ベグフィルグラスチム (ジースタブS)	1	11	ベグフィルグラスチムB S皮下注3.6mg「モチダ」:1筒 Day1	1 乳腺外科
ジースタブ・body pod	1	11	ジースタブ皮下注3.6mgポディーボッド *:1キット Day1	1 乳腺外科
フィルグラスチム	1	0	フィルグラスチムB S注7.5μgシリンジ「F」:1筒 Day1	1 乳腺外科
ポートフラッシュ	1	0	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホカ」10mL:1筒 Day1	1 乳腺外科
CDDP+RT	1	20	生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A) :0.4A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用) :100mg/mL Day1 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1	2 口腔外科
weeklyCDDP+RT療法	1	6	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A) :0.4A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用) :40mg/mL Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1	2 口腔外科
Cmab+RT (1クール目)	1	6	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :400mg/mL Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	2 口腔外科
Cmab+RT (2クール目以降)	1	6	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :250mg/mL Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	2 口腔外科
Cmab +FP (1クール目)	15	6	生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液 (オーダー用) :400mg/mL Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用) :100mg/mL Day1 マンニトールS注射液300mL:300mL Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用) :1000mg/mL Day1 Day2 Day3 Day4 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 アービタックス注射液 (オーダー用) :250mg/mL Day8 Day15	2 口腔外科

Cmab+FP（2クール目以降）	15	6	生理食塩液バッグ「フソー」1 L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /m l Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day5 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :100m g /m l Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1 フルオウラシル注「トーフ」(オーダ用) :1000m g /m l Day1 Day2 Day3 Day4 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4	2 口腔外科
Cmab+weekly PTX（1クール目）	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :400m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ファモチジン静注20m g「サワイ」(20mL/A) :1A Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /m l Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	2 口腔外科
Cmab+weeklyPTX（2クール目以降）	1	6	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 ファモチジン静注20m g「サワイ」(20mL/A) :1A Day1	2 口腔外科
Cmab単剤（他レジメン使用中のメンテナンス）	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	2 口腔外科
ニボルマブ	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 オブジーボ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m L * :240m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	2 口腔外科
キイトルーダ療法（3週）（頭頸部がん）	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	2 口腔外科
キイトルーダ療法（6週）（頭頸部がん）	1	41	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :400m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	2 口腔外科
ペムブロリズマブ+FP療法（頭頸部がん）	4	17	生理食塩液バッグ「フソー」1 L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオウラシル注「トーフ」(オーダ用) :1000m g /m l Day1 Day2 Day3 Day4 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day4 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day2 Day3 Day4 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 m L / A ) :0.4A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :100m g /m l Day1 ラシックス注 2 0 m g 2 m l :0.5A Day1	2 口腔外科
Pembrolizumab+CBDCA+5-FU療法（頭頸部がん）	4	17	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 Day4 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオウラシル注「トーフ」(オーダ用) :1000m g /m l Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day4 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1	2 口腔外科
導入化学療法PCE療法（初回）	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 ファモチジン静注20m g「サワイ」(20mL/A) :1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :400m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1	2 口腔外科
導入化学療法PCE療法（2コース目以降）	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 ファモチジン静注20m g「サワイ」(20mL/A) :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1	2 口腔外科

進行・再発PCE療法（初回）	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 テキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :400m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:100m g /m l Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /m l Day8 Day15	2 口腔外科
進行・再発PCE療法（2～6コース目）	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 テキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /m l Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:100m g /m l Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1 Day8	2 口腔外科
進行・再発 PCE療法（7コース目以降）	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	2 口腔外科
CDDP+DTX（ルート1本）	5	2	シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダー用）:5m g /m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」（オーダー用）:10mg /m l Day1	2 口腔外科
CDDP+DTX（ルート2本）	5	2	シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダー用）:2.5m g /m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」（オーダー用）:5mg /m l Day1	2 口腔外科
新_TPF		6	1 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ソルアセト F 輸液 5 0 0 m L /袋:1袋 Day2 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day2 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day2 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」（オーダー用）:60mg /m l Day2 グラニセトロン点滴静注「バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day2 生理食塩液「フソー」 1 L :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダー用）:80m g /m l Day2 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :200mL Day2 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用) :500m g Day3 Day4 Day5 Day6 プリンペラン注射液 1 0 m g 2 m l :1A Day3 Day4 Day5 Day6	2 口腔外科
CBDCA+PEM療法（悪性胸膜中皮腫）	1	20	グラニセトロン点滴静注「バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 テキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):3A Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ベメトレキセド点滴静注液「N K」（オーダー用）:500m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫
CDDP+PEM療法（悪性胸膜中皮腫）	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 テキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ベメトレキセド点滴静注液「N K」（オーダー用）:500m g /m l Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq /m l ( 2 0 m L /A) :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダー用）:75m g /m l Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫
PEM単剤療法（悪性胸膜中皮腫）	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注「バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ベメトレキセド点滴静注液「N K」（オーダー用）:500m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫
ニボルマブ療法（悪性胸膜中皮腫）	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m L * :240m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫
ニボルマブ・イピリウムマブ療法（悪性胸膜中皮腫）	22	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day22 オプジーボ点滴静注（オーダー用）:360mg Day1 Day22 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day22 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day22 Day1 大塚生食注 5 0 m l :30m l Day1 ヤーボイ点滴静注液（オーダー用） * :1mg /kg Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫
CBDCA+PEM+Pembrolizumab併用療法（悪性胸膜中皮腫）	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 テキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):3A Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ベメトレキセド点滴静注液「N K」（オーダー用）:500m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫

CDDP+PEM+Pembrolizumab併用療法（悪性胸膜中皮腫）	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ペムトレキセド点滴静注液「N K」（オーダー用）:500m g /m l Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l （2 0 mL/A）:0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダー用）:75m g /m l Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫
Pembrolizumab療法（悪性胸膜中皮腫）	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫
CBDCA+nabPTX+Pemb 導入療法	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):3A Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/m l Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 （オーダー用）:0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA+nabPTX+Atezo 導入療法	15	6	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 デセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m L * :1200m g Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):3A Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/m l Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 カルボプラチン注射液 （オーダー用）:0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA+PEM+Pemb 導入療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):3A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ペムトレキセド点滴静注液「N K」（オーダー用）:500m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 （オーダー用）:0m g /A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA+PEM+Pemb 維持療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ペムトレキセド点滴静注液「N K」（オーダー用）:500m g /m l Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA+PAC+Bev(BS)+Atezo 導入療法	1	20	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 デセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m L * :1200m g Day1 ベバシズマブBS「CTNK」点滴静注（オーダー用）:15m g /kg Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :2V Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」（20mL/A）:1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:175m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 （オーダー用）:0m g /A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA+PAC+Bev(BS)+Atezo 維持療法	1	20	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 デセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m L * :1200m g Day1 ベバシズマブBS「CTNK」点滴静注（オーダー用）:15m g /kg Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
シスプラチン+ペムトレキセド+Pemb 導入	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 ペムトレキセド点滴静注液「N K」（オーダー用）:500m g /m l Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l （2 0 mL/A）:0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダー用）:75m g /m l Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
シスプラチン+ペムトレキセド+Pemb 維持療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ペムトレキセド点滴静注液「N K」（オーダー用）:500m g /m l Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
デュルバルマブ療法【体重≤30kg、Q4W】	1	27	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 イミフィンジ点滴静注（オーダー用） * :20mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌

デュルバルマブ療法【用量固定、Q4W】	1	27	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 イミフンジ点滴静注（オーダ用） *:1500mg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1 A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
ニボルマブ療法【q2W】	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m L *:240m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1 A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
ニボルマブ・イビリムマブ療法	22	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day22 オブジーボ点滴静注（オーダ用） :360mg Day1 Day22 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day22 ボラミン注 5 m g 1 m l :1 A Day22 Day1 大塚生食注 5 0 m l :30m l Day1 ヤーボイ点滴静注液（オーダ用） *:1mg/kg Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
ペムブロリズマブ療法 q【3】w	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L *:200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1 A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
ペムブロリズマブ療法 q【6】w	1	41	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L *:400m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1 A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
アテゾリズマブ療法（3週毎）	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 デセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m L *:1200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1 A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
アテゾリズマブ療法（4週毎）	1	27	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 デセントリク点滴静注 8 4 0 m g / 1 4 m L :1680m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1 A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CPT-11単剤	15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当） :1V Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）:60m g / m l Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
DOC単剤	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当） :1V Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」（オーダ用） :60mg/ m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
DTX+Bev併用療法[Bev BS CTNK]	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当） :1V Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」（オーダ用） :75mg/ m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ペバシズマブBS「CTNK」点滴静注（オーダ用） :15m g / k g Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
DTX + RAM併用療法	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当） :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1 A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」（オーダ用） :60mg/ m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 サイラムザ点滴静注液（オーダ用） :10mg/kg Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
GEM単剤（day 1,8 q3W）	8	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「N K」（オーダ用） :1000m g / m l Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
GEM単剤（day 1,8,15 q4W）	15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「N K」（オーダ用） :1000m g / m l Day1 Day8 Day15 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
VNR単剤(day1,8 q3W)	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/ m l Day1 Day8 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 Day8	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
VNR単剤(day1,8,15)	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day8 デキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day15 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day8 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/ m l Day1 Day15 Day8 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 Day15 Day8	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
アムルピシン単剤療法	3	18	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当） :1V Day1 Day2 Day3 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 カルセド注射用（オーダ用） *:45mg/ m l Day1 Day2 Day3	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
ペバシズマブ維持療法 [Bev BS CTNK]	1	20	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ペバシズマブBS「CTNK」点滴静注（オーダ用） :15m g / k g Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
PEM単剤	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当） :1V Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ベムトレキセド点滴静注液「N K」（オーダ用） :500m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
ベムトレキセド+エルロチニブ併用療法	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当） :1V Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ベムトレキセド点滴静注液「N K」（オーダ用） :500m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
ベムトレキセド+ペバシズマブ維持療法[BV BS CTNK]	1	20	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ペバシズマブBS「CTNK」点滴静注（オーダ用） :15m g / k g Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当） :1V Day1 ベムトレキセド点滴静注液「N K」（オーダ用） :500m g / m l Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
ナブパクリタキセル単剤療法	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当） :1V Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/ m l Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌

CBDCA/CPT（day1、8 q3W）	8	13	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 Day8 生理食塩液〔ヒカリ〕 500mL:1袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）:50mg/㎡ Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 カルボプラチン注射液（オーダー用）:0mg/A Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA/CPT（day1、8、15 q4W）	15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 Day15 Day8 デキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 Day15 Day8 生理食塩液〔ヒカリ〕 500mL:1袋 Day1 Day15 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）:50mg/㎡ Day1 Day15 Day8 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day15 Day8 カルボプラチン注射液（オーダー用）:0mg/A Day1 Day15 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day15 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA/ETOP	3	18	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:3A Day1 生理食塩液〔ヒカリ〕 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5mL:80mg/㎡ Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液（オーダー用）:0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day3 Day2 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day3 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA/PAC	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:2V Day1 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）:1A Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 生理食塩液〔ヒカリ〕 500mL:1袋 Day1 バクリタキセル注100mg/16.7mL〔NK〕:200mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液（オーダー用）:0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA/PAC210/Bev（BS）	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:2V Day1 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）:1A Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 生理食塩液〔ヒカリ〕 500mL:1袋 Day1 バクリタキセル注100mg/16.7mL〔NK〕:210mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液（オーダー用）:0mg/A Day1 ペバシズマブBS〔CTNK〕点滴静注（オーダ用）:15mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA/PAC175/Bev（BS）	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:2V Day1 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）:1A Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 生理食塩液〔ヒカリ〕 500mL:1袋 Day1 バクリタキセル注100mg/16.7mL〔NK〕:175mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液（オーダー用）:0mg/A Day1 ペバシズマブBS〔CTNK〕点滴静注（オーダ用）:15mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
weeklyCBDCA/PTX/TRT	36	6	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:1A Day1 デキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 バクリタキセル注100mg/16.7mL〔NK〕:40mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 カルボプラチン注射液（オーダー用）:0mg/A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA/PEM	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:3A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ベメトレキセド点滴静注液〔NK〕（オーダ用）:500mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液（オーダー用）:0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA/PEM/Bev（BS）	1	20	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ペバシズマブBS〔CTNK〕点滴静注（オーダ用）:15mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL〔タイホウ〕:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:3A Day1 ベメトレキセド点滴静注液〔NK〕（オーダ用）:500mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液（オーダー用）:0mg/A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA/PEM/オシメルチニブ併用療法（1～4コース目）	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL〔タイホウ〕:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:3A Day1 ベメトレキセド点滴静注液〔NK〕（オーダ用）:500mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液（オーダー用）:0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA/PEM/オシメルチニブ併用療法（5コース目以降）	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 ベメトレキセド点滴静注液〔NK〕（オーダ用）:500mg/㎡ Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌

CBDCa/TS-1	1	27	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):3A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCa(5/6)/nab-PTX(100mg/m2)	15	6	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day15 Day8 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day15 Day8 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg/mi Day1 Day15 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day15 Day8 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用):0mg/A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CDDP・PEM併用療法	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 テキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ペメトレキセド点滴静注液「N K」(オーダー用):500mg/mi Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液300mL:300mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):75mg/mi Day1 (GE-リタ)ソルデム1輸液200mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CDDP・PEM・BV (7.5mg/kg) [BV BS CTNK]	1	20	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ベバシズマブBS「CTNK」点滴静注 (オーダー用):7.5mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 テキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ペメトレキセド点滴静注液「N K」(オーダー用):500mg/mi Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):75mg/mi Day1 ソルデム3A輸液200mL:1袋 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CDDP・PEM・BV (15mg/kg) [BV BS CTNK]	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ベバシズマブBS「CTNK」点滴静注 (オーダー用):15mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 テキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ペメトレキセド点滴静注液「N K」(オーダー用):500mg/mi Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):75mg/mi Day1 ソルデム3A輸液200mL:1袋 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CDDP・PEM・オシメルチニブ併用療法 (1～4コース目)	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 テキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ペメトレキセド点滴静注液「N K」(オーダー用):500mg/mi Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液300mL:300mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):75mg/mi Day1 (GE-リタ)ソルデム1輸液200mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CDDP・PEM・オシメルチニブ併用療法 (5コース目以降)	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ペメトレキセド点滴静注液「N K」(オーダー用):500mg/mi Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CDDP・CPT併用療法	15	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 テキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day8 Day15 イリリテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):60mg/mi Day1 Day8 Day15 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液300mL:300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):60mg/mi Day1 ソルデム3A輸液200mL:1袋 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CDDP・ETOP (100mg/mi) 併用療法	3	18	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 テキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液 100mg/mi「サド」5mL:100mg/mi Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液300mL:300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):80mg/mi Day1 ソルデム3A輸液200mL:1袋 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌

CDDP・ETOP（80mg/m <sup>2</sup> ）併用療法	3	18	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サﾄﾞ」 5 m l :80m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :80m g /m <sup>2</sup> Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CDDP・VNR(25mg/m <sup>2</sup> )併用療法	8	20	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :75m g /m <sup>2</sup> Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CDDP・VNR(20mg/m <sup>2</sup> )併用	8	20	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L :20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :75m g /m <sup>2</sup> Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CDDP・GEM併用療法	8	20	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「N K」 (オーダ用) :1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day8 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :80m g /m <sup>2</sup> Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA+PEM+アミノバタムプiv (1Cy目) (80kg以上)	15	6	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ベムトレキセド点滴静注液「N K」(オーダ用) :500m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 Day2 Day8 Day15 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :3V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day2 Day8 Day15 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day2 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day8 Day15 ライブリバント点滴静注 3 5 0 m g * :350m g Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day2 Day8 Day15 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day2 Day8 Day15 ライブリバント点滴静注 3 5 0 m g * :1400m g Day2 ライブリバント点滴静注 3 5 0 m g * :1750m g Day8 Day15 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA+PEM+アミノバタムプiv (2Cy目) (80kg以上)	1	20	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ベムトレキセド点滴静注液「N K」(オーダ用) :500m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 ライブリバント点滴静注 3 5 0 m g * :1750m g Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA+PEM+アミノバタムプiv (3-4Cy目) (80kg以上)	1	20	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ベムトレキセド点滴静注液「N K」(オーダ用) :500m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 ライブリバント点滴静注 3 5 0 m g * :2100m g Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌

CBDCA+PEM+アミバンタマブiv (5Cy目以降) (80kg以上)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ベムトレキセド点滴静注「N K」(オーダ用) :500mg g/㎡ Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アセリオ静注液 1 0 0 0 mg バッグ:1袋 Day1 デキサル注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサル注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 ライブリバント点滴静注 3 5 0 mg *:2100mg Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA+PEM+アミバンタマブiv (1Cy目) (80kg未満)	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ベムトレキセド点滴静注液「N K」(オーダ用) :500mg g/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g/A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 アセリオ静注液 1 0 0 0 mg バッグ:1袋 Day1 Day2 Day8 Day15 デキサル注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :3V Day1 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 Day2 Day8 Day15 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day2 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day8 Day15 ライブリバント点滴静注 3 5 0 mg *:350mg Day1 デキサル注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day2 Day8 Day15 デキサル注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day2 Day8 Day15 ライブリバント点滴静注 3 5 0 mg *:1050mg Day2 ライブリバント点滴静注 3 5 0 mg *:1400mg Day8 Day15	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA+PEM+アミバンタマブiv (2Cy目) (80kg未満)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ベムトレキセド点滴静注液「N K」(オーダ用) :500mg g/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g/A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アセリオ静注液 1 0 0 0 mg バッグ:1袋 Day1 デキサル注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサル注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 ライブリバント点滴静注 3 5 0 mg *:1400mg Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA+PEM+アミバンタマブiv (3-4Cy目) (80kg未満)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ベムトレキセド点滴静注液「N K」(オーダ用) :500mg g/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g/A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アセリオ静注液 1 0 0 0 mg バッグ:1袋 Day1 デキサル注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサル注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 ライブリバント点滴静注 3 5 0 mg *:1750mg Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
CBDCA+PEM+アミバンタマブiv (5Cy目以降) (80kg未満)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ベムトレキセド点滴静注液「N K」(オーダ用) :500mg g/㎡ Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アセリオ静注液 1 0 0 0 mg バッグ:1袋 Day1 デキサル注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサル注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 ライブリバント点滴静注 3 5 0 mg *:1750mg Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
ラゼリチニブ+アミバンタマブiv(1Cy目)(80kg以上)		22	6 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day8 Day15 Day22 アセリオ静注液 1 0 0 0 mg バッグ:1袋 Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 デキサル注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1 Day2 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 ライブリバント点滴静注 3 5 0 mg *:350mg Day1 ライブリバント点滴静注 3 5 0 mg *:1050mg Day2	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
ラゼリチニブ+アミバンタマブiv(2Cy目以降)(80kg以上)	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 アセリオ静注液 1 0 0 0 mg バッグ:1袋 Day1 Day15 デキサル注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15 デキサル注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day15 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 Day15 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day15 ライブリバント点滴静注 3 5 0 mg *:1400mg Day1 Day15	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
ラゼリチニブ+アミバンタマブiv(1Cy目)(80kg未満)		22	6 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day8 Day15 Day22 アセリオ静注液 1 0 0 0 mg バッグ:1袋 Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 デキサル注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1 Day2 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 ライブリバント点滴静注 3 5 0 mg *:350mg Day1 ライブリバント点滴静注 3 5 0 mg *:700mg Day2	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌
ラゼリチニブ+アミバンタマブiv(2Cy目以降)(80kg未満)	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 アセリオ静注液 1 0 0 0 mg バッグ:1袋 Day1 Day15 デキサル注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15 デキサル注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day15 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 Day15 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day15 ライブリバント点滴静注 3 5 0 mg *:1050mg Day1 Day15	3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌

<p>周術期 CDDP+GEM+ベムプロリズマブ</p>	<p>8</p>	<p>13</p>	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶, Day1 Day8 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200mg Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶, Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶, Day1 デ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 デ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶, Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「N K」 (オーダ用) :1000m g /m l Day1 Day8 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶, Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :75m g /m l Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶, Day1 Day8 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1</p>	<p>3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌</p>
<p>周術期 CDDP+PEM+ベムプロリズマブ</p>	<p>1</p>	<p>20</p>	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶, Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200mg Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶, Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶, Day1 デ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 デ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 ペメトレキセド点滴静注液「N K」(オーダ用) :500m g /m l Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶, Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :75m g /m l Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶, Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1</p>	<p>3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌</p>
<p>周術期 ベムプロリズマブ療法 q[3]w</p>	<p>1</p>	<p>20</p>	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶, Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200mg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶, Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1</p>	<p>3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌</p>
<p>周術期 ベムプロリズマブ療法 q[6]w</p>	<p>1</p>	<p>41</p>	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶, Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :400mg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶, Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1</p>	<p>3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌</p>
<p>アテゾリズマブ（テセントリク）術後補助療法（3週毎）</p>	<p>1</p>	<p>20</p>	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶, Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m L * :1200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶, Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1</p>	<p>3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌</p>
<p>アテゾリズマブ（テセントリク）術後補助療法（4週毎）</p>	<p>1</p>	<p>27</p>	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶, Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 テセントリク点滴静注 8 4 0 mg / 1 4 m L :1680m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶, Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1</p>	<p>3 呼吸器内科・呼吸器外科/2. 非小細胞肺癌</p>
<p>CBDCA/ETOP</p>	<p>3</p>	<p>18</p>	<p>グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶, Day1 デ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):3A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド`」 5 m l :80m g /m l Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶, Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ`用) :0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶, Day1 Day3 Day2 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶, Day2 Day3 Day1</p>	<p>3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌</p>
<p>CBDCA/ETOP/Atezo 導入療法</p>	<p>3</p>	<p>18</p>	<p>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m L * :1200m g Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶, Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶, Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶, Day1 デ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):3A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド`」 5 m l :100m g /m l Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶, Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ`用) :0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶, Day1 Day2 Day3 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1</p>	<p>3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌</p>
<p>CBDCA/ETOP/Atezo 維持療法（3週毎）</p>	<p>1</p>	<p>20</p>	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶, Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m L * :1200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶, Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1</p>	<p>3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌</p>
<p>CBDCA/ETOP/Atezo 維持療法（4週毎）</p>	<p>1</p>	<p>27</p>	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶, Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 テセントリク点滴静注 8 4 0 mg / 1 4 m L :1680m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶, Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1</p>	<p>3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌</p>
<p>CBDCA/ETOP/デュルバルマブ療法</p>	<p>3</p>	<p>18</p>	<p>大塚生食注 5 0 m l :1瓶, Day1 Day2 Day3 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶, Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day3 Day1 エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド`」 5 m l :80m g /m l Day2 Day3 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶, Day1 デ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):3A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶, Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注 (オーダ`用) * :1500mg Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ`用) :0m g /A Day1</p>	<p>3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌</p>
<p>デュルバルマブ維持療法</p>	<p>1</p>	<p>27</p>	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶, Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶, Day1 イミフィンジ点滴静注 (オーダ`用) * :1500mg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶, Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1</p>	<p>3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌</p>
<p>CDDP+ETOP（100mg/mi）併用療法</p>	<p>3</p>	<p>18</p>	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶, Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶, Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶, Day1 デ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 デ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド`」 5 m l :100m g /m l Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ`用) :80m g /m l Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶, Day2 Day3 Day1</p>	<p>3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌</p>

CDDP+ETOP（80mg/m <sup>2</sup> ）併用療法	3	18	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサメタゾン注射液6.6mg（リノ酸塩8mg相当）:1V Day1 Day2 Day3 デキサメタゾン注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド」 5 m l :80m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l （ 2 0 mL/A） :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダ用）:80m g /m <sup>2</sup> Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌
CDDP+CPT併用療法	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサメタゾン注射液6.6mg（リノ酸塩8mg相当）:1V Day1 デキサメタゾン注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):60m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l （ 2 0 mL/A） :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダ用）:60m g /m <sup>2</sup> Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌
CDDP+ETOP+デュルバルマブ療法	3	18	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 デキサメタゾン注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 デキサメタゾン注射液6.6mg（リノ酸塩8mg相当）:1V Day1 Day2 Day3 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注（オーダ用） *:1500mg Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド」 5 m l :100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l （ 2 0 mL/A） :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダ用）:80m g /m <sup>2</sup> Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌
アムルビシン単剤療法	3	18	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 デキサメタゾン注射液6.6mg（リノ酸塩8mg相当）:1V Day1 Day2 Day3 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 カルセド注射用（オーダ用） *:45mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3	3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌
ノゲテカン単剤療法	5	16	グラニセトロン点滴静注「バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 ハイカムチン点滴静注液 1 m g / 1 m L *:1m g /m <sup>2</sup> Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4	3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌
タルタマブ（1コース目）	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day15 デキサメタゾン注射液6.6mg（リノ酸塩8mg相当）:1V Day8 Day1 デキサメタゾン注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):1A Day8 Day1 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:0.5袋 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :233m l Day8 Day15 (イムデトラ用) 輸液安定化液 *:13m l Day8 Day15 大塚蒸留水 1 0 0 m L :4.4m l Day8 Day15 イムデトラ点滴静注用 1 0 m g *:10m g Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 生理食塩液「フソー」 1 L :1袋 Day8 Day1 デキサメタゾン注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :236m l Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1.3m l Day1 イムデトラ点滴静注用 1 m g *:1m g Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌
タルタマブ（2コース目以降）	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキサメタゾン注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:0.5袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :233m l Day1 (イムデトラ用) 輸液安定化液 *:13m l Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :4.4m l Day1 イムデトラ点滴静注用 1 0 m g *:10m g Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/3. 小細胞肺癌
CDDP+ADR+CPA併用療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサメタゾン注射液6.6mg（リノ酸塩8mg相当）:1V Day1 デキサメタゾン注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ドキソルビシン塩酸塩注射用（オーダ用）:50m g /m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注（オーダ用）:500m g /m <sup>2</sup> Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l （ 2 0 mL/A） :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :200mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :0.5袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダ用）:50m g /m <sup>2</sup> Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/4. 胸腺腫・胸腺癌
CBDCA+PTX+アテゾリズマブ併用療法（導入療法）	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサメタゾン注射液6.6mg（リノ酸塩8mg相当）:2V Day1 デキサメタゾン注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m L *:1200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:200m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液（オーダ用）:0m g /A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/4. 胸腺腫・胸腺癌
CBDCA+PTX+アテゾリズマブ併用療法（維持療法）	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m L *:1200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/4. 胸腺腫・胸腺癌
エンドキサンパルス（ANCA関連血管炎）	1	20	グラニセトロン点滴静注「バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 エンドキサン（C P A）注 5 0 0 m g :15m g /kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/5. その他

リツキシマブBS（ANCA関連血管炎）	1	6	生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダー用) : 375m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g 「マルイシ」: 2 錠 Day1	3 呼吸器内科・呼吸器外科/5. その他
PLD単剤療法	1	27	大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1 ドキシル注 2 0 m g / 1 0 m L * : 50m g / m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
BEP療法	16	5	ソルアセトF輸液 5 0 0 m L / 袋: 1 袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day7 Day8 Day9 Day16 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サト」 5 m l : 100m g / m l Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 (GE-リタ)ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day7 Day8 Day9 Day16 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用) : 20m g / m l Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 (GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1 L : 1 袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day9 Day16 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 グラニセトロン静注液 3 m g シリンジ「サワイ」: 1 筒 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 ファモチジン静注液20m g 「サワイ」 (20mL/A) : 1 A Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 1 A Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 プレオ ( B l e o ) 注 1 5 m g * : 20m g / m l Day2 Day9 Day16 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day9 Day16	4 婦人科/1. 卵巣がん
CPT-11+BEV療法	1	20	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 デキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当): 2 A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用): 150m g / m l Day1 アバスチン点滴静注用 (オーダー用) : 15m g / kg Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
CPT-11+CDGP(NDP)療法	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 Day8 デキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当): 1 A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用): 60m g / m l Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 アクブラ注 (オーダー用) : 80m g / m l Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L : 1 袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day8	4 婦人科/1. 卵巣がん
CPT-11単剤療法	15	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」: 1 袋 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用): 100m g / m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15	4 婦人科/1. 卵巣がん
DC療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダー用) : 70mg / m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) : 0m g / A Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
DP療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 デキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当): 2 A Day1 ファモチジン静注液20m g 「サワイ」 (20mL/A) : 1 A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 250m l Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダー用) : 70mg / m l Day1 ソルアセトF輸液 5 0 0 m L / 袋: 1 袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq / m l : 8ml Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 500m l Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用) : 60m g / m l Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L : 1 袋 Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l : 300mL Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
DTX療法	1	20	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダー用) : 70mg / m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
GC+BEV療法	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) : 2 V Day1 デキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当): 2 A Day1 ゲムシタピン点滴静注液「N K」 (オーダー用) : 1000m g / m l Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) : 0m g / A Day1 アバスチン点滴静注用 (オーダー用) : 15m g / kg Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8	4 婦人科/1. 卵巣がん
GEM+BEV療法	15	13	デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「N K」 (オーダー用) : 1000m g / m l Day1 Day8 Day15 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 アバスチン点滴静注用 (オーダー用) : 15m g / kg Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
GEM単剤療法	15	13	大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day15 Day8 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 Day15 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「N K」 (オーダー用) : 1000m g / m l Day1 Day15 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 Day15 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15	4 婦人科/1. 卵巣がん

PLD+Bev療法	1	27	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 ドキシル注 20mg/10mL *:40mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用(オーダー用):15mg/kg Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
PLD+CBDCA+Bev療法	1	27	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:250mL Day1 ドキシル注 20mg/10mL *:30mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用):0mg/A Day1 大塚生食注 100mL:100mL Day1 アバスチン点滴静注用(オーダー用):10mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:50mL Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
PLD+CBDCA療法	1	27	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 ドキシル注 20mg/10mL *:30mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
TC+BEV療法	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):2V Day1 テキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 バクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」:175mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用):0mg/A Day1 アバスチン点滴静注用(オーダー用):15mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
TC+Bev療法CBDCA脱感作	1	20	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用):1mg Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用):10mg Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用):0mg/A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):2V Day1 テキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 バクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」:175mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:100mL Day1 アバスチン点滴静注用(オーダー用):15mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:50mL Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
TC療法	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):2V Day1 テキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 バクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」:175mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
TN (NDP/CDGP)療法	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):2V Day1 テキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 バクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」:175mg/m <sup>2</sup> Day1 アクブラ注 (オーダー用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
TP+BEV療法	2	26	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用(オーダー用):15mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):2V Day1 テキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 バクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」:175mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん
TPT 単剤療法	5	16	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 テキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン点滴静注液 1mg/1mL *:1.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	4 婦人科/1. 卵巣がん
TPT+BEV療法	5	16	テキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン点滴静注液 1mg/1mL *:1.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アバスチン点滴静注用(オーダー用):15mg/kg Day1	4 婦人科/1. 卵巣がん

TPT+PTX+Bev療法	3	25	<p>〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「トキ」10mL:1筒 Day1 Day2</p> <p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3</p> <p>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1</p> <p>パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液6.6mg (ﾘﾝｳ酸塩8mg相当) :2V Day1</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液1.65mg(ﾘﾝｳ酸塩2mg相当):2A Day1</p> <p>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1</p> <p>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1</p> <p>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1 Day2 Day3</p> <p>ﾊｲｶﾑﾁﾝ点滴静注液 1 m g / 1 m L * :0.75m g / m l Day1 Day2 Day3</p> <p>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :250m l Day1</p> <p>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:175m g / m l Day1</p> <p>ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :15m g /kg Day1</p> <p>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1 Day2 Day3</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液6.6mg (ﾘﾝｳ酸塩8mg相当) :1V Day2 Day3</p> <p>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3</p>	4 婦人科/1. 卵巣がん
TP療法	2	19	<p>〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「トキ」10mL:1筒 Day1</p> <p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1</p> <p>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1</p> <p>パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液6.6mg (ﾘﾝｳ酸塩8mg相当) :2V Day1</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液1.65mg(ﾘﾝｳ酸塩2mg相当):2A Day1</p> <p>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1</p> <p>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1</p> <p>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1</p> <p>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:175m g / m l Day1</p> <p>ｿﾙｱｾﾄF 輸液 5 0 0 m L /袋:1袋 Day1</p> <p>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l :20ml Day1</p> <p>ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1</p> <p>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1</p> <p>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「マルコ」 (ｵｰﾀﾞ用) :50m g / m l Day1</p> <p>生理食塩液バッグ「フソー」 1 L :1袋 Day1 Day2</p> <p>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1</p>	4 婦人科/1. 卵巣がん
ddTC+BEV療法【初回用】	15	6	<p>ｸﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day8 Day15</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液6.6mg (ﾘﾝｳ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day1</p> <p>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day1 Day15</p> <p>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day1 Day15</p> <p>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 Day15</p> <p>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g / m l Day8 Day1 Day15</p> <p>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 Day15</p> <p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1</p> <p>パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液1.65mg(ﾘﾝｳ酸塩2mg相当):1A Day1</p> <p>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1</p> <p>ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注射液 (ｵｰﾀﾞｰ用) :0m g /A Day1</p> <p>ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :15m g /kg Day1</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液1.65mg(ﾘﾝｳ酸塩2mg相当):2A Day15</p> <p>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1</p>	4 婦人科/1. 卵巣がん
ddTC+BEV療法【2回目以降】	15	6	<p>ｸﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day8 Day15</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液1.65mg(ﾘﾝｳ酸塩2mg相当):2A Day8 Day1 Day15</p> <p>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day1 Day15</p> <p>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day1 Day15</p> <p>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 Day15</p> <p>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g / m l Day8 Day1 Day15</p> <p>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 Day15</p> <p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1</p> <p>パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1</p> <p>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1</p> <p>ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注射液 (ｵｰﾀﾞｰ用) :0m g /A Day1</p> <p>ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :15m g /kg Day1</p> <p>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1</p>	4 婦人科/1. 卵巣がん
ddTC療法【初回用】	15	6	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1</p> <p>パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液6.6mg (ﾘﾝｳ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液1.65mg(ﾘﾝｳ酸塩2mg相当):1A Day1</p> <p>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15</p> <p>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15</p> <p>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g / m l Day1 Day8 Day15</p> <p>ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注射液 (ｵｰﾀﾞｰ用) :0m g /A Day1</p> <p>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1</p> <p>ｸﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day8 Day15</p> <p>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15</p>	4 婦人科/1. 卵巣がん
ddTC療法【2回目以降】	15	6	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1</p> <p>パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液1.65mg(ﾘﾝｳ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15</p> <p>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15</p> <p>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15</p> <p>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g / m l Day1 Day8 Day15</p> <p>ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注射液 (ｵｰﾀﾞｰ用) :0m g /A Day1</p> <p>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1</p> <p>ｸﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day8 Day15</p> <p>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15</p>	4 婦人科/1. 卵巣がん
ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ (ｱﾊﾞｽﾁﾝ) 維持療法	1	20	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1</p> <p>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1</p> <p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1</p>	4 婦人科/1. 卵巣がん
TPT+PTX+Bev療法《子宮頸癌》	3	18	<p>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3</p> <p>パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液6.6mg (ﾘﾝｳ酸塩8mg相当) :2V Day1</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液1.65mg(ﾘﾝｳ酸塩2mg相当):2A Day1</p> <p>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1</p> <p>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1</p> <p>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1 Day2 Day3</p> <p>ﾊｲｶﾑﾁﾝ点滴静注液 1 m g / 1 m L * :0.75m g / m l Day1 Day2 Day3</p> <p>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1</p> <p>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:175m g / m l Day1</p> <p>ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :15m g /kg Day1</p> <p>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1 Day2 Day3</p> <p>ﾎﾟﾎﾟﾙﾏﾝ注射液6.6mg (ﾘﾝｳ酸塩8mg相当) :1V Day2 Day3</p> <p>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3</p>	4 婦人科/2. 子宮頸がん

CDDP（CCRT）療法	1	6	生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 硫酸 M g 補正液 1 mEq / m l : 0.4A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 バロノセトロン静注 0.75mg / 5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 テ`キート注射液 6.6mg (リ`酸塩 8mg 相当) : 1 V Day1 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当) : 2 A Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダ用）: 40m g / m l Day1 マンニトール S 注射液 3 0 0 m l : 300mL Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L : 1 袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
CPT-11+CDGP(NDP)療法	8	13	大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 バロノセトロン静注 0.75mg / 5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 Day8 テ`キート注射液 6.6mg (リ`酸塩 8mg 相当) : 1 V Day1 Day8 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当) : 1 A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）: 60m g / m l Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 アクブラ注（オーダ用）: 80m g / m l Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L : 1 袋 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8	4 婦人科/2. 子宮頸がん
CPT-11単剤療法	15	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1 袋 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 テ`キート注射液 6.6mg (リ`酸塩 8mg 相当) : 1 V Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）: 100m g / m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15	4 婦人科/2. 子宮頸がん
DC療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 バロノセトロン静注 0.75mg / 5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 テ`キート注射液 6.6mg (リ`酸塩 8mg 相当) : 1 V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」（オーダ用）: 70mg / m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 カルボプラチン注射液（オーダー用）: 0m g / A Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
DTX+BEV療法	8	13	バロノセトロン静注 0.75mg / 5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 Day8 テ`キート注射液 6.6mg (リ`酸塩 8mg 相当) : 1 V Day1 Day8 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当) : 2 A Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 Day8 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」（オーダ用）: 40mg / m l Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 アバスチン点滴静注用（オーダ用）: 15m g / kg Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
TC+BEV療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 バロノセトロン静注 0.75mg / 5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 テ`キート注射液 6.6mg (リ`酸塩 8mg 相当) : 2 V Day1 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当) : 2 A Day1 ファモチジン静注液 20m g「サワイ」（20mL / A）: 1 A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l : 1 瓶 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」: 175m g / m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1 カルボプラチン注射液（オーダー用）: 0m g / A Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）: 15m g / kg Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
TC+Bev療法CBDCA脱感作	2	19	〈ロック用〉ヘパリン Na 100 単位 / mL シリンジ「オーカ」10mL : 1 筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day2 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day2 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当) : 2 A Day2 Day1 テ`キート注射液 6.6mg (リ`酸塩 8mg 相当) : 2 V Day2 Day1 ファモチジン静注液 20m g「サワイ」（20mL / A）: 1 A Day2 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day2 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day2 カルボプラチン注射液（オーダー用）: 0m g / A Day2 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day2 バロノセトロン静注 0.75mg / 5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l : 1 瓶 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」: 175m g / m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 100m l Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）: 15m g / kg Day1 大塚生食注 5 0 m l : 50m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
TC+Bev + Pem療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 バロノセトロン静注 0.75mg / 5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 テ`キート注射液 6.6mg (リ`酸塩 8mg 相当) : 2 V Day1 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当) : 2 A Day1 ファモチジン静注液 20m g「サワイ」（20mL / A）: 1 A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l : 1 瓶 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」: 175m g / m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1 カルボプラチン注射液（オーダー用）: 0m g / A Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）: 15m g / kg Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1 瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 100m l Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
Bev + Pem療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）: 15m g / kg Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 100m l Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
Pemb400mg療法（6wks毎投与）	1	41	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 100m l Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 400m g Day1 大塚生食注 5 0 m l : 50m l Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん

TC療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) : 2 V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当): 2 A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) : 1 A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l : 1 瓶 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」: 175m g / m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ`用) : 0m g / A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
TIP療法	3	25	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) : 1 A Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当): 2 A Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) : 2 V Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l : 1 瓶 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」: 175m g / m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ`用) : 0m g / A Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1 筒 Day1 Day2 Day3 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day2 Day3 イホマイド ( I F X ) 注射用 1 g : 1500m g / m l Day2 Day3 生理食塩液バッグ「フソー」1 L : 1 袋 Day2 Day3 ウロミキサン注 4 0 0 m g 4 m l : 1 . 5 A Day2 Day3 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
TN (NDP/CDGP)療法	1	20	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当): 2 A Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) : 2 V Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) : 1 A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」: 175m g / m l Day1 アクブラ注 (オーダ`用) : 80m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
TP+BEV療法	2	26	アバスチン点滴静注用 (オーダ`用) : 15m g / kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1 筒 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) : 2 V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当): 2 A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) : 1 A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l : 1 瓶 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」: 175m g / m l Day1 ソルアセト F 輸液 5 0 0 m L / 袋: 1 袋 Day1 硫酸 M g 補正液 1 mEq/m l : 0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l : 1 瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ`用) : 50m g / m l Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L : 1 袋 Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
TP+Bev+Pem療法	2	19	アバスチン点滴静注用 (オーダ`用) : 15m g / kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1 筒 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) : 2 V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当): 2 A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) : 1 A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l : 500m l Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」: 175m g / m l Day1 ソルアセト F 輸液 5 0 0 m L / 袋: 1 袋 Day1 硫酸 M g 補正液 1 mEq/m l : 0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l : 1 瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 250m l Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ`用) : 50m g / m l Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L : 1 袋 Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 大塚生食注 5 0 m l : 50m l Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 100m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1 筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
TP療法	2	19	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) : 2 V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当): 2 A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) : 1 A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l : 1 瓶 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」: 175m g / m l Day1 ソルアセト F 輸液 5 0 0 m L / 袋: 1 袋 Day1 硫酸 M g 補正液 1 mEq/m l : 20ml Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l : 1 瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ`用) : 50m g / m l Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L : 1 袋 Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん

ddTC+BEV療法【初回用】	15	6	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day8 Day15 テキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day8 Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）:1A Day8 Day1 Day15 ボラミン注 5mg1mL:1A Day8 Day1 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 パクリタキセル注100mg/16.7mL〔NK〕:80mg/mL Day8 Day1 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL〔タイホウ〕:1瓶 Day1 テキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液（オーダ用）:0mg/A Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:15mg/kg Day1 テキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:2A Day15 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
ddTC+BEV療法【2回目以降】	15	6	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day8 Day15 テキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:2A Day8 Day1 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）:1A Day8 Day1 Day15 ボラミン注 5mg1mL:1A Day8 Day1 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 パクリタキセル注100mg/16.7mL〔NK〕:80mg/mL Day8 Day1 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL〔タイホウ〕:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液（オーダ用）:0mg/A Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:15mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
ddTC療法【初回用】	15	6	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL〔タイホウ〕:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 Day8 テキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）:1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注100mg/16.7mL〔NK〕:80mg/mL Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注射液（オーダ用）:0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15 テキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:2A Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	4 婦人科/2. 子宮頸がん
ddTC療法【2回目以降】	15	6	アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL〔タイホウ〕:1瓶 Day1 テキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）:1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注100mg/16.7mL〔NK〕:80mg/mL Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注射液（オーダ用）:0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15	4 婦人科/2. 子宮頸がん
セミプリマブ350mg	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 リブタヨ点滴静注 350mg/7mL*:350mg Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
TV（テブダック）療法	1	20	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 アイファガン点眼液0.1% 5mL/瓶:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 テブダック点滴静注用40mg*:2mg/kg Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day8 Day15	4 婦人科/2. 子宮頸がん
CCRT+Pemb療法(21日間Pemb①+②=day42まで)	15	6	硫酸Mg補正液 1mEq/mL（20mL/A）:0.4A Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL〔タイホウ〕:1瓶 Day8 Day15 テキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day8 Day15 テキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:2A Day8 Day15 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day8 Day15 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダ用）:40mg/mL Day8 Day15 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day8 Day15 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day8 Day15 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL*:200mg Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
CCRT+Pemb療法（Pemb200 Q3wks）③-⑤kurまで	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:100mL Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL*:200mg Day1 大塚生食注 50mL:50mL Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
CCRT+Pemb療法（Pemb400 Q6wks）⑥-⑩kur/24Mまで	1	41	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:100mL Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL*:400mg Day1 大塚生食注 50mL:50mL Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1	4 婦人科/2. 子宮頸がん
AP療法	2	19	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL〔タイホウ〕:1瓶 Day1 テキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:1A Day1 テキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 ドキシソルビン塩酸塩注射液（オーダ用）:60mg/mL Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:0.4A Day1 生理食塩液「ヒカリ」500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダ用）:50mg/mL Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day2 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLリソパ「オカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌（癌肉腫・肉腫）

DC療法	1	20	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :70mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
DP療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :250m l Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :70mg/m Day1 ソルアセトF輸液 5 0 0 m L /袋:1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l :8ml Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :500m l Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :60m g /m Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L :1袋 Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
DTX療法	1	20	バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :70mg/m Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
GD療法 (肉腫系)	1	20	テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :2V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :900m g /m Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
IAP療法	5	16	ソルアセトF輸液 5 0 0 m L /袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day1 イホマイド ( I F X ) 注射用 1 g :1200m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ウロミテキサン注 4 0 0 m g 4 m l :300m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50m g /m Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :50m g /m Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
IP療法	4	17	生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day2 Day3 Day4 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :1V Day2 Day3 Day4 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :20m g /m Day2 Day3 Day4 Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 メイロン静注 7 % 2 0 m L :2A Day2 Day3 Day4 Day1 イホマイド ( I F X ) 注射用 1 g :1500m g /m Day2 Day3 Day4 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day4 Day1 ウロミテキサン注 4 0 0 m g 4 m l :1.5A Day2 Day3 Day4 Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A輸液 1 L :1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
TC療法	1	20	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :2V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」:175m g /m Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
TC療法CBDCA脱感作	2	19	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day2 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day2 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day2 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :2V Day2 Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day2 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day2 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」:175m g /m Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
TN (NDP/CDGP)療法	1	20	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`酸塩2mg相当):2A Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`酸塩8mg相当) :2V Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」:175m g /m Day1 アクブラ注 (オーダ用) :80m g /m Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)

weekly TN療法	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :2V Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NKJ」:60m g /m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 アクブラ注 (オーダー用) :80m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):1A Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
ペムプロリズマブ+レンパチニブ療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
エリブリン (子宮肉腫)	8	13	大塚生食注 5 0 m l :20m l Day1 Day8 ハラヴエン静注 1 m g / 2 m L * :1.4mg /m l Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
TC+Pemb療法①～⑥	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :2V Day1 デキサート注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NKJ」:175m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
推奨 Pemb維持 (400Q6wks) ⑦-⑳開始から最大24ヶ月	1	41	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :400m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
Pemb維持 (200 Q3wks) 〈⑦-開始から最大24ヶ月〉	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
TC+Durv±Ola (1-6kur)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 イミフィンジ点滴静注 (オーダー用) * :1120mg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :2V Day1 デキサート注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NKJ」:175m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
Durv±Ola (維持)	1	27	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 イミフィンジ点滴静注 (オーダー用) * :1500mg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)
EMA/CO療法	8	6	(GE-リタ)ソルテム3 A輸液 5 0 0 m L :500m l Day1 Day2 Day8 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HKJ」:0.5m g /kg Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1 Day2 Day8 コスメゲン静注用 0 . 5 m g * :0.5m g /kg Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :500m l Day1 Day2 Day8 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド」 5 m l :100m g /m l Day1 Day2 注射用メソトレキセート 5 0 mg :300m g /m l Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HKJ」:1袋 Day2 オンコビン (V C R) 注 1 m g :1m g /m l Day8 エンドキサン注 (オーダー用) :600m g /m l Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8	4 婦人科/4. 絨毛性疾患
EMA/EP療法	9	5	(GE-リタ)ソルテム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day8 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8 生理食塩液バッグ「フソー」 1 L :1袋 Day1 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド」 5 m l :100m g /m l Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダー用) :75m g /m l Day1 ソルアセトF輸液 5 0 0 m L /袋:1袋 Day1 Day2 Day3 ラシックス注 1 0 0 m g 1 0 m l :1A Day1 Day2 Day3 プリンペラン注射液 1 0 m g 2 m l :20m g Day2 Day3 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2 Day3 Day9 グラニセトロン静注液 3 m g シリンジ「サワイ」:1筒 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day9 コスメゲン静注用 0 . 5 m g * :0.5m g /m l Day8 注射用メソトレキセート 5 0 mg :300m g /m l Day8	4 婦人科/4. 絨毛性疾患
MTX単剤筋注療法	1	0	注射用メソトレキセート 5 0 mg :50m g /m l Day1	4 婦人科/4. 絨毛性疾患
MTX療法(5日間)	5	9	注射用メソトレキセート 5 0 mg :0.4m g /kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	4 婦人科/4. 絨毛性疾患
異所性妊娠 MTX単剤筋注療法	1	0	注射用メソトレキセート 5 0 mg :50m g /m l Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :1A Day1	4 婦人科/A. 異所性妊娠
ペムプロリズマブ療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	4 婦人科/Z. その他

ドキシル	1	12	ブドウ糖注射液 5%250m l :1瓶 Day1 ドキシル注 20mg/10m L *:20mg/m Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1	5 感染症内科/1. カボジ肉腫
パクリタキセル	1	12	パクリタキセル注100mg/16.7m l「NK」:100mg/m Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):1A Day1 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 ﾌﾏﾓﾁｼﾞﾝ静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg1m l :1A Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day1	5 感染症内科/1. カボジ肉腫
リツキシマブ単独 (キャスルマン病)	1	6	リツキシマブBS「ファイザー」(ﾎﾞｰﾀﾞ用) :375mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500m L :500m l Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day1 ソル・ｺｰﾃﾌ注射用100mg (溶解液付) :1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg1m l :1A Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1	5 感染症内科/2. キャスルマン病
R-Dox療法 (キャスルマン病)	2	19	リツキシマブBS「ファイザー」(ﾎﾞｰﾀﾞ用) :375mg/m Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500m L :500m l Day2 大塚生食注 50m l :1瓶 Day2 ソル・ｺｰﾃﾌ注射用100mg (溶解液付) :1瓶 Day2 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg1m l :1A Day2 大塚糖液5% 100m L :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250m l :1袋 Day1 ドキシル注 20mg/10m L *:20mg/m Day1 ブドウ糖注射液 5%50m l :1瓶 Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day2	5 感染症内科/2. キャスルマン病
ADM 末梢	2	19	ドキシルピシﾞﾝ塩酸塩注射用 (ﾎﾞｰﾀﾞ用) :37.5mg/m Day1 Day2 大塚蒸留水100m L :1瓶 Day1 Day2	6 整形外科
ADM 中枢	2	19	ドキシルピシﾞﾝ塩酸塩注射用 (ﾎﾞｰﾀﾞ用) :37.5mg/m Day1 Day2 大塚蒸留水 (注射用水) 20m l :2.4A Day1 Day2	6 整形外科
DOX+CBDCA 末梢	2	18	ドキシルピシﾞﾝ塩酸塩注射用 (ﾎﾞｰﾀﾞ用) :37.5mg/m Day1 Day2 大塚蒸留水100m L :1瓶 Day1 Day2 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 ｶﾙﾎﾞﾌﾞﾗﾁﾝ注射液 (ﾎﾞｰﾀﾞｰ用) :0mg/A Day1	6 整形外科
DOX+CBDCA : 中枢	2	19	ドキシルピシﾞﾝ塩酸塩注射用 (ﾎﾞｰﾀﾞ用) :37.5mg/m Day1 Day2 大塚蒸留水 (注射用水) 20m l :2.4A Day1 Day2 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 ｶﾙﾎﾞﾌﾞﾗﾁﾝ注射液 (ﾎﾞｰﾀﾞｰ用) :0mg/A Day1	6 整形外科
ハラヴェン : 整形	1	6	ハラヴェン静注 1mg:1.4mg/m Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day1	6 整形外科
Gem+Doce	8	13	(GE-ﾘｸﾀ)ソルﾃﾞﾑ3A輸液500m L :1袋 Day1 Day8 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/100m l「HK」:1袋 Day1 Day8 ｸﾞﾑｼﾅﾋﾞﾝ点滴静注液「NK」 (ﾎﾞｰﾀﾞ用) :900mg/m Day1 Day8 大塚糖液5% 100m L :1瓶 Day1 Day8 ﾄｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ﾆﾌﾛ」(ﾎﾞｰﾀﾞ用) :100mg/m Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day8 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 Day8	6 整形外科
CBDCA/Pacli	1	20	大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :2V Day1 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/100m l「HK」:1袋 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg1m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 パクリタキセル注100mg/16.7m l「NK」:175mg/m Day1 ｶﾙﾎﾞﾌﾞﾗﾁﾝ点滴静注液 (ﾎﾞｰﾀﾞ用) :0mg/A Day1	6 整形外科
Weekly pacli	1	6	大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 パクリタキセル注100mg/16.7m l「NK」:100mg/m Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :2V Day1 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/100m l「HK」:1袋 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg1m l :1A Day1	6 整形外科
新_ﾓﾝﾃﾞﾘｽ	2	19	ﾓﾝﾃﾞﾘｽ点滴静注用 0.25mg *:1.2mg/m Day1 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」1L :1袋 Day1 ブドウ糖注射液 5%250m l :1瓶 Day1 Day2 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/100m l「HK」:1袋 Day1 Day2 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :2V Day1 Day2 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1	6 整形外科
A+I 中枢 4days	4	17	ドキシルピシﾞﾝ塩酸塩注射用 (ﾎﾞｰﾀﾞ用) :35mg/m Day1 Day2 大塚蒸留水 (注射用水) 20m l :2.4A Day1 Day2 ｲﾎﾞﾏｲﾄ (IFX) 注射用 1g :2500mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 500m L :480m l Day1 Day2 Day3 Day4	6 整形外科
A+I 中枢 5days	5	16	ドキシルピシﾞﾝ塩酸塩注射用 (ﾎﾞｰﾀﾞ用) :35mg/m Day1 Day2 大塚蒸留水 (注射用水) 20m l :2.4A Day1 Day2 ｲﾎﾞﾏｲﾄ (IFX) 注射用 1g :2000mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500m L :480m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	6 整形外科
A+I 末梢 4days	4	17	ドキシルピシﾞﾝ塩酸塩注射用 (ﾎﾞｰﾀﾞ用) :35mg/m Day1 Day2 大塚蒸留水100m L :1瓶 Day1 Day2 ｲﾎﾞﾏｲﾄ (IFX) 注射用 1g :2500mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 500m L :0.96袋 Day1 Day2 Day3 Day4	6 整形外科
A+I 末梢 5days	5	16	ドキシルピシﾞﾝ塩酸塩注射用 (ﾎﾞｰﾀﾞ用) :35mg/m Day1 Day2 大塚蒸留水100m L :1瓶 Day1 Day2 ｲﾎﾞﾏｲﾄ (IFX) 注射用 1g :2000mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500m L :480m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	6 整形外科
A+C 中枢	2	18	ドキシルピシﾞﾝ塩酸塩注射用 (ﾎﾞｰﾀﾞ用) :45mg/m Day1 Day2 大塚蒸留水 (注射用水) 20m l :2.4A Day1 Day2 ｼｽﾌﾞﾗﾁﾝ点滴静注「マルｺ」(ﾎﾞｰﾀﾞ用) :60mg/m Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500m L :0.6袋 Day1 Day2	6 整形外科
A+C 末梢	2	18	ドキシルピシﾞﾝ塩酸塩注射用 (ﾎﾞｰﾀﾞ用) :45mg/m Day1 Day2 大塚蒸留水100m L :1瓶 Day1 Day2 ｼｽﾌﾞﾗﾁﾝ点滴静注「マルｺ」(ﾎﾞｰﾀﾞ用) :60mg/m Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500m L :0.6袋 Day1 Day2	6 整形外科
DAV-I	5	16	(GE-ﾘｸﾀ)ソルﾃﾞﾑ1輸液200m L :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ｵﾝｺﾋﾞﾝ (VCR) 注 1mg :1.5mg/m Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20m l :0.5A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ﾆﾄﾞﾗﾝ (ACNU) 注射用 50mg *:80mg/m Day1 ﾀｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ注 100mg :140mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ﾌﾚｵﾝ注射用300万国際単位 (溶解液付) :2瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	6 整形外科
Irinotecan	5	2	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液(ﾎﾞｰﾀﾞ用):20mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注射液 5%250m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/100m l「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソﾙ・ﾓﾄﾛｰﾙ静注用 125mg :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	6 整形外科

ICE	3	18	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用):0mg/A Day1 イホマイド (IFX) 注射用 1g:3000mg/mL Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:480mL Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 100mg「サド」 5mL:100mg/mL Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 Day2 Day3	6 整形外科
IE	5	9	エトボシド点滴静注液 100mg「サド」 5mL:100mg/mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イホマイド (IFX) 注射用 1g:2000mg/mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	6 整形外科
HD-IFO 4days	4	17	イホマイド (IFX) 注射用 1g:3500mg/mL Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:480mL Day1 Day2 Day3 Day4	6 整形外科
HD-IFO 5days	5	16	イホマイド (IFX) 注射用 1g:3000mg/mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:480mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	6 整形外科
HD-IFO 6days	6	15	イホマイド (IFX) 注射用 1g:2500mg/mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:480mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6	6 整形外科
IFM 4days bolus	4	10	イホマイド (IFX) 注射用 1g:3000mg/mL Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4	6 整形外科
MTX 6H	1	6	注射用メソトレキセート (オーダー用):12000mg/mL Day1 メイロン静注 7%20mL:3A Day1 ソルデム3A輸液 200mL:1袋 Day1	6 整形外科
MTX+VLB	1	6	(GE-リタ)ソルデム1輸液 500mL:1瓶 Day1 メイロン静注 7%20mL:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20mL:0.5A Day1 エクザール (VBL) 10mg:5mg/mL Day1 注射用メソトレキセート 50mg:30mg/mL Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	6 整形外科
VDC 中枢	2	12	オンコピン (VCR) 注 1mg:1.5mg/mL Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20mL:0.5A Day1 エンドキサン注 (オーダー用):1200mg/mL Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (オーダー用):37.5mg/mL Day1 Day2 大塚蒸留水 (注射用水) 20mL:2.4A Day1 Day2	6 整形外科
VDC 末梢	2	12	オンコピン (VCR) 注 1mg:1.5mg/mL Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20mL:0.5A Day1 エンドキサン注 (オーダー用):1200mg/mL Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (オーダー用):37.5mg/mL Day1 Day2 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day1 Day2	6 整形外科
2020-0005 ALBERT	1	17	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 治)アテリスマ注(1200mg/20mL)[20200005]:1200mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	6 整形外科
Docetaxel,estramustine療法	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダー用):50mg/mL Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	7 泌尿器科/1. 前立腺がん
カバジタキセル (入院用)	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 ジェブタナ点滴静注60mg/1.5mL *:25mg/mL Day1	7 泌尿器科/1. 前立腺がん
カバジタキセル (外来用)	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 ジェブタナ点滴静注60mg/1.5mL *:25mg/mL Day1	7 泌尿器科/1. 前立腺がん
ドセタキセル	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダー用):70mg/mL Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1	7 泌尿器科/1. 前立腺がん
ダロルタミド+ドセタキセル併用療法	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダー用):75mg/mL Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1	7 泌尿器科/1. 前立腺がん
ECb (エトボシド+カルボプラチン) 併用療法	3	18	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:100mL Day1 Day2 Day3 デキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 100mg「サド」 5mL:100mg/mL Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5%250mL:1袋 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダー用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3	7 泌尿器科/2. 前立腺小細胞癌
EP (エトボシド+シスプラチン) 併用療法	3	18	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 デキサート注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 100mg「サド」 5mL:100mg/mL Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 ソルデム3A輸液 200mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダー用):80mg/mL Day1	7 泌尿器科/2. 前立腺小細胞癌

GC(3週 short hydration)	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「N K」 (オーダ用) :1000m g /m l Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :8ml Day2 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day2 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :70m g /m l Day2 (GE-リタ)ソルデム1 輸液 5 0 0 m L :1瓶 Day2 ラシックス注 2 0 m g 2 m l :1A Day2 ラシックス注 2 0 m g 2 m l :1A Day2	7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌
GC(3週毎)	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「N K」 (オーダ用) :1000m g /m l Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day8 (GE-リタ)ソルデム3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 ソルアセト F 輸液 1 L :1袋 Day2 (GE-リタ)ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :8ml Day2 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day2 生理食塩液バッグ「フソー」1 L :1袋 Day2 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :70m g /m l Day2 (GE-リタ)ソルデム1 輸液 5 0 0 m L :1瓶 Day2 ラシックス注 2 0 m g 2 m l :1A Day2 (GE-リタ)ソルデム1 輸液 2 0 0 m l :1瓶 Day8	7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌
M-VAC療法	22	6	生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day15 Day22 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day2 Day15 Day22 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day15 Day22 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day15 Day22 注射用メソトレキセート 5 0 mg :30m g /m l Day1 Day15 Day22 (GE-リタ)ソルデム3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L :1袋 Day2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day15 Day22 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :30m g /m l Day2 エクザール (V B L) 1 0 mg :3m g /m l Day2 Day15 Day22 (GE-リタ)ソルデム1 輸液 5 0 0 m L :1瓶 Day2 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day2 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :70m g /m l Day2 (GE-リタ)ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day15 Day22 ラシックス注 2 0 m g 2 m l :1A Day2	7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌
アベルマブ維持療法	1	13	アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g「マルイシ」:3錠 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 パベンチオ点滴静注200m g * :10m g /kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1	7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌
パドセブ療法	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day8 Day15 パドセブ点滴静注用 (オーダ用) :1.25m g /kg Day1 Day8 Day15	7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌
ベムプロリズマブ+エンホルツマブ ベドチン療法	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day8 Day1 パドセブ点滴静注用 (オーダ用) :1.25m g /kg Day8 Day1	7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌
ベムプロリズマブ療法 [q3w]	1	20	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌
ベムプロリズマブ療法【q6W】	1	41	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :400m g Day1	7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌
術後ニボルマブ療法 [q2W]	1	13	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m L * :240m g Day1	7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌
術後ニボルマブ療法【q4W】	1	27	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m L * :480m g Day1	7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌
ゲムシタピン/カルボプラチン療法	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day8 ゲムシタピン点滴静注液「N K」 (オーダ用) :1000m g /m l Day8 Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day8 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0m g /A Day1	7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌
ゲムシタピン/パクリタキセル併用療法	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :3V Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」:200m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「N K」 (オーダ用) :1000m g /m l Day1 Day8 Day15 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15	7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌

ゲムシタビン/パクリタキセル併用療法【透析症例】	15	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day15 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):1A Day1 Day15 ﾌﾏﾓﾁｼﾞﾝ静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day15 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day15 ﾊｸﾘﾀｷｾﾙ注100mg/16.7mL「NK」:110mg/㎡ Day1 Day15 ゲムシタビン点滴静注液「NK」 (オーダー用):1000mg/㎡ Day1 Day15 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day15	7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌
カボザンチニブ・ニボルマブ併用療法 (q2W)	1	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 ｵﾌﾞｼｰﾎﾞ点滴静注 240mg / 24mL :240mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
カボザンチニブ・ニボルマブ併用療法【q4W】	1	27	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 ｵﾌﾞｼｰﾎﾞ点滴静注 240mg / 24mL :480mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
テムシロリムス単剤療法	1	6	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 ﾄｰﾘｾﾙ点滴静注液 25mg *:25mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
ニボルマブ療法(腎癌)【q2W】	1	13	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ｵﾌﾞｼｰﾎﾞ点滴静注用 240mg / 24mL *:240mg Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
ニボルマブ療法(腎癌)【q4W】	1	27	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ｵﾌﾞｼｰﾎﾞ点滴静注用 240mg / 24mL *:480mg Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
ベムプロリズマブ・アキシチニブ併用療法 (q3W)	1	20	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ｷｲﾄﾙｰｸ点滴静注 100mg / 4mL *:200mg Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
ベムプロリズマブ・アキシチニブ併用療法【q6W】	1	41	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ｷｲﾄﾙｰｸ点滴静注 100mg / 4mL *:400mg Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
ベムプロリズマブ・レンパチニブ療法 (q3W)	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 ｷｲﾄﾙｰｸ点滴静注 100mg / 4mL *:200mg Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
ベムプロリズマブ・レンパチニブ療法【q6W】	1	41	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 ｷｲﾄﾙｰｸ点滴静注 100mg / 4mL *:400mg Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
(ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ併用療法 5ｺｰｽ目以降) ニボルマブ【q4w】	1	27	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ｵﾌﾞｼｰﾎﾞ点滴静注用 240mg / 24mL *:480mg Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
(ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ併用療法 5ｺｰｽ目以降) ニボルマブ【q2w】	1	13	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ｵﾌﾞｼｰﾎﾞ点滴静注用 240mg / 24mL *:240mg Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
ニボルマブ・イビリムマブ併用療法	1	20	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ｵﾌﾞｼｰﾎﾞ点滴静注用 240mg / 24mL *:240mg Day1 大塚生食注 50mL:0.4瓶 Day1 ﾔｰﾎﾞｲ点滴静注液(オーダー用) *:1mg/kg Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
(術後補助)ベムプロリズマブ療法【q3W】	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 ｷｲﾄﾙｰｸ点滴静注 100mg / 4mL *:200mg Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
(術後補助)ベムプロリズマブ療法【q6W】	1	41	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ｷｲﾄﾙｰｸ点滴静注 100mg / 4mL *:400mg Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
アキシチニブ+アベルマブ療法	1	13	ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｴﾝ錠 200mg「マルイシ」:3錠 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ﾎﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 ﾊﾞﾍﾞﾝﾁｵ点滴静注200mg/10mL *:10mg/kg Day1	7 泌尿器科/4. 腎細胞癌
CBDC併用放射線療法	1	6	ｸﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ 3mg / 100mL「HK」:1袋 Day1 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5% 250mL:1瓶 Day1 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注射液 (オーダー用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	7 泌尿器科/5. 膀胱癌
CDDP併用放射線療法	5	16	ｼｬﾛｱｾﾄﾌ 輸液 500mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ｸﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ 3mg / 100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (GE-ｼｬﾀ)ｼｬﾛﾃﾞﾑ3A輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (GE-ｼｬﾀ)ｼｬﾛﾃﾞﾑ3A輸液 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「マルコ」(オーダー用):20mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	7 泌尿器科/5. 膀胱癌
Docetaxel,Gemcitabine併用療法	8	13	ｸﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ 3mg / 100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 ゲムシタビン点滴静注液「NK」 (オーダー用):800mg/㎡ Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 ﾃﾞｷﾞｷｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :3V Day8 ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5% 250mL:1瓶 Day8 ﾄｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ニプロ」(オーダー用):60mg/㎡ Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8	7 泌尿器科/5. 膀胱癌

術前GC+デュルバルマブ療法	8	13	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/mL Day1 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day8 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day2 Day8 Day1 デキサト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):8ml Day2 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day2 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day2 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):70mg/mL Day2 (GE-リタ)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day2 ラシックス注 20mg/2mL:1A Day2 (GE-リタ)ソルデム1輸液200mL:1瓶 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注 (オーダ用) *:1500mg Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 ソルアセトF輸液 1L/袋:1袋 Day2 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8	7 泌尿器科/5. 膀胱癌
術前splitGC+デュルバルマブ療法	9	12	ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/mL Day1 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day8 Day9 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 Day9 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day2 Day8 Day9 Day1 デキサト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day2 Day9 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 Day9 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):8ml Day2 Day9 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day2 Day9 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day2 Day9 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):35mg/mL Day2 Day9 (GE-リタ)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day2 Day9 ラシックス注 20mg/2mL:1A Day2 Day9 ソルアセトF輸液 1L/袋:1袋 Day9 Day2 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day9 Day2 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day8 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注 (オーダ用) *:1500mg Day1	7 泌尿器科/5. 膀胱癌
術後デュルバルマブ療法	1	27	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注 (オーダ用) *:1500mg Day1	7 泌尿器科/5. 膀胱癌
BEP療法(泌)	16	5	ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day16 Day9 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトポシド点滴静注液100mg「サド」5mL:100mg/mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day16 Day9 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):20mg/mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day16 Day9 ラシックス注 20mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プレオ(Bleo)注 15mg *:30mg Day2 Day16 Day9 グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」:1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day9 Day16 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day7 Day3 Day4 Day5 Day6 Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day7 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 (GE-リタ)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day7 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 Day1 アクブラ注 (オーダ用):100mg/mL Day2 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 Day2 イホマイド(IFX)注射用 1g:1200mg/mL Day3 Day4 Day5 Day6 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):3V Day1 バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」:210mg/mL Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day1 ラシックス注 20mg/2mL:0.5A Day2 ウロミデキサン注 400mg/4mL:1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	7 泌尿器科/6. 精巣腫瘍
TIN療法	7	21	ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):3A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」:175mg/mL Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):25mg/mL Day1 Day2 Day3 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 イホマイド(IFX)注射用 1g:1200mg/mL Day1 Day2 Day3 ウロミデキサン注 400mg/4mL:1A Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 デキサト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 オンコピン(VCR)注 1mg:1.4mg/mL Day1 エンドキサン注 (オーダ用):750mg/mL Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day2 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 Day2 ダカルバジン注 100mg:600mg/mL Day1 Day2	7 泌尿器科/6. 精巣腫瘍
カルボプラチン療法	1	1	ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」:175mg/mL Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):25mg/mL Day1 Day2 Day3 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 イホマイド(IFX)注射用 1g:1200mg/mL Day1 Day2 Day3 ウロミデキサン注 400mg/4mL:1A Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 デキサト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 オンコピン(VCR)注 1mg:1.4mg/mL Day1 エンドキサン注 (オーダ用):750mg/mL Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day2 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 Day2 ダカルバジン注 100mg:600mg/mL Day1 Day2	7 泌尿器科/7. 陰茎癌
TIP療法【泌尿器】	4	17	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 デキサト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 オンコピン(VCR)注 1mg:1.4mg/mL Day1 エンドキサン注 (オーダ用):750mg/mL Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day2 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 Day2 ダカルバジン注 100mg:600mg/mL Day1 Day2	7 泌尿器科/8. 褐色細胞腫
CVD療法	2	19	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 デキサト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 オンコピン(VCR)注 1mg:1.4mg/mL Day1 エンドキサン注 (オーダ用):750mg/mL Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day2 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 Day2 ダカルバジン注 100mg:600mg/mL Day1 Day2	7 泌尿器科/8. 褐色細胞腫

ドキシルピシン単剤療法	1	20	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3	7 泌尿器科/9. 軟部肉腫
EP（エトボシド+シスプラチン併用）療法	3	18	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 100mg「サド」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液200mL:1袋 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3	7 泌尿器科/A.尿路原発小細胞癌
ECb（エトボシド+カルボプラチン併用）療法	3	18	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:100mL Day1 Day2 Day3 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 100mg「サド」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5%250mL:1袋 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3	7 泌尿器科/A.尿路原発小細胞癌
アムルピシン（カルセド）単剤治療	3	18	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day1 Day3 カルセド注射用 (オーダ用) *:45mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1	7 泌尿器科/A.尿路原発小細胞癌
食道Tislelizumab単剤	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 テビムプラ点滴静注 100mg/10mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
NAC FP	5	16	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用):800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg2mL:0.5A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day5	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
NAF	5	16	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用):30mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 アクブラ注 (オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day5 Day4 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用):700mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day5 Day4 大塚生食注 50mL:1瓶 Day5 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day5	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道FP	5	23	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用):800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg2mL:0.5A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day5	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道DCF	5	16	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用):700mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg2mL:0.5A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day5	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
分割DCF	15	13	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day15 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):30mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用):800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg2mL:0.5A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day15 Day5 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day15 Day5	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌

食道mFOLFOX6（入院）	2	12	(GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 （オーダ用）:1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 （オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 （オーダ用）:85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 （オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道mFOLFOX6（ポンプ）	1	13	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 （オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 （オーダ用）:85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 （オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 （オーダ用）:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道SOX	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 （オーダ用）:130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道FP+Pembrolizumab療法	5	16	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):1A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」 1 L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トーフ」 （オーダ用）:800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 （オーダ用）:80mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg/2mL:0.5A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day5 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL （20mL/A）:0.4A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道FP+PembrolizumabのPembroのみ	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道FP+Nivolumab【Nivo2週間隔】	15	13	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL （20mL/A）:0.4A Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 （オーダ用）:800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液バッグ「フソー」 1 L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」 （オーダ用）:80mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-リタ)ソルデム3 A輸液 500mL:1袋 Day1 ラシックス注 20mg/2mL:0.5A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day15 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):1A Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 Day15 オブジーボ点滴静注（オーダ用）:240mg Day1 Day15	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道FP+Nivolumab【Nivo4週間隔】	5	23	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL （20mL/A）:0.4A Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 （オーダ用）:800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液バッグ「フソー」 1 L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」 （オーダ用）:80mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-リタ)ソルデム3 A輸液 500mL:1袋 Day1 ラシックス注 20mg/2mL:0.5A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day5 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 オブジーボ点滴静注（オーダ用）:480mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道5-FU+Nivolumab【Nivo2週間隔】	15	13	フルオロウラシル注「トーフ」 （オーダ用）:800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液バッグ「フソー」 1 L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100mL:1瓶 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day15 Day5 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 Day15 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 Day15 オブジーボ点滴静注（オーダ用）:240mg Day1 Day15	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道5-FU+Nivolumab【Nivo4週間隔】	5	23	フルオロウラシル注「トーフ」 （オーダ用）:800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液バッグ「フソー」 1 L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day5 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 オブジーボ点滴静注（オーダ用）:480mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道ニボルマブ・イビリマブ療法（Nivo2週間隔）	29	13	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day15 Day29 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 ボラミン注 5mg/mL:5mg Day1 Day15 Day29 オブジーボ点滴静注用 240mg/24mL:240mg Day1 Day15 Day29 大塚生食注 50mL:0.4瓶 Day1 ヤーボイ点滴静注液（オーダ用） *:1mg/kg Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌

食道ニボルマブ・イビリムマブ療法【Nivo3週間隔】	22	20	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オ-カ」10mL:1筒 Day1 Day22 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day22 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day22 ボラミン注 5 m g 1 m l :5m g Day1 Day22 オブジーボ点滴静注（オ-ダ用）:360mg Day1 Day22 大塚生食注 5 0 m l :0.4瓶 Day1 ヤーボイ点滴静注液（オ-ダ用） *:1mg/kg Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道ニボルマブ療法（2W間隔）	1	13	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m L *:240m g Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オ-カ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道ニボルマブ療法【4W間隔】	1	27	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m L *:480m g Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オ-カ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道mFOLFOX6+ Nivolumab（入院）	2	12	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HKJ」:1袋 Day1 テ <sup>®</sup> キート注射液6.6mg（リ <sup>®</sup> 酸塩8mg相当）:1V Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オ-ダ用）:200m g / m l Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NKJ」（オ-ダ用）:85m g / m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「ト-ワ」（オ-ダ用）:400m g / m l Day1 (GE-リ <sup>®</sup> タ)ソルデム 3 A輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「ト-ワ」（オ-ダ用）:1200m g / m l Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オ-カ」10mL:1筒 Day2 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道mFOLFOX6+ Nivolumab（ポンプ）	1	13	オブジーボ点滴静注 2 4 0 m g / 2 4 m L :240m g Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HKJ」:1袋 Day1 テ <sup>®</sup> キート注射液6.6mg（リ <sup>®</sup> 酸塩8mg相当）:1V Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オ-ダ用）:200m g / m l Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NKJ」（オ-ダ用）:85m g / m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「ト-ワ」（オ-ダ用）:400m g / m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「ト-ワ」（オ-ダ用）:2400m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オ-カ」10mL:1筒 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 オブジーボ点滴静注 2 4 0 m g / 2 4 m L :240m g Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道FP+ Tislelizumab療法	5	16	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン <sup>®</sup> 静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ <sup>®</sup> キート注射液6.6mg（リ <sup>®</sup> 酸塩8mg相当）:1V Day1 テ <sup>®</sup> キート注射液1.65mg(リ <sup>®</sup> 酸塩2mg相当):1A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「ト-ワ」（オ-ダ用）:800m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オ-ダ用）:80m g / m l Day1 ラシックス注 2 0 m g 2 m l :0.5A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day5 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オ-カ」10mL:1筒 Day5 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l （2 0 m L / A）:0.4A Day1 テビムプラ点滴静注 1 0 0 m g / 1 0 m L *:200m g Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道P T X（初回）【7週レジメン】	36	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HKJ」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 テ <sup>®</sup> キート注射液6.6mg（リ <sup>®</sup> 酸塩8mg相当）:1V Day1 テ <sup>®</sup> キート注射液1.65mg(リ <sup>®</sup> 酸塩2mg相当):1A Day1 Day22 Day29 Day36 ファモチジン <sup>®</sup> 静注液20m g「サワイ」（20mL/A）:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NKJ」:100m g / m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 テ <sup>®</sup> キート注射液1.65mg(リ <sup>®</sup> 酸塩2mg相当):2A Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オ-カ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道P T X（2コース目以降）【7週レジメン】	36	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HKJ」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 テ <sup>®</sup> キート注射液1.65mg(リ <sup>®</sup> 酸塩2mg相当):1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファモチジン <sup>®</sup> 静注液20m g「サワイ」（20mL/A）:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NKJ」:100m g / m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オ-カ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道P T X（初回）【1週レジメン】	1	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HKJ」:1袋 Day1 テ <sup>®</sup> キート注射液6.6mg（リ <sup>®</sup> 酸塩8mg相当）:1V Day1 テ <sup>®</sup> キート注射液1.65mg(リ <sup>®</sup> 酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン <sup>®</sup> 静注液20m g「サワイ」（20mL/A）:1A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NKJ」:100m g / m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オ-カ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道P T X（2回目以降）【1週レジメン】	1	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HKJ」:1袋 Day1 テ <sup>®</sup> キート注射液1.65mg(リ <sup>®</sup> 酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン <sup>®</sup> 静注液20m g「サワイ」（20mL/A）:1A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NKJ」:100m g / m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オ-カ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道ドセタキセル単独療法	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HKJ」:1袋 Day1 テ <sup>®</sup> キート注射液6.6mg（リ <sup>®</sup> 酸塩8mg相当）:1V Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」（オ-ダ用）:70mg/m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オ-カ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌

RT併用FP		4	24	生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A ) :0.4A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) : 700m g /m l Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) : 70m g /m l Day1 ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`ン酸塩8mg相当) : 1V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`ン酸塩2mg相当): 1A Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day4 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1筒 Day4 (GE-リカ)ソルデム3 A輸液 1 L : 1袋 Day2 Day1	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
食道癌 RT併用FOLFOX		2	12	フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) : 800m g /m l Day2 Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`ン酸塩8mg相当) : 1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) : 200m g /m l Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 85m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) : 400m g /m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/1. 食道癌
胃S P 3週ごと		1	20	大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`ン酸塩8mg相当) : 1V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`ン酸塩2mg相当): 1A Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) : 60m g /m l Day1 ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 2袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A ) :0.4A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
FU・LV		36	20	ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) : 250m g /m l Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) : 600m g /m l Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1筒 Day1 Day22 Day8 Day15 Day29 Day36 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day22 Day8 Day15 Day29 Day36	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃CapeOX【130】		1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`ン酸塩8mg相当) : 1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 130m g /m l Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`ン酸塩2mg相当): 1A Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃DOS		1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`ン酸塩8mg相当) : 1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 100m g /m l Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`ン酸塩2mg相当): 1A Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) : 40mg /m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃SOX (100)		1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`ン酸塩8mg相当) : 1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 100m g /m l Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`ン酸塩2mg相当): 1A Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃SOX【130】		1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`ン酸塩8mg相当) : 1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 130m g /m l Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ`ン酸塩2mg相当): 1A Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃mFOLFOX6 (入院)		2	12	(GE-リカ)ソルデム3 A輸液 1 L : 1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) : 1200m g /m l Day2 Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`ン酸塩8mg相当) : 1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) : 200m g /m l Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 85m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) : 400m g /m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃mFOLFOX6 (ポンプ)		1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ`ン酸塩8mg相当) : 1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) : 200m g /m l Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 85m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) : 400m g /m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) : 2400m g /m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ`「オ`カ」10mL: 1筒 Day1 大塚生食注 2 `ト 1 0 0 m l : 1V Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌

胃X P	1	20	生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A ) : 0.4A Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) : 80mg g / m l Day1 ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 2袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) : 1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当): 1A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL: 1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃S P	8	27	生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day8 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A ) : 0.4A Day8 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) : 60mg g / m l Day8 ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day8 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 2袋 Day8 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day8 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) : 1V Day8 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当): 1A Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day8 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL: 1筒 Day8	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃Weekly P T X (初回)	15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) : 1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当): 1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) : 1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」: 80mg g / m l Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当): 2A Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL: 1筒 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃Weekly P T X (2回目以降)	15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当): 1A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) : 1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」: 80mg g / m l Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL: 1筒 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃Weekly【nab-】P T X	15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day15 Day8 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) : 1V Day15 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day15 Day8 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g : 100mg / m l Day15 Day8 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL: 1筒 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃 BIRIPシスプラチン・イリノテカン併用	1	13	大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) : 1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用): 60mg g / m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) : 30mg g / m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL: 1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃イリノテカン単剤	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当): 3A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用): 150mg g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL: 1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃NAC SOX	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) : 1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) : 130m g / m l Day1 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当): 1A Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL: 1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃補助D S (2〜7コース目)	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) : 1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) : 40mg / m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL: 1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃CapeOX【130】+ Her (BS NK) (初回)	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) : 1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) : 130m g / m l Day1 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当): 1A Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L : 1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) : 8mg / kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL: 1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃CapeOX【130】+ Her (BS NK) (2回目以降)	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) : 1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) : 130m g / m l Day1 デキスト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当): 1A Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L : 1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) : 6mg / kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL: 1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌

胃SOX（100）＋Her（BS NK）（初回）	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:100mg/m Day1 デキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」（オーダ用）:8mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃SOX（100）＋Her（BS NK）（2回目以降）	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:100mg/m Day1 デキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」（オーダ用）:6mg/kg Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃SOX[130]＋Her（BS NK）（初回）	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:130mg/m Day1 デキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」（オーダ用）:8mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃SOX[130]＋Her（BS NK）（2回目以降）	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:130mg/m Day1 デキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」（オーダ用）:6mg/kg Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃S-1＋Her（BS NK）（初回）	1	20	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」（オーダ用）:8mg/kg Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃S-1＋Her（BS NK）（2回目以降）	1	20	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」（オーダ用）:6mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃mFOLFOX6＋Her（BS NK）（初回）[6週]（入院）	30	12	(GE-リカ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day2 Day1 Day15 Day29 Day16 Day30 フルオウラシル注「トーワ」（オーダ用）:1200mg/m Day2 Day1 Day15 Day29 Day16 Day30 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day15 Day29 Day16 Day30 Day22 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day15 Day29 デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 Day15 Day29 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m Day1 Day15 Day29 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:85mg/m Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 フルオウラシル注「トーワ」（オーダ用）:400mg/m Day1 Day15 Day29 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day22 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 Day22 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」（オーダ用）:8mg/kg Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day15 Day29 Day22 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day16 Day30 Day22 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」（オーダ用）:6mg/kg Day22	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃mFOLFOX6＋Her（BS NK）（初回）[6週]（ポンプ）	29	13	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day15 Day29 デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 Day15 Day29 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m Day1 Day15 Day29 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:85mg/m Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 フルオウラシル注「トーワ」（オーダ用）:400mg/m Day1 Day15 Day29 フルオウラシル注「トーワ」（オーダ用）:2400mg/m Day1 Day15 Day29 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day22 大塚蒸留水 100mL（抗がん剤調製用）:1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」（オーダ用）:8mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day15 Day29 Day22 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day15 Day29 Day22 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day22 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」（オーダ用）:6mg/kg Day22	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌

胃mFOLFOX6+Her (BS NK) (2回目～) [6週] (入院)	30	12	(GE-リタ)ソルテム3 A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 Day15 Day29 Day16 Day30 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :1200mg/g/m Day2 Day1 Day15 Day29 Day16 Day30 大塚生食注 50m l :1瓶 Day2 Day15 Day29 Day16 Day30 Day22 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100m l「HK」:1袋 Day1 Day15 Day29 デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15 Day29 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day1 Day15 Day29 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg /m Day1 Day15 Day29 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :85mg /m Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5% 50m l :1瓶 Day1 Day15 Day29 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :400mg /m Day1 Day15 Day29 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 Day22 大塚蒸留水 100m l :1瓶 Day1 Day22 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 (オーダ用) :6mg/kg Day1 Day22 大塚生食注 100m l :1瓶 Day15 Day29 Day22 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day16 Day30 Day22	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃mFOLFOX6+Her (BS NK) (2回目～) [6週] (ポンプ)	29	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100m l「HK」:1袋 Day1 Day15 Day29 デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15 Day29 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day1 Day15 Day29 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg /m Day1 Day15 Day29 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :85mg /m Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5% 50m l :1瓶 Day1 Day15 Day29 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :400mg /m Day1 Day15 Day29 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :2400mg /m Day1 Day15 Day29 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 Day15 Day29 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 Day22 大塚蒸留水 100m l :1瓶 Day1 Day22 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 (オーダ用) :6mg/kg Day1 Day22 大塚生食注 50m l :1瓶 Day15 Day29 Day22 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day15 Day29 Day22	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃mFOLFOX6+Her (BS NK) (初回) [2週] (入院)	2	12	(GE-リタ)ソルテム3 A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :1200mg /m Day2 Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100m l「HK」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg /m Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :85mg /m Day1 ブドウ糖注射液 5% 50m l :1瓶 Day1 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :400mg /m Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 100m l :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 (オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃mFOLFOX6+Her (BS NK) (初回) [2週] (ポンプ)	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100m l「HK」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg /m Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :85mg /m Day1 ブドウ糖注射液 5% 50m l :1瓶 Day1 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :400mg /m Day1 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :2400mg /m Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 100m l :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 (オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃mFOLFOX6+Her (BS NK) (2回目～) [2週] (入院)	2	12	(GE-リタ)ソルテム3 A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :1200mg /m Day2 Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100m l「HK」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg /m Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :85mg /m Day1 ブドウ糖注射液 5% 50m l :1瓶 Day1 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :400mg /m Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 100m l :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 (オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃mFOLFOX6+Her (BS NK) (2回目～) [2週] (ポンプ)	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100m l「HK」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg /m Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :85mg /m Day1 ブドウ糖注射液 5% 50m l :1瓶 Day1 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :400mg /m Day1 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :2400mg /m Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 100m l :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 (オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃mFOLFOX6(+Her) Her抜き [2週] (入院)	2	12	(GE-リタ)ソルテム3 A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :1200mg /m Day2 Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100m l「HK」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg /m Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :85mg /m Day1 ブドウ糖注射液 5% 50m l :1瓶 Day1 フルオウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :400mg /m Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 大塚蒸留水 100m l :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 (オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌

胃XP+Her (BS NK) (初回)	1	20	生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 硫酸 M g 補正液 1 mEq / m l ( 2 0 m L / A ) : 0.4A Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 ( オ ー ダ 用 ) : 80m g / m l Day1 ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」 1 L : 1 袋 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 ( オ ー ダ 用 ) : 8mg / kg Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 デ ｷ ｷ ｰ ト注射液 6.6mg ( ﾘﾝ酸塩 8mg 相当 ) : 1 V Day1 デ ｷ ｷ ｰ ト注射液 1.65mg ( ﾘﾝ酸塩 2mg 相当 ) : 1 A Day1 パロノセトロン 静注 0.75mg / 5mL 「 タイホウ 」 : 1 瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 〈 ﾛｯｸ用 〉 ﾍﾟ ﾘ ﾘ ﾅ ﾉ Na100 単位 / m L シﾘﾝｼﾞ 「 ﾎｰ ﾉ ﾎ ﾉ 」 10mL : 1 筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃XP+Her (BS NK) (2回目以降)	1	20	デ ｷ ｷ ｰ ト注射液 6.6mg ( ﾘﾝ酸塩 8mg 相当 ) : 1 V Day1 パロノセトロン 静注 0.75mg / 5mL 「 タイホウ 」 : 1 瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 ( オ ー ダ 用 ) : 80m g / m l Day1 ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」 1 L : 1 袋 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 ( オ ー ダ 用 ) : 6mg / kg Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 硫酸 M g 補正液 1 mEq / m l ( 2 0 m L / A ) : 0.4A Day1 〈 ﾛｯｸ用 〉 ﾍﾟ ﾘ ﾘ ﾅ ﾉ Na100 単位 / m L シﾘﾝｼﾞ 「 ﾎｰ ﾉ ﾎ ﾉ 」 10mL : 1 筒 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃SP+Her (BS NK) (初回)	1	20	硫酸 M g 補正液 1 mEq / m l ( 2 0 m L / A ) : 0.4A Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 ( オ ー ダ 用 ) : 60m g / m l Day1 ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」 1 L : 1 袋 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 ( オ ー ダ 用 ) : 8mg / kg Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 デ ｷ ｷ ｰ ト注射液 6.6mg ( ﾘﾝ酸塩 8mg 相当 ) : 1 V Day1 デ ｷ ｷ ｰ ト注射液 1.65mg ( ﾘﾝ酸塩 2mg 相当 ) : 1 A Day1 パロノセトロン 静注 0.75mg / 5mL 「 タイホウ 」 : 1 瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 〈 ﾛｯｸ用 〉 ﾍﾟ ﾘ ﾘ ﾅ ﾉ Na100 単位 / m L シﾘﾝｼﾞ 「 ﾎｰ ﾉ ﾎ ﾉ 」 10mL : 1 筒 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃SP+Her (BS NK) (2回目以降)	1	20	硫酸 M g 補正液 1 mEq / m l ( 2 0 m L / A ) : 0.4A Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 ( オ ー ダ 用 ) : 60m g / m l Day1 ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」 1 L : 1 袋 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 ( オ ー ダ 用 ) : 6mg / kg Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 デ ｷ ｷ ｰ ト注射液 6.6mg ( ﾘﾝ酸塩 8mg 相当 ) : 1 V Day1 デ ｷ ｷ ｰ ト注射液 1.65mg ( ﾘﾝ酸塩 2mg 相当 ) : 1 A Day1 パロノセトロン 静注 0.75mg / 5mL 「 タイホウ 」 : 1 瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1 〈 ﾛｯｸ用 〉 ﾍﾟ ﾘ ﾘ ﾅ ﾉ Na100 単位 / m L シﾘﾝｼﾞ 「 ﾎｰ ﾉ ﾎ ﾉ 」 10mL : 1 筒 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃PTX+Her (BS NK) (初回)	71	6	クラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「 HK 」 : 1 袋 Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 デ ｷ ｷ ｰ ト注射液 6.6mg ( ﾘﾝ酸塩 8mg 相当 ) : 1 V Day1 Day64 デ ｷ ｷ ｰ ト注射液 1.65mg ( ﾘﾝ酸塩 2mg 相当 ) : 1 A Day1 Day29 Day43 Day57 Day36 Day71 ファモチジン 静注液 20m g 「 サワイ 」 ( 20mL / A ) : 1 A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day36 Day71 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「 NK 」 : 80m g / m l Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 デ ｷ ｷ ｰ ト注射液 1.65mg ( ﾘﾝ酸塩 2mg 相当 ) : 2 A Day8 Day15 大塚蒸留水 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 Day22 Day43 Day64 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 ( オ ー ダ 用 ) : 8mg / kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 ( オ ー ダ 用 ) : 6mg / kg Day22 Day43 Day64 〈 ﾛｯｸ用 〉 ﾍﾟ ﾘ ﾘ ﾅ ﾉ Na100 単位 / m L シﾘﾝｼﾞ 「 ﾎｰ ﾉ ﾎ ﾉ 」 10mL : 1 筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃PTX+Her (BS NK) (2回目以降)	71	6	クラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「 HK 」 : 1 袋 Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 デ ｷ ｷ ｰ ト注射液 1.65mg ( ﾘﾝ酸塩 2mg 相当 ) : 1 A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day36 Day71 ファモチジン 静注液 20m g 「 サワイ 」 ( 20mL / A ) : 1 A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day36 Day71 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「 NK 」 : 80m g / m l Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 大塚蒸留水 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 Day22 Day43 Day64 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 ( オ ー ダ 用 ) : 6mg / kg Day1 Day22 Day43 Day64 デ ｷ ｷ ｰ ト注射液 6.6mg ( ﾘﾝ酸塩 8mg 相当 ) : 1 V Day64 〈 ﾛｯｸ用 〉 ﾍﾟ ﾘ ﾘ ﾅ ﾉ Na100 単位 / m L シﾘﾝｼﾞ 「 ﾎｰ ﾉ ﾎ ﾉ 」 10mL : 1 筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌

胃エンハーツ	1	20	ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚糖液 5% 100mL :1瓶 Day1 グラニセトロン静注液 3mg シリンジ「サワイ」:1筒 Day1 アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚蒸留水 100mL :1瓶 Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:6.4mg/kg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃mFOLFOX6(+Her) Her抜き [2週] (ポンプ)	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 レボリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダ用) :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
CapeOX(130)+Pembrolizumab+Tmab (BS NK) (初回)	1	20	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
CapeOX(130)+Pembrolizumab+Tmab (BS NK) (2回目以降)	1	20	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
CapeOX (100) +Pembrolizumab+Tmab (BS NK) (初回)	1	20	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :100mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
CapeOX (100)+Pembrolizumab+Tmab (BS NK)(2回目以降)	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :100mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
Cape+Pembrolizumab+Tmab (BS NK)(2回目以降)	1	20	大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
SOX (130)+Pembrolizumab+Tmab (BS NK) (2回目以降)	1	20	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
SOX (100) +Pembrolizumab+Tmab (BS NK) (初回)	1	20	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :100mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌

SOX (100) +Pembrolizumab+Tmab (BS NK) (2回目以降)	1	20	グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 mg / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :100mg /m l Day1 デキサート注射液 1.65mg(リッ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200mg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
S-1+Pembrolizumab+Tmab (BS NK) (2回目以降)	1	20	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200mg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
FP+Pembrolizumab+Tmab (BS NK) (初回)	5	16	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液 6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液 1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダ用) :800m g /m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :80m g /m l Day1 ラシックス注 2 0 m g 2 m l :0.5A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day5 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day5 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :8ml Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200mg Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
FP+Pembrolizumab+Tmab (BS NK) (2回目以降)	5	16	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液 6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液 1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1 L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダ用) :800m g /m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :80m g /m l Day1 ラシックス注 2 0 m g 2 m l :0.5A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダ用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day5 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day5 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :8ml Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200mg Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃CapeOX〔130〕+ニボルマブ	1	20	グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 mg / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :130m g /m l Day1 デキサート注射液 1.65mg(リッ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 オプジーボ点滴静注 (オーダ用) :360mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃Cape+ニボルマブ	1	20	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注 (オーダ用) :360mg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃SOX(100)+ニボルマブ	1	20	グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 mg / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :100mg /m l Day1 デキサート注射液 1.65mg(リッ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 オプジーボ点滴静注 (オーダ用) :360mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃SOX〔130〕+ニボルマブ	1	20	グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 mg / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :130m g /m l Day1 デキサート注射液 1.65mg(リッ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 オプジーボ点滴静注 (オーダ用) :360mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃S-1+ニボルマブ	1	20	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボララミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注 (オーダ用) :360mg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌

胃mFOLFOX6+Nivo（入院）	2	12	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/ml Day1 オキサリプラチン点滴静注液〔NK〕（オーダ用）:85mg/ml Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トロー」 （オーダ用）:400mg/ml Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 フルオウラシル注「トロー」 （オーダ用）:1200mg/ml Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLリソジ「オツカ」10mL:1筒 Day2 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 オブジーボ点滴静注240mg/24mL:240mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃mFOLFOX6+Nivo（ポンプ）	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/ml Day1 オキサリプラチン点滴静注液〔NK〕（オーダ用）:85mg/ml Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トロー」 （オーダ用）:400mg/ml Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トロー」 （オーダ用）:2400mg/ml Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLリソジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 オブジーボ点滴静注240mg/24mL:240mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃ニボルマブ療法【2週毎】	1	13	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用240mg/24mL *:240mg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLリソジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃ニボルマブ療法（4週毎）	1	27	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用240mg/24mL *:480mg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLリソジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃 FP+Pembrolizumab療法	5	16	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL〔タイホウ〕:1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 デキサト注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:1A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオウラシル注「トロー」 （オーダ用）:800mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 （オーダ用）:80mg/ml Day1 ラシックス注 20mg2ml:0.5A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day5 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLリソジ「オツカ」10mL:1筒 Day5 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 硫酸Mg 補正液 1mEq/ml（20mL/A）:0.4A Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃SOX(100)+Pembrolizumab	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液〔NK〕（オーダ用）:100mg/ml Day1 デキサト注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLリソジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃SOX【130】+Pembrolizumab	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液〔NK〕（オーダ用）:130mg/ml Day1 デキサト注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLリソジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃S-1+Pembrolizumab	1	20	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLリソジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃CapeOX(100)+Pembrolizumab	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液〔NK〕（オーダ用）:100mg/ml Day1 デキサト注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLリソジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃CapeOX【130】+Pembrolizumab	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液〔NK〕（オーダ用）:130mg/ml Day1 デキサト注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLリソジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌

mFOLFOX6+Zolbetuximab（入院用）【初回】	2	12	ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オヅカ」10mL:1筒 Day2 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:2A Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 ビロイ点滴静注用（オーダ用）*:800mg/m <sup>2</sup> Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
mFOLFOX6+Zolbetuximab（入院用）【2回目以降】	2	12	ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オヅカ」10mL:1筒 Day2 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:2A Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 ビロイ点滴静注用（オーダ用）*:400mg/m <sup>2</sup> Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
mFOLFOX6+Zolbetuximab（外来用）【2回目以降】	1	13	ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 プリンペラン注射液 10mg2mL:1A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オヅカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:2A Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 ビロイ点滴静注用（オーダ用）*:400mg/m <sup>2</sup> Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
mFOLFOX6+Zolbetuximab【2回目以降】(悪心低リスク用)	1	13	ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 プリンペラン注射液 10mg2mL:1A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オヅカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:2A Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 ビロイ点滴静注用（オーダ用）*:400mg/m <sup>2</sup> Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
CapeOX+Zolbetuximab（入院用）【初回】	1	20	ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オヅカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 ビロイ点滴静注用（オーダ用）*:800mg/m <sup>2</sup> Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
CapeOX+Zolbetuximab（入院用）【2回目以降】	1	20	ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサート注射液1.65mg（リッ酸塩2mg相当）:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オヅカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リッ酸塩8mg相当）:1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 ビロイ点滴静注用（オーダ用）*:600mg/m <sup>2</sup> Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌

CapeOX+ Zolbetuximab (外来用)【2回目以降】	1	20	ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用):130mg/m <sup>2</sup> Day1 ティンザート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 プリンペラン注射液 10mg/2mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ティンザート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day1 ビロイ点滴静注用(オーダ用) *:600mg/m <sup>2</sup> Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
CapeOX+ Zolbetuximab (悪心低リスク患者用)	1	20	ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用):130mg/m <sup>2</sup> Day1 ティンザート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 プリンペラン注射液 10mg/2mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ティンザート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day1 ビロイ点滴静注用(オーダ用) *:600mg/m <sup>2</sup> Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃RAM単剤 (bi-weekly)	1	13	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃RAM+ PTX (初回)	15	13	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 ティンザート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ティンザート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ティンザート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃RAM+ PTX (2回目以降)	15	13	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 ティンザート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃RAM+ PTX (初回) (bi-weekly)	1	13	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 ティンザート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ティンザート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」:80mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃RAM+ PTX (2回目以降) (bi-weekly)	1	13	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 ティンザート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」:80mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃RAM+ [nab]PTX	15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day15 Day8 ティンザート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day15 Day8 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day15 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day15 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day15 Day8 アブラキサン点滴静注用100mg/m <sup>2</sup> Day15 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃RAM+ [nab]PTX (bi-weekly)	1	13	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 ティンザート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃RAM+ IRI	1	13	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 ティンザート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):3A Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌

胃NEC シスプラチン・イリノテカン	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 テキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 テキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):60m g /m l Day1 Day8 Day15 (GE-リタ)ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :60m g /m l Day1 ソルデム3 A輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
胃NEC シスプラチン・エトボシド	3	18	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1 テキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day2 Day3 Day1 テキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day2 Day3 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day3 Day1 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サト」 5 m l :100m g /m l Day2 Day3 Day1 ソルデム3 A輸液 2 0 0 m l :1袋 Day2 Day3 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 (GE-リタ)ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l :0.4A Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :80m g /m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3	8 消化器内科・消化器外科/2. 胃癌
FOLFOXIRI (ポンプ)	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):165m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :85m g /m l Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200m g /m l Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :3200m g /m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
mFOLFOX6 (入院)	2	12	(GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1 L :1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :1200m g /m l Day2 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 テキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200m g /m l Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :85m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :400m g /m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
mFOLFOX6 (ポンプ)	1	13	グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 テキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200m g /m l Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダ用) :85m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :400m g /m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :2400m g /m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFIRI (入院)	2	12	(GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1 L :1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :1200m g /m l Day2 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200m g /m l Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 テキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):3A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :400m g /m l Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150m g /m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFIRI (ポンプ)	1	13	グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 テキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):3A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200m g /m l Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :400m g /m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :2400m g /m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
mFL (入院)	2	12	(GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1 L :1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :1200m g /m l Day2 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 テキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダ用) :400m g /m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌

mFL（ポンプ）	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当）:1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 （オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 （オーダ用）:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オートカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オートカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
RPMI	15	13	ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:250mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 フルオロウラシル注「トロー」 （オーダ用）:500mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オートカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
イリノテカン	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リソ酸塩2mg相当）:3A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）:150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オートカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
CapeOX	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当）:1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 （オーダ用）:130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサート注射液1.65mg（リソ酸塩2mg相当）:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オートカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
XELIRI療法	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リソ酸塩2mg相当）:3A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オートカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
IRIS	15	12	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 Day15 デキサート注射液1.65mg（リソ酸塩2mg相当）:3A Day1 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オートカ」10mL:1筒 Day1 Day15	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
SOX	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当）:1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 （オーダ用）:130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサート注射液1.65mg（リソ酸塩2mg相当）:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オートカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFOXIRI+BV（入院）	2	12	(GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 （オーダ用）:1600mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当）:1V Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:5mg/kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）:165mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 （オーダ用）:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オートカ」10mL:1筒 Day2 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFOXIRI+BV（ポンプ）	1	13	アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当）:1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）:165mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 （オーダ用）:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トロー」 （オーダ用）:3200mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オートカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:5mg/kg Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
mFOLFOX6+BV（入院）	2	12	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当）:1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 （オーダ用）:85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 （オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トロー」 （オーダ用）:1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オートカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌

mFOLFOX6 + BV（ポンプ）	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg（リン酸塩 8mg 相当）:1V Day1 ボラミン注 5 mg 1 mL :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:5mg /kg Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg /mL Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:85mg /mL Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:400mg /mL Day1 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:2400mg /mL Day1 〈ロック用〉ヘパリン Na100 単位/mL シリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFIRI + BV（入院）	2	12	(GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:1200mg /mL Day2 Day1 大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1 デキサート注射液 1.65mg（リン酸塩 2mg 相当）:3A Day1 大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:5mg /kg Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg /mL Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）:150mg /mL Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:400mg /mL Day1 〈ロック用〉ヘパリン Na100 単位/mL シリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFIRI + BV（ポンプ）	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1 デキサート注射液 1.65mg（リン酸塩 2mg 相当）:3A Day1 大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:5mg /kg Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg /mL Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）:150mg /mL Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:400mg /mL Day1 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:2400mg /mL Day1 〈ロック用〉ヘパリン Na100 単位/mL シリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
IRI + BV療法	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1 デキサート注射液 1.65mg（リン酸塩 2mg 相当）:3A Day1 大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:5mg /kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）:150mg /mL Day1 大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリン Na100 単位/mL シリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
s LV5FU2 + BV（入院）	2	12	(GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:1200mg /mL Day2 Day1 大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:5mg /kg Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg /mL Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:400mg /mL Day1 〈ロック用〉ヘパリン Na100 単位/mL シリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
s LV5FU2 + BV（ポンプ）	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:5mg /kg Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg /mL Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:400mg /mL Day1 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:2400mg /mL Day1 〈ロック用〉ヘパリン Na100 単位/mL シリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
LV5FU2 + BV（入院）	2	12	ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 mL :1瓶 Day2 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:100mg /mL Day2 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 mL :1瓶 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:400mg /mL Day2 Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:600mg /mL Day2 Day1 大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:5mg /kg Day1 〈ロック用〉ヘパリン Na100 単位/mL シリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
RPMI + BV [6週投与、2週休薬]	8	6	ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 mL :1瓶 Day8 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:250mg /mL Day8 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 mL :1瓶 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:500mg /mL Day8 Day1 大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day8 Day1 大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1 Day8 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:5mg /kg Day1 〈ロック用〉ヘパリン Na100 単位/mL シリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day8	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
RPMI + BV [3週投与、1週休薬]	15	13	ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 mL :1瓶 Day8 Day1 Day15 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:250mg /mL Day8 Day1 Day15 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 mL :1瓶 Day8 Day1 Day15 フルオロウラシル注「トーフ」（オーダ用）:500mg /mL Day8 Day1 Day15 大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day8 Day1 Day15 大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:5mg /kg Day1 Day15 〈ロック用〉ヘパリン Na100 単位/mL シリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
CAPOXIRI + BEV（QUATRO-II）	1	20	大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1 バロノセトロン静注 0.75mg / 5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液 6.6mg（リン酸塩 8mg 相当）:1V Day1 アバスチン点滴静注用（オーダ用）:7.5mg /kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液（オーダ用）:200mg /mL Day1 大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:130mg /mL Day1 〈ロック用〉ヘパリン Na100 単位/mL シリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌

CapeOX + BV	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 テ`キート注射液 6.6mg (リ`酸塩 8mg 相当) :1V Day1 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用 (オー`用) :7.5m g/kg Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オー`用) :130m g /m Day1 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当):1A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
XELIRI + BV療法	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当):3A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用 (オー`用) :7.5m g/kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 (オー`用):200m g /m Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
Cape + BV	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用 (オー`用) :7.5m g/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
ロンサーフ ( T A S 102 ) + BV療法	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day15 アバスチン点滴静注用 (オー`用) :5m g/kg Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day15 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1 Day15	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
SOX + BV	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 テ`キート注射液 6.6mg (リ`酸塩 8mg 相当) :1V Day1 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用 (オー`用) :7.5m g/kg Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オー`用) :130m g /m Day1 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当):1A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFIRI (IRI180) + Ram (ポンプ)	1	13	ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オー`用) :200m g /m Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当):3A Day1 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オー`用) :400m g /m Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オー`用) :2400m g /m Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 (オー`用):180m g /m Day1 サイラムザ点滴静注液 (オー`用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1 (GE-リ`カ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day2 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFIRI + Ram (入院)	2	12	フルオロウラシル注「トーフ」 (オー`用) :1200m g /m Day2 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オー`用) :200m g /m Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当):3A Day1 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オー`用) :400m g /m Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 (オー`用):150m g /m Day1 サイラムザ点滴静注液 (オー`用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFIRI + Ram (ポンプ)	1	13	ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オー`用) :200m g /m Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当):3A Day1 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オー`用) :400m g /m Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オー`用) :2400m g /m Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 (オー`用):150m g /m Day1 サイラムザ点滴静注液 (オー`用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
IRI180 + Ram	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当):3A Day1 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 (オー`用):180m g /m Day1 サイラムザ点滴静注液 (オー`用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
IRI150 + Ram	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 mL「HK」:1袋 Day1 テ`キート注射液 1.65mg (リ`酸塩 2mg 相当):3A Day1 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 (オー`用):150m g /m Day1 サイラムザ点滴静注液 (オー`用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 <ロ`ク用>ヘ`リンNa100単位/mLシリン`「オ`カ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌

FOLFIRI + Afibercept (入院)	2	12	(GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1 L :1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :1200mg /㎡ Day2 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg /㎡ Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸塩2mg相当):3A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :400mg /㎡ Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150m g /㎡ Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ザルトラップ点滴静注 (オーダー用) *:4mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFIRI + Afibercept (ポンプ)	1	13	ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg /㎡ Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸塩2mg相当):3A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :400mg /㎡ Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :2400mg /㎡ Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150m g /㎡ Day1 ザルトラップ点滴静注 (オーダー用) *:4mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
Cma b (1クール目)	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :400mg /㎡ Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
Cma b (2クール目以降)	1	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /㎡ Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFIRI+Cmab (入院) (1クール目)	8	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :400mg /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg /㎡ Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :400mg /㎡ Day1 (GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :1200mg /㎡ Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day8 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /㎡ Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day2 Day8	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFIRI+Cmab (入院) (2クール目以降)	8	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /㎡ Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg /㎡ Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :400mg /㎡ Day1 (GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :1200mg /㎡ Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day8 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFIRI+Cmab (ポンプ) (1クール目)	8	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :400mg /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg /㎡ Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :400mg /㎡ Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /㎡ Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :2400mg /㎡ Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFIRI+Cmab (ポンプ) (2クール目以降)	8	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /㎡ Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg /㎡ Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :400mg /㎡ Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :2400mg /㎡ Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌

mFOLFOX6+Cmab (入院) (1クール目)	8	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :400m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダー用) :85m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :400m g /㎡ Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :1200m g /㎡ Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day8 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /㎡ Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day8 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
mFOLFOX6+Cmab (入院) (2クール目以降)	8	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /㎡ Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダー用) :85m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :400m g /㎡ Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :1200m g /㎡ Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day8 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2 Day8	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
mFOLFOX6+Cmab (ポンプ) (1クール目)	8	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :400m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダー用) :85m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :400m g /㎡ Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /㎡ Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :2400m g /㎡ Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
mFOLFOX6+Cmab (ポンプ) (2クール目以降)	8	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /㎡ Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダー用) :85m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :400m g /㎡ Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :2400m g /㎡ Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
sLV5FU2+Cmab (入院) (1クール目)	8	6	デキサート注射液 6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :400m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :400m g /㎡ Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :1200m g /㎡ Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /㎡ Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day8 Day2 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
sLV5FU2+Cmab (入院) (2クール目以降)	8	6	デキサート注射液 6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /㎡ Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :400m g /㎡ Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :1200m g /㎡ Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day8 Day2 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
sLV5FU2+Cmab (ポンプ) (1クール目)	8	6	デキサート注射液 6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :400m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :400m g /㎡ Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /㎡ Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :2400m g /㎡ Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌

sLV5FU2+Cmab（ポンプ）（2クール目以降）	8	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ティンクト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /m l Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :400m g /m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホーク」10mL:1筒 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :2400m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
IRI + Cmab（1クール目）	8	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 ティンクト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :400m g /m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /m l Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホーク」10mL:1筒 Day1 Day8	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
IRI + Cmab（2クール目以降）	8	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 ティンクト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g /m l Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホーク」10mL:1筒 Day1 Day8	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
Biweekly Cmab	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ティンクト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :500m g /m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホーク」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
Biweekly FOLFIRI+Cmab（入院）	2	12	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 ティンクト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :500m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /m l Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :400m g /m l Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :1200m g /m l Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホーク」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
Biweekly FOLFIRI+Cmab（ポンプ）	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 ティンクト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :500m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /m l Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :400m g /m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :2400m g /m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホーク」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
Biweekly mFOLFOX6+Cmab（入院）	2	12	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l「HK」:1袋 Day1 ティンクト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :500m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /m l Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダー用) :85m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :400m g /m l Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :1200m g /m l Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホーク」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
Biweekly mFOLFOX6+Cmab（ポンプ）	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l「HK」:1袋 Day1 ティンクト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :500m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /m l Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダー用) :85m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :400m g /m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用) :2400m g /m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホーク」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
P m a b	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ティンクト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):1A Day1 ベクテビックス点滴静注 (オーダー用) :6m g /kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホーク」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌

FOLFIRI + Pmab（入院）	2	12	(GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):3A Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ベクティビックス点滴静注（オーダー用）:6mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
FOLFIRI + Pmab（ポンプ）	1	13	ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):3A Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 ベクティビックス点滴静注（オーダー用）:6mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
IRI + Pmab	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):3A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ベクティビックス点滴静注（オーダー用）:6mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
mFOLFOX6 + Pmab（入院）	2	12	(GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ベクティビックス点滴静注（オーダー用）:6mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
mFOLFOX6 + Pmab（ポンプ）	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ベクティビックス点滴静注（オーダー用）:6mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」（オーダ用）:85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
slV5FU2 + Pmab（入院）	2	12	(GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ベクティビックス点滴静注（オーダー用）:6mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
slV5FU2 + Pmab（ポンプ）	1	13	ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）:200mg/m <sup>2</sup> Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 ベクティビックス点滴静注（オーダー用）:6mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
BRAF阻害剤 初回	1	6	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液（オーダー用）:400mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
BRAF阻害剤 2回目以降	1	6	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液（オーダー用）:250mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
BRAF阻害剤 2回目以降【2週毎】	1	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液（オーダー用）:500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌

EC+mFOLFOX6 (入院)	2	12	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :500m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /m l Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダー用) :85m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :400m g /m l Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :1200m g /m l Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
EC+mFOLFOX6 (ポンプ)	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 アービタックス注射液 (オーダー用) :500m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g /m l Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」(オーダー用) :85m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :400m g /m l Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :2400m g /m l Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
Tmab (BS NK) +Per【初回】(HER2陽性大腸)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーシタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :840m g Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダー用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g 「マルイシ」:1錠 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
Tmab (BS NK)+Per [2回目以降] (HER2陽性大腸)	1	20	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 パーシタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(オーダー用) :6mg/kg Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
フェスゴ【初回】(HER2陽性大腸)	1	20	フェスゴ配合皮下注IN (15mL/瓶) * :1瓶 Day1 生食注 2 0 m l :1A Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
フェスゴ[2回目以降] (HER2陽性大腸)	1	20	フェスゴ配合皮下注MA (10mL/瓶) * :1瓶 Day1 生食注 2 0 m l :1A Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
MSI-H ニボルマブ・イビリマブ併用療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :5m g Day1 オプジーボ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m L :240m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :0.4瓶 Day1 ヤーボイ点滴静注液 (オーダー用) * :1mg/kg Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
MSI-H (Nivo+Ipi 5サイクル目以降) ニボルマブ q4w	1	27	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 オプジーボ点滴静注 (オーダー用) :480mg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
MSI-H (Nivo+Ipi 5サイクル目以降) ニボルマブ q2w	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 オプジーボ点滴静注 (オーダー用) :240mg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
MSI-H ヘムプロリズマブ (q3W)	1	20	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
Pmab+ソトラシブ	1	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ベクテビックス点滴静注 (オーダー用) :6m g /kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/3. 大腸癌
(肝細胞癌) ヘムプロリズマブ (q3W)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	8 消化器内科・消化器外科/4. 肝細胞癌
(肝細胞癌) New FP動注療法 (ポンプ)	1	13	グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 リピオドール 4 8 0 注 1 0 m L :1A Day1 動注用アイエーコール 1 0 0 m g :1瓶 Day1 生食注 2 0 m l :1A Day1 ヘパリンN 注 5 0 0 0 U 5 m l :1A Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :1250m g Day1	8 消化器内科・消化器外科/4. 肝細胞癌
(肝細胞癌) RAM単剤療法	1	13	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液 (オーダー用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	8 消化器内科・消化器外科/4. 肝細胞癌
(肝細胞癌) アテゾリズマブ+ベバシズマブ	1	20	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オキカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m L * :1200m g Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用 (オーダー用) :15m g /kg Day1	8 消化器内科・消化器外科/4. 肝細胞癌

(肝臓)ニボルマブ+イビリムマブ併用療法 (1～4コース)	1	20	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用20mg/2mL *:80mg Day1 大塚生食注 50mL:20mL Day1 ヤーボ点滴静注液 (オーダー用) *:3mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/4. 肝細胞癌
(肝臓)ニボルマブ単剤 (2週毎)	1	13	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注 (オーダー用) :240mg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/4. 肝細胞癌
(肝臓)ニボルマブ単剤 (4週毎)	1	27	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注 (オーダー用) :480mg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/4. 肝細胞癌
(肝細胞癌) デュル+トレ【> 30kg】【1コース目】	1	27	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イジド点滴静注液 300mg/15mL *:300mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 イミフィンジ点滴静注500mg/10mL *:1500mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/4. 肝細胞癌
(肝細胞癌) デュル+トレ【> 30kg】【2コース目以降】	1	27	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注500mg/10mL *:1500mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/4. 肝細胞癌
(肝細胞癌) デュル+トレ【30kg以下】【1コース目】	1	27	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イジド点滴静注液 (オーダー用) *:4mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 イミフィンジ点滴静注 (オーダー用) *:20mg/kg Day1	8 消化器内科・消化器外科/4. 肝細胞癌
(肝細胞癌) デュル+トレ【30kg以下】【2コース目以降】	1	27	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注 (オーダー用) *:20mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/4. 肝細胞癌
(肝細胞癌) デュル単剤【> 30kg】	1	27	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注500mg/10mL *:1500mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/4. 肝細胞癌
(肝細胞癌) デュル単剤【30kg以下】	1	27	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注 (オーダー用) *:20mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/4. 肝細胞癌
(膵・胆道癌) ヘムプロシズマブ (q3W)	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(胆道癌) GCS療法	1	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用) :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用) :25mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A) :8ml Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オキカ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(胆道癌) GC療法	8	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用) :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用) :25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A) :8ml Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day8	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(胆道癌) GS療法	8	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用) :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day8	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(胆道癌) GEM単剤療法	15	13	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用) :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(胆道癌) GC+デュルバルマブ療法【8コースまで】	8	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用) :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用) :25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A) :8ml Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 「オキカ」10mL:1筒 Day1 Day8 イミフィンジ点滴静注500mg/10mL *:1500mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌

(胆道癌) GC+デュルバルマブ療法【9コース目以降】	1	27	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 イミフィンジ点滴静注 500mg/10mL * :1500mg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(胆道癌) GC+ベムプロリズマブ療法【8コースまで】	8	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1000mg/mL Day1 Day8 大塚糖液 5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :25mg/mL Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A) :8ml Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL * :200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(胆道癌) GEM+ベムプロリズマブ療法	8	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1000mg/mL Day1 Day8 大塚糖液 5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL * :200mg Day1	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(膵癌) mFOLFIRINOX療法 (入院)	2	12	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :85mg/mL Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/mL Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/mL Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :1200mg/mL Day1 Day2 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(膵癌) mFOLFIRINOX療法 (ポンプ)	1	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :85mg/mL Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/mL Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/mL Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :2400mg/mL Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(膵癌) GnP療法 (ポートなし)	15	13	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg :125mg/mL Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1000mg/mL Day1 Day8 Day15 大塚糖液 5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(膵癌) GnP療法 (ポートあり)	15	13	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg :125mg/mL Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1000mg/mL Day1 Day8 Day15 大塚糖液 5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(膵癌) nal-IRI+FF療法 (入院)	2	12	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/mL Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オニバイド点滴静注43mg:70mg/mL Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :1200mg/mL Day1 Day2 生理食塩液バッグ「フソー」1L:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(膵癌) nal-IRI+FF療法 (ポンプ)	1	13	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/mL Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オニバイド点滴静注43mg:70mg/mL Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :2400mg/mL Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(膵癌) GS療法 (ポートなし)	8	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1000mg/mL Day1 Day8 大塚糖液 5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(膵癌) GS療法 (ポートあり)	8	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1000mg/mL Day1 Day8 大塚糖液 5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(膵癌) GEM単剤療法 (ポートなし)	15	13	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1000mg/mL Day1 Day8 Day15 大塚糖液 5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌

(膵癌) GEM単剤療法 (ポートあり)	15	13	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「N K」 (オーダ用) :1000mg /㎡ Day1 Day8 Day15 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉へパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(膵癌)【術前】GS療法 (ポートなし)	8	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 Day8 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「N K」 (オーダ用) :1000mg /㎡ Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(膵癌)【術前】GS療法 (ポートあり)	8	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 Day8 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「N K」 (オーダ用) :1000mg /㎡ Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 〈ロック用〉へパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
小腸 mFOLFOX6 (ポンプ)	1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg /㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :85mg /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg /㎡ Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :2400mg /㎡ Day1 〈ロック用〉へパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	8 消化器内科・消化器外科/5. 膵・胆道癌
(NEN) シスプラチン・イリノテカン併用	15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day8 Day15 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):3A Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):60mg /㎡ Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 (GE-リタ)ソルデム 3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l :8ml Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :60mg /㎡ Day1 ソルデム 3 A輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉へパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
(NEN) シスプラチン・エトボシド (100mg/㎡) 併用	3	18	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g「サド」 5 m l :100mg /㎡ Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム 3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l :8ml Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :80mg /㎡ Day1 ソルデム 3 A輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1 〈ロック用〉へパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
(NEN)シスプラチン・エトボシド (80mg/㎡) 併用	3	18	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g「サド」 5 m l :80mg /㎡ Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム 3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l :8ml Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :80mg /㎡ Day1 ソルデム 3 A輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
CBDCA (AUC=5) /CPT (day1,8,15)	15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 Day15 Day8 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):3A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day15 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):50mg /㎡ Day1 Day15 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0mg /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day8 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day15 Day8 〈ロック用〉へパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
CBDCA (AUC5)/ETOP (80mg)	3	18	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 ﾃﾞﾍﾞｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):3A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g「サド」 5 m l :80mg /㎡ Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注射液 (オーダ用) :0mg /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day3 Day2 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1	8 消化器内科・消化器外科/9. その他

原発不明癌 ddTC療法【初回】	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ)酸塩8mg相当) :2V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ)酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /㎡ Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day8 Day15 テ`キート注射液6.6mg (リ)酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15 テ`キート注射液1.65mg(リ)酸塩2mg相当):1A Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ`カ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
原発不明癌 ddTC療法【2回目以降】	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ)酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /㎡ Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ`カ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
原発不明癌 ddTC+BV療法【初回】	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ)酸塩8mg相当) :2V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ)酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /㎡ Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day8 Day15 テ`キート注射液6.6mg (リ)酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15 テ`キート注射液1.65mg(リ)酸塩2mg相当):1A Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ`カ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
原発不明癌 ddTC+BV療法【2回目以降】	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ)酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /㎡ Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ`カ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 アバスチン点滴静注用 (オーダー用) :7.5m g /kg Day1	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
原発不明癌 ニボルマブ療法	1	13	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m L * :240m g Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ`カ」10mL:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
肛門管癌 TC療法【1回目】	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ)酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 テ`キート注射液1.65mg(リ)酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /㎡ Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 テ`キート注射液1.65mg(リ)酸塩2mg相当):2A Day15 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ`カ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
肛門管癌 TC療法【2コース目以降】	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ)酸塩2mg相当):3A Day1 ファモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g /㎡ Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注射液 (オーダー用) :0m g /A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 テ`キート注射液1.65mg(リ)酸塩2mg相当):1A Day8 Day15 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ`カ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
肛門管癌 S-1+MMC+RT	1	27	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 マイトマイシン注用 2 m g :10m g /㎡ Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ`カ」10mL:1筒 Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ)酸塩2mg相当):2A Day1	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
肛門扁平上皮癌 FP療法	5	23	生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1 生理食塩液バッグ「フソー」 1 L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオウラシル注「ト`ワ」 (オーダー用) :1000m g /㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダー用) :60m g /㎡ Day1 ラシックス注 2 0 m g 2 m l :0.5A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day5 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ`キート注射液6.6mg (リ)酸塩8mg相当) :1V Day1 テ`キート注射液1.65mg(リ)酸塩2mg相当):1A Day1 <ロック用>ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ`カ」10mL:1筒 Day5	8 消化器内科・消化器外科/9. その他

VDC（ユーイング肉腫）【緊急】ド・リル・シン30min	2	19	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 バロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テ・サート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 テ・サート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 オンコピン（VCR）注 1mg:1.5mg/mi Day1 (GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1L:1袋 Day1 メイロン静注 7% 20mL:2A Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL／本:1筒 Day1 エンドキサン注（オーダ用）:1200mg/mi Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 ドキソルピシン塩酸塩注射用（オーダ用）:37.5mg/mi Day1 Day2 ウロミテキサン注 400mg 4mL:240mg/mi Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL／本:1筒 Day1	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
IE（ユーイング肉腫）【緊急】	5	16	(GE-リタ)ソルデム1 輸液 500mL:1瓶 Day1 メイロン静注 7% 20mL:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 テ・サート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 テ・サート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イホマイド（IFX）注射用 1g:1800mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ウロミテキサン注 400mg 4mL:360mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メイロン静注 7% 20mL:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトボシド点滴静注液 100mg「サド」 5mL:100mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
IE【緊急】 IFM：day1のみ、ETP：day1-3	3	18	大塚生食注 100mL:1瓶 Day3 Day2 テ・サート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day3 Day1 Day2 テ・サート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day3 Day1 Day2 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL／本:1筒 Day1 (GE-リタ)ソルデム1 輸液 500mL:1瓶 Day1 メイロン静注 7% 20mL:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 イホマイド（IFX）注射用 1g:1800mg/mi Day1 ウロミテキサン注 400mg 4mL:360mg/mi Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム3 A輸液 1L:1袋 Day1 メイロン静注 7% 20mL:2A Day1 エトボシド点滴静注液 100mg「サド」 5mL:100mg/mi Day1 Day2 Day3	8 消化器内科・消化器外科/9. その他
DAC-Tam療法（皮膚科）	6	23	(GE-リタ)ソルデム3 A輸液 500mL:2袋 Day1 Day5 Day6 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100mL「HK」:100mL Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day1 ダカルバジン注 100mg:220mg/mi Day2 Day3 Day4 大塚蒸留水（注射用水） 20mL:20mL Day2 ニドラン（ACNU）注射用 50mg * :60mg/mi Day2 テ・サート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 テ・サート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダ用）:25mg/mi Day2 Day3 Day4 (GE-リタ)ソルデム3 A輸液 500mL:1袋 Day2 Day3 Day4 アタラックスー P注 25mg 1mL:2A Day2 Day3 Day4 〈ロック用〉ペリンNa100単位/mLシリジ「オーツカ」10mL:1筒 Day2 Day3 Day4 Day5 ラシックス注 20mg 2mL:1A Day5 Day6	9 皮膚科/1. 悪性黒色腫
ダガルバジン	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アタラックスー P注 25mg 1mL:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 テ・サート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）:1V Day1 テ・サート注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ブドウ糖注射液 5% 500mL:1瓶 Day1 ダカルバジン注 100mg:1000mg/mi Day1 (GE-強ミノ)ネオファーゲン静注 20mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	9 皮膚科/1. 悪性黒色腫
ニボルマブ+イピリマブ（第1～4コース目）	1	20	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注（オーダ用）:80mg Day1 ヤーボイ点滴静注液（オーダ用） *:3mg/kg Day1	9 皮膚科/1. 悪性黒色腫
ニボルマブ（ニボルマブ+イピリマブ）（第5コース目以降）	1	13	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注（オーダ用）:240mg Day1	9 皮膚科/1. 悪性黒色腫
イピリマブ	1	20	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ヤーボイ点滴静注液（オーダ用） *:3mg/kg Day1	9 皮膚科/1. 悪性黒色腫
ニボルマブ【q2W】	1	13	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 オブジーボ点滴静注（オーダ用）:240mg Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	9 皮膚科/1. 悪性黒色腫
ニボルマブ【q4W】	1	27	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注（オーダ用）:480mg Day1	9 皮膚科/1. 悪性黒色腫
ベムプロリズマブ（q3w）	1	20	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL *:200mg Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	9 皮膚科/1. 悪性黒色腫
ベムプロリズマブ（q6w）	1	41	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL *:400mg Day1	9 皮膚科/1. 悪性黒色腫
DAV Feron療法	5	23	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100mL「HK」:1袋 Day1 ソルアセトF 輸液 500mL/袋:1袋 Day1 大塚生食注 100mL:100mL Day1 Day4 Day2 Day3 Day5 ダカルバジン注 100mg:600mg/mi Day1 Day4 Day2 Day3 Day5 生食注 20mL:20mL Day1 ニドラン（ACNU）注射用 50mg * :60mg Day1 オンコピン（VCR）注 1mg:0.6mg Day1 フエロン注射用 300万国単位（溶解液付）:5mL /mi Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	9 皮膚科/1. 悪性黒色腫

CA療法（皮膚科）	6	16	(GE-リタ)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 Day2 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day3 Day4 Day5 Day6 Day2 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ホーク」10mL:1筒 Day3 Day2 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :20mg/㎡ Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :500mL Day2 Day3 Day4 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :20mg/㎡ Day2 大塚生食注 100mL :100mL Day2 Day3 Day4 アタラックスーP注 25mg 1mL :1A Day2 Day3 Day4 ラシックス注 20mg 2mL :1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4	9 皮膚科/2. その他
Tri-weeklyトセタキセル療法（皮膚科）	1	20	大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :60mg/㎡ Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1	9 皮膚科/2. その他
VP-16療法（皮膚科）	5	21	大塚生食注 100mL :100mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :500mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 エトポシド点滴静注液100mg「サド」5mL :125mg Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 大塚生食注 50mL :50mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day1	9 皮膚科/2. その他
イリノテカン単剤療法（皮膚科）	15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):100mg/㎡ Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 Day8 Day15	9 皮膚科/2. その他
低用量ドセタキセル療法	15	13	大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 Day8 Day15 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :30mg/㎡ Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15	9 皮膚科/2. その他
アベルマブ療法（皮膚科）	1	13	大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 バベンチオ点滴静注200mg *:10mg/kg Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1	9 皮膚科/2. その他
上皮系皮膚悪性腫瘍 ニボルマブ【q2W】	1	13	大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 オブジーボ点滴静注 (オーダ用) :240mg Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1	9 皮膚科/2. その他
上皮系皮膚悪性腫瘍 ニボルマブ【q4W】	1	27	大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 100mL :100mL Day1 オブジーボ点滴静注 (オーダ用) :480mg Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1	9 皮膚科/2. その他
WeeklyPTX（血管肉腫・乳房外Paget）	15	13	大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL :1瓶 Day8 Day15 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15 大塚生食注 50mL :1瓶 Day8 Day15	9 皮膚科/2. その他
エリブリン（血管肉腫）	8	13	大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ハラヴェン静注 1mg :1.4mg/㎡ Day1 Day8 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 Day8	9 皮膚科/2. その他
リツキシマブ（天疱瘡）【初回】	1	13	リツキシマン点滴静注 500mg/50mL :1000mg Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :500mL Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1	9 皮膚科/2. その他
リツキシマブ（天疱瘡）【2回目以降】	1	13	リツキシマン点滴静注 500mg/50mL :1000mg Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :500mL Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1	9 皮膚科/2. その他
FP療法（皮膚科）	5	23	生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :5mg Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 デキサート注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (GE-リタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオウラシル注「トーフ」(オーダ用) :600mg/㎡ Day1 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ラシックス注 20mg 2mL :0.5A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオウラシル注「トーフ」(オーダ用) :700mg/㎡ Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day5	9 皮膚科/2. その他
HD-MTX	1	13	生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 注射用メソレキセート (オーダ用) :5000mg/㎡ Day1	A 脳神経外科
ペバシズマブBS〔10mg/kg〕	1	13	大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 ペバシズマブBS「CTNK」点滴静注 (オーダ用) :10mg/kg Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1	A 脳神経外科
ペバシズマブBS〔15mg/kg〕	1	20	大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 ペバシズマブBS「CTNK」点滴静注 (オーダ用) :15mg/kg Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1	A 脳神経外科
デモゾミド75mg/㎡+RT併用療法	42	28	ハロプロセドロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day4 Day5 Day6 Day7 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42 大塚蒸留水100mL :1瓶 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day4 Day5 Day6 Day7 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42 デモダール点滴静注用 100mg *:75mg/㎡ Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day4 Day5 Day6 Day7 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day4 Day5 Day6 Day7 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1	A 脳神経外科

PAV療法	29	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day29 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 ニドラン ( A C N U ) 注射用 5 0 m g * :100m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day29 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day8 Day29 オンコピン ( V C R ) 注 1 m g :1.5m g / m l Day8 Day29	A 脳神経外科
リツキサン (ネフローゼ症候群)	1	6	リツキサン注 (オーダ用) :375m g / m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ソル・コーテフ注射用 1 0 0 m g (溶解液付) :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	B 腎臓内科
リツキシマブBS (ネフローゼ症候群)	1	6	リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375m g / m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ソル・コーテフ注射用 1 0 0 m g (溶解液付) :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1	B 腎臓内科
リツキシマブBS (ANCA関連血管炎)	1	6	生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g 「マルイシ」:2錠 Day1	B 腎臓内科
IDR+AraC(induction)	8	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8 イダマイシン静注用 5 m g * :12m g / m l Day1 Day2 Day3 キロサイド注 (オーダ用) * :100m g / m l Day1 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
DNR+AraC(induction)	8	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 ダウノマイシン ( D N R ) 静注用 2 0 m g * :50m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注 (オーダ用) * :100m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
HD-AraC(consoli-1,2,3) (HDC→DEX)	6	22	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day3 Day4 Day5 Day6 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day3 Day4 Day5 Day1 Day2 デキサメタゾン注射液 1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day3 Day4 Day5 Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day3 Day4 Day5 Day1 Day2 キロサイドN注 1000mg/50mL * :2000m g / m l Day3 Day4 Day5 Day1 Day2	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
MIT+AraC(consoli-1)	6	22	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 ノバントロン ( MIT ) 注 1 0 m g (10mg/5mL) * :7m g / m l Day2 Day3 Day1 キロサイド注 (オーダ用) * :200m g / m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1 Day6	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
DNR+AraC(consoli-2)	6	22	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day6 ダウノマイシン ( D N R ) 静注用 2 0 m g * :50m g / m l Day1 Day2 Day3 キロサイド注 (オーダ用) * :200m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
ACR+AraC (consoli-3)	6	3	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 アクラシノン ( A C R ) 注射用 2 0 m g * :20m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注 (オーダ用) * :200m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
A-triple V (consoli-4)	10	18	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day10 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day10 エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サト」 5 m l :100m g / m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 キロサイド注 (オーダ用) * :200m g / m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day8 Day10 オンコピン ( V C R ) 注 1 m g :0.8m g / m l Day8 注射用フィルデシン (オーダ用) * :2m g / m l Day10	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
髄注(MTX+AraC+PSL)(consoli-2)	1	1	注射用メソトレキセート 5 0 mg:15m g Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :2m l Day1 キロサイド注 (オーダ用) * :40m g Day1 水溶性プレドニン 2 0 m g :10m g Day1 生食注 2 0 m l :1.4m l Day1	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
B群 (induction)	8	20	グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day6 Day7 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3 キロサイド注 (オーダ用) * :100m g / m l Day6 Day7 Day3 Day1 Day4 Day5 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day6 Day7 Day3 Day1 Day4 Day5 Day2 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 イダマイシン静注用 5 m g * :12m g / m l Day1 Day2	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
C群 (induction)	8	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 キロサイド注 (オーダ用) * :100m g / m l Day4 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day4 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day3 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 Day4 イダマイシン静注用 5 m g * :12m g / m l Day3 Day1 Day2	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
D群 (A群→D群) (induction)	8	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 キロサイド注 (オーダ用) * :100m g / m l Day4 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day4 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day3 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 Day4 イダマイシン静注用 5 m g * :12m g / m l Day3 Day1 Day2	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
D群 (B群→D群) (induction)	3	25	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day3 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day2 Day1 キロサイド注 (オーダ用) * :100m g / m l Day2 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day1 イダマイシン静注用 5 m g * :12m g / m l Day1	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
D群 (C群→D群) (induction)	1	27	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 イダマイシン静注用 5 m g * :12m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	C 血液内科/1. 白血病/1. AML

MIT+AraC(consoli-1)	6	22	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 ノバントロン (MIT) 注 1 0 m g (10mg/5mL) *:7m g /m l Day2 Day3 Day1 キロサイド注 (オーダ用) *:200m g /m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1 Day6	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
DNR+AraC(consoli-2)	6	22	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day6 ダウノマイシン (D N R) 静注用 2 0 m g *:50m g /m l Day1 Day2 Day3 キロサイド注 (オーダ用) *:200m g /m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
IDR+AraC(consoli-3)	6	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day6 Day3 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day3 Day5 Day1 Day4 Day2 イダマイシン静注用 5 m g *:12m g /m l Day3 Day1 Day2 キロサイド注 (オーダ用) *:140m g /m l Day3 Day5 Day1 Day4 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day3 Day5 Day1 Day4 Day2	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
MEC (AraC中等量1g/m)	6	22	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ノバントロン (MIT) 注 1 0 m g (10mg/5mL) *:6m g /m l Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g「サド」 5 m l :80m g /m l Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day1 キロサイドN注 1000mg/50mL *:1000m g /m l Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day1	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
ゲムツズマブオゾガマイシン (マイダグーカ) (HDC→DEX)	1	13	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 マイロターグ点滴静注用 5 m g *:9m g /m l Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
CPX-351 (induction-1)	5	30	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day3 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day3 Day5 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day3 Day5 Day1 ピキセオス配合静注用 *:100U/m l Day3 Day5 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 Day3 Day5 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day3 Day5	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
CPX-351 (induction-2)	3	32	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day3 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day3 Day1 ピキセオス配合静注用 *:100U/m l Day3 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 Day3 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day3	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
CPX-351 (consolidation)	3	32	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day3 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day3 Day1 ピキセオス配合静注用 *:65U/m l Day3 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 Day3 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day3	C 血液内科/1. 白血病/1. AML
ブリンサマブ寛解導入療法 (1コース) (45kg以上)	29	13	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day3 Day8 Day7 Day5 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生食注 2 0 m l :6m l Day3 Day8 Day7 Day5 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 (ヒーリンサイト用) 輸液安定化液:5.5m l Day3 Day8 Day7 Day5 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ヒーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g *:18μ g Day3 Day7 Day5 Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :1A Day3 Day8 Day7 Day5 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ヒーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g *:28μ g Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 デキスト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :2V Day8 Day1 デキスト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day8 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day29 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day29 Day1	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
ブリンサマブ寛解導入療法 (2コース) (45kg以上)	29	13	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生食注 2 0 m l :6m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ヒーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g *:28μ g Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :3m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 デキスト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :2V Day1 デキスト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day29 Day1	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
ブリンサマブ地固め療法 (3-5コース) (45kg以上)	29	13	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生食注 2 0 m l :6m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ヒーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g *:28μ g Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 デキスト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当) :2V Day1 デキスト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL

ブリンサマフ維持療法（6-9コース）（45kg以上）	29	55	大塚生食注 50mL:1瓶 Day29 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生食注 20mL:6mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ビーリンサイト点滴静注用 35μg *:28μg Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 大塚蒸留水 20mL（抗がん剤調製用）:1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 テキサート注射液6.6mg（リノ酸塩8mg相当）:2V Day1 テキサート注射液1.65mg（リノ酸塩2mg相当）:2A Day1	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
携帯ポンプブリンサマフ寛解導入療法（1コース）（45kg以上）	29	13	テキサート注射液6.6mg（リノ酸塩8mg相当）:2V Day8 Day1 テキサート注射液1.65mg（リノ酸塩2mg相当）:2A Day8 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day29 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day22 Day25 Day1 Day18 Day15 Day11 Day8 Day4 生食注 20mL:6mL Day22 Day25 Day1 Day18 Day15 Day11 Day8 Day4 （ビーリンサイト用）輸液安定化液:5.5mL Day22 Day25 Day1 Day18 Day15 Day11 Day8 Day4 ビーリンサイト点滴静注用 35μg *:84μg Day22 Day15 Day8 大塚蒸留水（注射用水） 20mL:1A Day22 Day25 Day1 Day18 Day15 Day11 Day8 Day4 ビーリンサイト点滴静注用 35μg *:112μg Day25 Day18 Day11 ビーリンサイト点滴静注用 35μg *:27μg Day1 ビーリンサイト点滴静注用 35μg *:36μg Day4	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
ベスボンサ療法1コース目（HDC→DEX）	15	6	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 テキサート注射液1.65mg（リノ酸塩2mg相当）:2A Day1 Day8 Day15 ボララミン注 5mg/mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 ベスボンサ点滴静注用 1mg *:0.8mg/mL Day1 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 ベスボンサ点滴静注用 1mg *:0.5mg/mL Day8 Day15	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
ベスボンサ療法2, 3コース目（非寛解症例）（HDC→DEX）	15	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 テキサート注射液1.65mg（リノ酸塩2mg相当）:2A Day1 Day8 Day15 ボララミン注 5mg/mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 ベスボンサ点滴静注用 1mg *:0.8mg/mL Day1 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 ベスボンサ点滴静注用 1mg *:0.5mg/mL Day8 Day15	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
ベスボンサ療法2-6コース目（寛解症例）（HDC→DEX）	15	13	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 テキサート注射液1.65mg（リノ酸塩2mg相当）:2A Day1 Day8 Day15 ボララミン注 5mg/mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 ベスボンサ点滴静注用 1mg *:0.5mg/mL Day1 Day8 Day15 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
Ph+ ALL213（強化地固め療法）	22	16	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 ダウノマイシン（DNR）静注用 20mg *:45mg/mL Day1 Day2 Day3 オンコピン（VCR）注 1mg:1.3mg/mL Day1 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day3 エンドキサン注（オーダ用）:1200mg/mL Day1 生理食塩液〔ヒカリ〕 500mL:1袋 Day1 注射用メソトレキセート 50mg:15mg Day1 大塚蒸留水（注射用水） 20mL:2mL Day1 テキサート注射液6.6mg（リノ酸塩8mg相当）:0.5V Day1 生食注 20mL:0.4mL Day1	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
Ph+ ALL213（地固め療法C1）	4	27	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 ソル・メドロール静注用 40mg:50mg Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 注射用メソトレキセート（オーダ用）:100mg/mL Day1 注射用メソトレキセート（オーダ用）:900mg/mL Day1 生理食塩液〔ヒカリ〕 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 キロサイド注（オーダ用） *:2000mg/mL Day2 Day3 キロサイドN注 1000mg/50mL *:2000mg/mL Day2 Day3 注射用メソトレキセート 50mg:15mg Day1 大塚蒸留水（注射用水） 20mL:2mL Day1 テキサート注射液6.6mg（リノ酸塩8mg相当）:0.5V Day1 生食注 20mL:0.4mL Day1	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
Ph+ ALL213（地固め療法C2）	1	28	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 ダウノマイシン（DNR）静注用 20mg *:45mg/mL Day1 オンコピン（VCR）注 1mg:1.3mg/mL Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 エンドキサン注（オーダ用）:1200mg/mL Day1 生理食塩液〔ヒカリ〕 500mL:1袋 Day1 注射用メソトレキセート 50mg:15mg Day1 大塚蒸留水（注射用水） 20mL:2mL Day1 テキサート注射液6.6mg（リノ酸塩8mg相当）:0.5V Day1 生食注 20mL:0.4mL Day1	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
Ph+ ALL213（非移植群・維持療法）	1	34	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 オンコピン（VCR）注 1mg:1.3mg/mL Day1	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
Hyper-CVAD	14	7	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day4 Day2 Day3 Day11 Day12 Day13 Day14 バロノセトロン静注0.75mg/5mL〔タイホウ〕:1瓶 Day1 テキサート注射液6.6mg（リノ酸塩8mg相当）:6V Day1 Day4 Day3 Day11 Day12 Day13 Day14 Day2 生理食塩液〔ヒカリ〕 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エンドキサン注（オーダ用）:300mg/mL Day1 Day2 Day3 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 ウロミテキサン注 400mg 4mL:600mg/mL Day1 Day2 Day3 オンコピン（VCR）注 1mg:1.4mg/mL Day4 Day11 ドキソルビシン塩酸塩注射用（オーダ用）:50mg/mL Day4	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
MA療法	4	27	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day3 ソル・メドロール静注用 40mg:50mg Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 注射用メソトレキセート（オーダ用）:200mg/mL Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 注射用メソトレキセート（オーダ用）:800mg/mL Day1 生理食塩液〔ヒカリ〕 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 キロサイドN注 1000mg/50mL *:3000mg/mL Day2 Day3	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL

Ph(-) ALL202-O 地固め療法 (C2, C5)	16	12	生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 Day15 注射用メトトレキセート (オーダ用) : 3000 m g / m l Day1 Day15 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」: 1 袋 Day1 Day15 オンコビン (V C R) 注 1 m g : 1.3 m g / m l Day1 Day15 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day15 Day16 注射用メトトレキセート 5 0 m g : 15 m g Day1 Day15 大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l : 2 m l Day1 Day15 デキサト注射液 6.6 m g (リソ酸塩 8 m g 相当) : 0.5 V Day1 Day15 生食注 2 0 m l : 0.4 m l Day1 Day15	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
Ph(-) ALL202-O 再寛解導入療法 (C3)	40	2	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」: 1 袋 Day1 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40 Day8 Day15 Day29 オンコビン (V C R) 注 1 m g : 1.3 m g / m l Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40 Day8 Day15 Day29 エンドキサン注 (オーダ用) : 1000 m g / m l Day29 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day29 キロサイド注 (オーダ用) * : 75 m g / m l Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40 注射用メトトレキセート 5 0 m g : 15 m g Day29 Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l : 2 m l Day29 Day1 キロサイド (A r a C) 注 2 0 m g / m L * : 40 m g Day29 Day1 デキサト注射液 6.6 m g (リソ酸塩 8 m g 相当) : 0.5 V Day29 Day1 生食注 2 0 m l : 1.4 m l Day29 Day1 ドキソルビン塩酸塩注射液 (オーダ用) : 30 m g / m l Day1 Day8 Day15	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
Ph(-) ALL202-O 維持療法	1	23	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 オンコビン (V C R) 注 1 m g : 1.3 m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
Ph(-) ALL202-O 寛解導入療法 (VCR→VDS)	22	6	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day8 Day15 Day22 Day3 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 注射用フィルデシン (オーダ用) * : 3 m g / m l Day8 Day15 Day22 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」: 1 袋 Day1 Day2 Day3 ダウノマイシン (D N R) 静注用 2 0 m g * : 60 m g / m l Day1 Day2 Day3 エンドキサン注 (オーダ用) : 1200 m g / m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 ロイナーゼ注用 5 0 0 0 * : 3000 KU / m l Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
Ph(-) ALL202-O【25以上60歳未満】 induction	22	6	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day8 Day15 Day22 Day3 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 オンコビン (V C R) 注 1 m g : 1.3 m g / m l Day8 Day15 Day22 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」: 1 袋 Day1 Day2 Day3 ダウノマイシン (D N R) 静注用 2 0 m g * : 60 m g / m l Day1 Day2 Day3 エンドキサン注 (オーダ用) : 1200 m g / m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 ロイナーゼ注用 5 0 0 0 * : 3000 KU / m l Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
Ph(-) ALL202-O 地固め (C1, C4)	4	24	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day3 Day4 Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day3 Day1 Day2 キロサイドN注 1000 m g / 50 m L * : 2000 m g / m l Day3 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」: 1 袋 Day3 Day2 Day1 デキサト注射液 6.6 m g (リソ酸塩 8 m g 相当) : 6 V Day2 Day3 Day1 エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド」 5 m l : 100 m g / m l Day1 Day2 Day3 注射用メトトレキセート 5 0 m g : 15 m g Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l : 2 m l Day1 デキサト注射液 6.6 m g (リソ酸塩 8 m g 相当) : 0.5 V Day1 生食注 2 0 m l : 0.4 m l Day1	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
Ph(-) ALL202-O 再寛解導入療法 (C3) (VCR→VDS)	40	2	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」: 1 袋 Day1 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40 Day8 Day15 Day29 注射用フィルデシン (オーダ用) * : 3 m g / m l Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40 Day8 Day15 Day29 エンドキサン注 (オーダ用) : 1000 m g / m l Day29 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day29 キロサイド注 (オーダ用) * : 75 m g / m l Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40 注射用メトトレキセート 5 0 m g : 15 m g Day29 Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l : 2 m l Day29 Day1 キロサイド (A r a C) 注 2 0 m g / m L * : 40 m g Day29 Day1 デキサト注射液 6.6 m g (リソ酸塩 8 m g 相当) : 0.5 V Day29 Day1 生食注 2 0 m l : 1.4 m l Day29 Day1 ドキソルビン塩酸塩注射液 (オーダ用) : 30 m g / m l Day1 Day8 Day15	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
T-ALL213-O (60才未満)	22	7	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day8 Day15 Day2 Day3 Day9 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day22 Day20 オンコビン (V C R) 注 1 m g : 1.3 m g / m l Day8 Day15 Day22 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」: 1 袋 Day1 Day2 Day3 ダウノマイシン (D N R) 静注用 2 0 m g * : 45 m g / m l Day1 Day2 Day3 エンドキサン注 (オーダ用) : 1200 m g / m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l : 1 瓶 Day8 Day10 Day16 Day18 Day12 Day22 Day14 Day20 ロイナーゼ注用 5 0 0 0 * : 5000 KU / m l Day8 Day10 Day16 Day18 Day12 Day22 Day14 Day20	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL
T-ALL213-O 再寛解導入療法	19	2	大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day3 Day5 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」: 1 袋 Day1 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day8 Day3 Day5 アラノンジー静注用 2 5 0 m g / 5 0 m L * : 1500 m g / m l Day1 Day3 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1 袋 Day1 Day8 Day3 Day5 エンドキサン注 (オーダ用) : 1000 m g / m l Day8 キロサイド注 (オーダ用) * : 75 m g / m l Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 注射用メトトレキセート 5 0 m g : 15 m g Day8 大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l : 2 m l Day8 キロサイド (A r a C) 注 2 0 m g / m L * : 40 m g Day8 デキサト注射液 6.6 m g (リソ酸塩 8 m g 相当) : 0.5 V Day8 生食注 2 0 m l : 1.4 m l Day8 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day8 Day3 Day5	C 血液内科/1. 白血病/2. ALL

AG療法（ガザイバ1コース目）	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 Day8 Day15 Day2 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 Day2 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L * :100m g Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :96m l Day1 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L * :1000m g Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day8 Day15 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L (薬価なし) * :900m g Day2 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :214m l Day2	C 血液内科/1. 白血病/3. CLL
AG療法（ガザイバ2コース目以降）	1	27	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L * :1000m g Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1	C 血液内科/1. 白血病/3. CLL
[GE]AZA療法〔皮下注〕	7	21	大塚蒸留水（注射用水） 2 0 m l :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「サワイ」 * :75m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7	C 血液内科/2. 骨髄異形成症候群
[GE]AZA療法〔点滴〕	7	21	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「サワイ」 * :75m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7	C 血液内科/2. 骨髄異形成症候群
CA療法（MDS200） : cytarabine点滴	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day15 Day4 アクラシン（A C R）注射用 2 0 m g * :14m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 キロサイド注（オーダ用） * :20m g / m l Day1 Day2 Day5 Day3 Day4 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day5 Day3 Day4 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14	C 血液内科/2. 骨髄異形成症候群
CA療法（MDS200） : cytarabine皮下注射	14	14	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 アクラシン（A C R）注射用 2 0 m g * :14m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 キロサイド注（オーダ用） * :10m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4	C 血液内科/2. 骨髄異形成症候群
DA-EPOCH	5	16	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 Day5 水溶性プレドニン 2 0 m g :60m g / m l Day2 Day3 Day4 Day1 Day5 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ドキソルビン塩酸塩注射用（オーダ用） :10m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 オンコビン（V C R）注 1 m g :0.4m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド」 5 m l :50m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day5 エンドキサン注（オーダ用） :750m g / m l Day5	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
DA-EPOCH	5	16	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 Day5 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ドキソルビン塩酸塩注射用（オーダ用） :10m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 オンコビン（V C R）注 1 m g :0.4m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド」 5 m l :50m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day5 エンドキサン注（オーダ用） :750m g / m l Day5	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
G-B（G別日投与）1サイクル目	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 Day3 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L * :1000m g Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」（オーダ用） * :90m g / m l Day2 Day3 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day3	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
G-B（G別日投与）1サイクル目 Benda10分投与	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 Day3 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L * :1000m g Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」（オーダ用） * :90m g / m l Day2 Day3	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
G-B（G別日投与）2サイクル以降	3	25	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L * :1000m g Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」（オーダ用） * :90m g / m l Day2 Day3 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day3	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
G-B（G別日投与）2サイクル以降 Benda10分投与	3	25	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L * :1000m g Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」（オーダ用） * :90m g / m l Day2 Day3	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
G維持療法	1	54	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L * :1000m g Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
PCNSL inuduction（MPV）	1	13	生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 注射用メトトレキセート（オーダ用） :3500m g / m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 オンコビン（V C R）注 1 m g :1.4m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫

PCNSL consolidation(HD-AraC) (HDC→DEX)	2	26	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 テキサト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 キロサイドN注 1000mg/50mL *:3000mg/m Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 Day2 テキサト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 水溶性プレドニン 20mg:100mg Day2 ボライビー点滴静注用 (オーダ用) *:1.8mg/kg Day2 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day2 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50mg/m Day2 エンドキサン (C P A) 注 500mg:750mg/m Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
Pola-R-CHP【2日レジメン】【初回】(HDC→DEX)	2	19	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 Day2 テキサト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 水溶性プレドニン 20mg:100mg Day2 ボライビー点滴静注用 (オーダ用) *:1.8mg/kg Day2 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day2 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50mg/m Day2 エンドキサン (C P A) 注 500mg:750mg/m Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
Pola-R-CHP【2日レジメン】【初回】(HDC→DEX)	2	19	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 Day2 テキサト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 ボライビー点滴静注用 (オーダ用) *:1.8mg/kg Day2 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day2 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50mg/m Day2 エンドキサン (C P A) 注 500mg:750mg/m Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
Pola-R-CHP【2日レジメン】【2-6サイクル】(HDC→DEX)	2	19	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 Day2 テキサト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 水溶性プレドニン 20mg:100mg Day2 ボライビー点滴静注用 (オーダ用) *:1.8mg/kg Day2 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day2 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50mg/m Day2 エンドキサン (C P A) 注 500mg:750mg/m Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
Pola-R-CHP【2日レジメン】【2-6サイクル】(HDC→DEX)	2	19	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 Day2 テキサト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 ボライビー点滴静注用 (オーダ用) *:1.8mg/kg Day2 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day2 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50mg/m Day2 エンドキサン (C P A) 注 500mg:750mg/m Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
Pola-R-CHP【1日】レジメン【初回】	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 水溶性プレドニン 20mg:100mg Day1 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 ボライビー点滴静注用 (オーダ用) *:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50mg/m Day1 エンドキサン (C P A) 注 500mg:750mg/m Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
Pola-R-CHP【1日】レジメン【初回】	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 ボライビー点滴静注用 (オーダ用) *:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50mg/m Day1 エンドキサン (C P A) 注 500mg:750mg/m Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
Pola-R-CHP【1日】レジメン【2-6サイクル】	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 水溶性プレドニン 20mg:100mg Day1 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 ボライビー点滴静注用 (オーダ用) *:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50mg/m Day1 エンドキサン (C P A) 注 500mg:750mg/m Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
Pola-R-CHP【1日】レジメン【2-6サイクル】	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1mL:1A Day1 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 ボライビー点滴静注用 (オーダ用) *:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50mg/m Day1 エンドキサン (C P A) 注 500mg:750mg/m Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
CHOP	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 水溶性プレドニン 20mg:100mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 オンコピン (V C R) 注 1mg:1.4mg/m Day1 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :750mg/m Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
CHOP	1	20	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 オンコピン (V C R) 注 1mg:1.4mg/m Day1 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50mg/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :750mg/m Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫

R-CHASE	4	17	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day2 Day3 Day4 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :5V Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day4 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド」 5 m l :100m g /m l Day2 Day3 Day4 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day3 Day4 エンドキサン注 (オーダ用) :1200m g /m l Day2 キロサイドN注 1000mg/50mL *:2000m g /m l Day3 Day4	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
R-THP-COP	2	18	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day2 オンコビン (V C R) 注 1 m g :1.4m g /m l Day2 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day2 ビノルビン注射用 (オーダ用) :30m g /m l Day2 エンドキサン注 (オーダ用) :750m g /m l Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
THP-COP	1	19	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 オンコビン (V C R) 注 1 m g :1.4m g /m l Day1 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 ビノルビン注射用 (オーダ用) :30m g /m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :750m g /m l Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
THP-COP (70-79歳)	1	19	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 水溶性プレドニン 2 0 m g :40m g /m l Day1 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 ビノルビン注射用 (オーダ用) :40m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 オンコビン (V C R) 注 1 m g :1.4m g /m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :650m g /m l Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
SMILE療法 (ロイナーゼ点滴)	20	8	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 Day3 Day4 注射用メソトレキセート (オーダ用) :2000m g /m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :5V Day2 Day3 Day4 イホマイド (I F X) 注射用 1 g :1500m g /m l Day2 Day3 Day4 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド」 5 m l :100m g /m l Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注 4 0 0 m g 4 m l :300m g /m l Day2 Day3 Day4 ロイナーゼ注用 5 0 0 0 *:6000KU/m l Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 大塚蒸留水 2 0 m L (抗がん剤調製用) :1A Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
SMILE療法 (ロイナーゼ筋注)	20	8	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 注射用メソトレキセート (オーダ用) :2000m g /m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当) :5V Day2 Day3 Day4 イホマイド (I F X) 注射用 1 g :1500m g /m l Day2 Day3 Day4 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド」 5 m l :100m g /m l Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注 4 0 0 m g 4 m l :300m g /m l Day2 Day3 Day4 ロイナーゼ注用 5 0 0 0 *:6000KU/m l Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 大塚蒸留水 2 0 m L (抗がん剤調製用) :1A Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 キシリカイン注ボリアンブ 2 % 5 m L :0.5m l Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
ガザイバ単剤 (他レジメン追加用)	1	1	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g /4 0 m L *:1000m g Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :460m l Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
ガザイバ導入	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g /4 0 m L *:1000m g Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :460m l Day1 Day8 Day15	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
ベンダムスチン(トレアキシンGE)	2	19	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day2 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day2 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」 (オーダ用) *:120m g /m l Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
ベンダムスチン(トレアキシンGE)Benda10分投与	2	19	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」 (オーダ用) *:120m g /m l Day1 Day2 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
リツキシマブ+ベンダムスチン	3	25	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day2 Day3 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day3 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」 (オーダ用) *:90m g /m l Day2 Day3 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375m g /m l Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
リツキシマブ+ベンダムスチン B10分	3	25	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day2 Day3 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」 (オーダ用) *:90m g /m l Day2 Day3 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375m g /m l Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
リツキシマブ単独	1	6	リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375m g /m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :500m l Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
リツキシマブ単独 (4mg/ml)	1	6	リツキシマブBS「ファイザー」(オーダ用) :375m g /m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :56.25m l /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫

G-CHOP 1サイクル目	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L *:1000m g Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day2 水溶性プレドニン 2 0 m g :100m g Day2 オンコピン（V C R）注 1 m g :1.4m g /m l Day2 ドキソルビシン塩酸塩注射用（オーダ用）:50m g /m l Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 エンドキサン注（オーダ用）:750m g /m l Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
G-CHOP 1サイクル目	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L *:1000m g Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day2 オンコピン（V C R）注 1 m g :1.4m g /m l Day2 ドキソルビシン塩酸塩注射用（オーダ用）:50m g /m l Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 エンドキサン注（オーダ用）:750m g /m l Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
G-CHOP 2-6サイクル目	2	19	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L *:1000m g Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day2 水溶性プレドニン 2 0 m g :100m g Day2 オンコピン（V C R）注 1 m g :1.4m g /m l Day2 ドキソルビシン塩酸塩注射用（オーダ用）:50m g /m l Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 エンドキサン注（オーダ用）:750m g /m l Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
G-CHOP 2-6サイクル目	2	19	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L *:1000m g Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day2 オンコピン（V C R）注 1 m g :1.4m g /m l Day2 ドキソルビシン塩酸塩注射用（オーダ用）:50m g /m l Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 エンドキサン注（オーダ用）:750m g /m l Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
G-CVP 1サイクル目	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L *:1000m g Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day2 水溶性プレドニン 2 0 m g :100m g Day2 オンコピン（V C R）注 1 m g :1.4m g /m l Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 エンドキサン注（オーダ用）:750m g /m l Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
G-CVP 1サイクル目	15	6	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L *:1000m g Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day2 オンコピン（V C R）注 1 m g :1.4m g /m l Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 エンドキサン注（オーダ用）:750m g /m l Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
G-CVP 2-6サイクル目	2	19	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L *:1000m g Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day2 水溶性プレドニン 2 0 m g :100m g Day2 オンコピン（V C R）注 1 m g :1.4m g /m l Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 エンドキサン注（オーダ用）:750m g /m l Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
G-CVP 2-6サイクル目	2	19	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ:1袋 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m L *:1000m g Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day2 オンコピン（V C R）注 1 m g :1.4m g /m l Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 エンドキサン注（オーダ用）:750m g /m l Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
ICE療法	3	18	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g「サド」5 m l :100m g /m l Day1 Day2 Day3 イホマイド（I F X）注射用 1 g :5000m g /m l Day2 ウロミテキサン注 4 0 0 m g 4 m l :5000m g /m l Day2 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day2 カルボプラチン注射液「NK」（オーダー用）:0m g /A Day2	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫

modified ICE療法	5	16	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g「サド」 5 m l :100m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イホマイド（ I F X ）注射用 1 g :1200m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 カルボプラチン注射液「NK」 （オーダー用） :400m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ウロミテキサン注 4 0 0 m g 4 m l :400m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
DeVIC	3	18	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当） :6V Day1 Day2 Day3 イホマイド（ I F X ）注射用 1 g :1500m g / m l Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注 4 0 0 m g 4 m l :300m g / m l Day1 Day2 Day3 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g「サド」 5 m l :100m g / m l Day1 Day2 Day3 カルボプラチン注射液「NK」 （オーダー用） :300m g / m l Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
GCD	8	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当） :5V Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「 N K 」 （オーダー用） :1000m g / m l Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 カルボプラチン注射液 （オーダー用） :0m g / A Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当） :1V Day8	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
GDP	8	13	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1 Day4 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダー用） :25m g / m l Day2 Day3 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day2 Day3 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当） :5V Day1 Day2 Day3 Day4 ゲムシタピン点滴静注液「 N K 」 （オーダー用） :1000m g / m l Day1 Day8 大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l「HK」:1袋 Day8	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
CHASE	3	18	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当） :5V Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g「サド」 5 m l :100m g / m l Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 エンドキサン注 （オーダー用） :1200m g / m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m l :1袋 Day2 Day3 キロサイドN注 1000mg/50mL *:2000m g / m l Day2 Day3 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
mini-MEAM	6	22	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 Day6 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l「HK」:1袋 Day3 Day4 Day5 Day1 Day2 Day6 キロサイド注 （オーダー用） *:100m g / m l Day3 Day4 Day5 Day2 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day3 Day4 Day5 Day2 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g「サド」 5 m l :75m g / m l Day3 Day4 Day5 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day3 Day4 Day5 Day2 注射用サイメリン 5 0 m g（ M C N U ） *:60m g / m l Day1 アルケラン（ M e l ） 静注用 5 0 m g *:30mg / m l Day6	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
ESHAP	5	16	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day5 Day2 Day3 Day4 Day1 シタラピン点滴静注液 1 g「テバ」（1g / 5 0 m l） *:2000m g / m l Day5 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l「HK」:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 ソル・メドロール静注用 5 0 0 m g :500m g Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g「サド」 5 m l :40m g / m l Day2 Day3 Day4 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダー用） :25m g / m l Day2 Day3 Day4 Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
Pola-BR（1サイクル目）（HDC→DEX）	3	18	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day3 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液1.65mg（リン酸塩2mg相当）:2A Day1 Day2 Day3 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダー用) :375m g / m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 ボライビー点滴静注用（オーダー用） *:1.8mg/kg Day2 大塚蒸留水 1 0 0 m l（抗がん剤調製用）:1瓶 Day2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」（オーダー用） *:90m g / m l Day2 Day3	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
Pola-BR（1サイクル目）Benda10分投与（HDC→DEX）	3	18	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液1.65mg（リン酸塩2mg相当）:2A Day1 Day2 Day3 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day2 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダー用) :375m g / m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 ボライビー点滴静注用（オーダー用） *:1.8mg/kg Day2 大塚蒸留水 1 0 0 m l（抗がん剤調製用）:1瓶 Day2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」（オーダー用） *:90m g / m l Day2 Day3	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
Pola-BR（2～6サイクル目）（HDC→DEX）	2	19	大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day2 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 デキサート注射液1.65mg（リン酸塩2mg相当）:2A Day1 Day2 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダー用) :375m g / m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」（オーダー用） *:90m g / m l Day2 Day1 ボライビー点滴静注用（オーダー用） *:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m l（抗がん剤調製用）:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
Pola-BR（2～6サイクル目）Benda10分投与（HDC→DEX）	2	19	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 デキサート注射液1.65mg（リン酸塩2mg相当）:2A Day1 Day2 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 リツキシマブBS「ファイザー」(オーダー用) :375m g / m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」（オーダー用） *:90m g / m l Day2 Day1 ボライビー点滴静注用（オーダー用） *:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m l（抗がん剤調製用）:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫

エブコリタマブ 1サイクル目	22	6	エブキンリ皮下注 4 mg/0.8 mL *:0.8mg g Day8 生食注 20 mL :4.2m l Day8 生理食塩液「ヒカリ」 500 mL :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :2V Day1 Day8 Day15 Day22 デキサト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):1A Day1 Day8 Day15 Day22 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 50 mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 エブキンリ皮下注 4 mg/0.8 mL *:0.16mg g Day1 生食注 20 mL :1A Day1 エブキンリ皮下注 4 mg/0.8 mL *:48mg g Day15 Day22	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
エブコリタマブ 2-3サイクル目	22	6	エブキンリ皮下注 4 mg/0.8 mL *:48mg g Day1 Day22 Day8 Day15	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
エブコリタマブ 4-9サイクル目	15	13	エブキンリ皮下注 4 mg/0.8 mL *:48mg g Day1 Day15	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
エブコリタマブ 10サイクル目以降	1	27	エブキンリ皮下注 4 mg/0.8 mL *:48mg g Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
モスネツズマブ 1サイクル目	15	6	生理食塩液「ヒカリ」 500 mL :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサト注射液6.6mg (リッ酸塩8mg相当) :3V Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50 mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 ルンスミオ点滴静注1mg/1m L *:1mg g Day1 大塚生食注 50 mL :49m l Day1 ルンスミオ点滴静注1mg/1m L *:2mg g Day8 大塚生食注 50 mL :48m l Day8 ルンスミオ点滴静注30mg g/30m L *:60mg g Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250 mL :190袋 Day15	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
mLSG15療法	17	11	大塚生食注 100 mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 グラニセロン点滴静注バッグ 3mg / 100 mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 水溶性プレドニン 20mg g/40mg g/㎡ Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 オンコピン（VCR）注 1mg :1mg/㎡ Day1 大塚生食注 50 mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 ドキソルビン塩酸塩注射用（オーダ用）:40mg g/㎡ Day1 エンドキサン注（オーダ用）:350mg g/㎡ Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500 mL :1袋 Day1 Day15 Day16 Day17 ドキソルビン塩酸塩注射用（オーダ用）:30mg g/㎡ Day8 注射用サイメリン 50mg (MCNU) *:60mg g/㎡ Day8 注射用フィルデシン（オーダ用） *:2.4mg g/㎡ Day15 エトポシド点滴静注液 100mg「サト」 5m l :100mg g/㎡ Day15 Day16 Day17 大塚生食注ソフトバッグ 250 mL :1袋 Day15 カルボプラチン注射液（オーダ用）:250mg g/㎡ Day15	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
mLSG15用髄注(MTX+AraC+PSL)	1	1	注射用メソトレキセート 50mg:15mg g Day1 大塚蒸留水（注射用水） 20 mL :2m l Day1 キロサイド注（オーダ用） *:40mg g Day1 水溶性プレドニン 20mg g:10mg g Day1 生食注 20 mL :1.4m l Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
モガムリズマブ（ボテリジオ）	50	1	大塚生食注 100 mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 ソル・コステフ注射用 100mg（溶解液付）:1瓶 Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 大塚生食注 50 mL :1瓶 Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 ボテリジオ点滴静注 20mg g/5 mL *:1mg /kg Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 大塚生食注ソフトバッグ 250 mL :1袋 Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
モガムリズマブ（ボテリジオ）(HDC→DEX)	50	1	大塚生食注 100 mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 デキサト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 大塚生食注 50 mL :1瓶 Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 ボテリジオ点滴静注 20mg g/5 mL *:1mg /kg Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 大塚生食注ソフトバッグ 250 mL :1袋 Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
ニボルマブ療法【q2W】	1	13	大塚生食注 100 mL :1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 240mg / 24 mL *:240mg g Day1 大塚生食注 50 mL :1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
ベムプロリズマブ療法【q3w】	1	20	大塚生食注 100 mL :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg / 4m L *:200mg g Day1 大塚生食注 50 mL :1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
ベムプロリズマブ療法【q6w】	1	41	大塚生食注 100 mL :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg / 4m L *:400mg g Day1 大塚生食注 50 mL :1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
ニボルマブ療法【q4W】	1	27	大塚生食注 100 mL :1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 240mg / 24 mL *:480mg g Day1 大塚生食注 50 mL :1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
A+AVD (HDC→DEX)	15	13	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day15 大塚生食注 50 mL :1瓶 Day15 ダカルバジン注 100mg g:375mg g/㎡ Day15 大塚蒸留水 100 mL（抗がん剤調製用）:1瓶 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250 mL :1袋 Day15 (GE-ツタ)ソルデム3A輸液 500 mL :1袋 Day15 ドキソルビン塩酸塩注射用（オーダ用）:25mg g/㎡ Day15 エクザール（VBL） 10mg:6mg g/㎡ Day15 デキサト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day15 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day15 アドセトリス点滴静注用 50mg *:1.2mg g/kg Day15 大塚生食注 100 mL :1瓶 Day15 大塚蒸留水 100 mL :1瓶 Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
アドセトリス単剤 救援療法 (HDC→DEX)	1	20	大塚生食注 100 mL :1瓶 Day1 デキサト注射液1.65mg(リッ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1 大塚生食注 50 mL :1瓶 Day1 アドセトリス点滴静注用 50mg *:1.8mg g/kg Day1 大塚蒸留水 100 mL :1瓶 Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
ABVD	15	13	大塚生食注 100 mL :1瓶 Day1 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day15 ソル・コステフ注射用 100mg（溶解液付）:3瓶 Day1 Day15 大塚生食注 50 mL :1瓶 Day1 Day15 ブレオ（Bleo）注 15mg *:10mg g/㎡ Day1 Day15 ダカルバジン注 100mg g:375mg g/㎡ Day1 Day15 大塚蒸留水（注射用水） 20 mL :3A Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500 mL :1袋 Day1 Day15 ドキソルビン塩酸塩注射用（オーダ用）:25mg g/㎡ Day1 Day15 エクザール（VBL） 10mg:6mg g/㎡ Day1 Day15	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫

ABVd	15	13	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day15 ソル・コーテフ注射用 1 0 0 m g (溶解液付) :3瓶 Day1 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 フレオ (B l e o) 注 1 5 m g *:9m g /m l Day1 Day15 ダカルバジン注 1 0 0 m g :250m g /m l Day1 Day15 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day15 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :25m g /m l Day1 Day15 エクザール (V B L) 1 0 m g :6m g /m l Day1 Day15	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
A+CHP (HDC→DEX)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 水溶性ブレドニン 2 0 m g :100m g Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50m g /m l Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :750m g /m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 デキサート注射液 1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 アドセトリス点滴静注用 5 0 m g *:1.8m g /kg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
A+CHP (HDC→DEX)	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50m g /m l Day1 エンドキサン注 (オーダ用) :750m g /m l Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 デキサート注射液 1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 アドセトリス点滴静注用 5 0 m g *:1.8m g /kg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
プラトレキサート療法	36	13	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ジフォクタ注射液20mg/1mL *:30m g /m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
アドセトリス単剤療法	1	20	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ソル・コーテフ注射用 1 0 0 m g (溶解液付) :1瓶 Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アドセトリス点滴静注用 5 0 m g *:1.8m g /kg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
Bu+TT療法	6	22	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ブスルフェクス点滴静注用 6 0 m g 1 0 m l *:3.2m g /kg Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :5.3m l /kg Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 リサイオ点滴静注液 1 0 0 m g / 2 . 5 m L *:5m g /kg Day5 Day6 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day5 Day6	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
MEAM	6	22	生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day3 Day4 Day5 Day2 エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サド」 5 m l :200m g /m l Day3 Day4 Day5 Day2 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 注射用サイメリン 5 0 m g (M C N U) *:300m g /m l Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day6 Day3 Day4 Day5 キロサイド注 (オーダ用) :200m g /m l Day2 Day3 Day4 Day5 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day6 アルケラン (M e l) 静注用 5 0 m g *:140m g /m l Day6	C 血液内科/3. 悪性リンパ腫
DKd療法 s.c. (1サイクル)	22	6	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:20m g /m l Day2 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :90m l Day2 Day9 Day16 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:56m g /m l Day9 Day16 Day8 Day15 ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1 Day22 Day8 Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DKd療法 s.c. (2サイクル)	22	6	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:56m g /m l Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :90m l Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1 Day22 Day8 Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DKd療法 s.c. (3-6サイクル)	16	12	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:56m g /m l Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :90m l Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1 Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DKd療法 s.c. (7サイクル以降)	16	12	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:56m g /m l Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :90m l Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DRd療法 s.c. (1、2サイクル)	22	6	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day8 Day15 Day22	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DRd療法 s.c. (3-6サイクル)	15	13	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DRd療法 s.c. (7サイクル以降)	1	27	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DRd療法 (1サイクル)	22	6	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注 (オーダ用) *:16m g /kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液バッグ「フソー」 1 L :1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day8 Day15 Day22	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DRd療法 (2サイクル)	22	6	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注 (オーダ用) *:16m g /kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DRd療法 (3-6サイクル)	15	13	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 ダラザレックス点滴静注 (オーダ用) *:16m g /kg Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DRd療法 (7サイクル以降)	1	27	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (オーダ用) *:16m g /kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DVd療法 s.c.【GE】 (1-3サイクル)	15	6	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1 Day8 Day15 ボルテゾミブ注射用 3 m g 「サワイ」 *:1.3m g /m l Day1 Day8 Day4 Day11 生食注 2 0 m l :1.2m l Day1 Day8 Day4 Day11	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DVd療法 s.c.【GE】 (4-8サイクル)	11	10	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1 ボルテゾミブ注射用 3 m g 「サワイ」 *:1.3m g /m l Day1 Day8 Day11 Day4 生食注 2 0 m l :1.2m l Day1 Day8 Day11 Day4	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DVd療法 s.c. (9サイクル以降)	1	27	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DVd療法 (点滴)【GE】 (1-3サイクル)	15	6	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 ダラザレックス点滴静注 (オーダ用) *:16m g /kg Day1 Day8 Day15 生理食塩液バッグ「フソー」 1 L :1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day8 Day15 ボルテゾミブ注射用 3 m g 「サワイ」 *:1.3m g /m l Day1 Day8 Day4 Day11 生食注 2 0 m l :1.2m l Day1 Day8 Day4 Day11	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫

DVd療法(点滴)【GE】(4-8サイクル)	11	10	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注(オーダ用) *:16mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 ボルテゾミブ注射用 3 m g 「サワイ」 *:1.3m g /m l Day1 Day8 Day11 Day4 生食注 2 0 m l :1.2m l Day1 Day8 Day11 Day4	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DVd療法(点滴) (9サイクル以降)	1	27	大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注(オーダ用) *:16mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
EPd(導入) (1、2サイクル)		22	6 エムプリシディ点滴静注用(オーダ用) *:10mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用):1瓶 Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day8 Day15 Day22 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):1V Day8 Day15 Day22 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20m g 「サワイ」 (20mL/A):1A Day8 Day15 Day22 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
EPd(維持) (3サイクル以降)		1	27 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 ファモチジン静注液20m g 「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 エムプリシディ点滴静注用(オーダ用) *:20mg/kg Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
ERd(導入) (1、2サイクル)		22	6 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):1V Day8 Day15 Day22 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20m g 「サワイ」 (20mL/A):1A Day8 Day15 Day22 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22 エムプリシディ点滴静注用(オーダ用) *:10mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用):1瓶 Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
ERd(維持) (3サイクル以降)		15	13 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):1V Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day15 ファモチジン静注液20m g 「サワイ」 (20mL/A):1A Day15 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day15 エムプリシディ点滴静注用(オーダ用) *:10mg/kg Day15 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用):1瓶 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
KRd療法(1コース目)		16	12 カイトロリス点滴静注用(オーダ用) *:20mg/m l Day2 Day1 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用):1瓶 Day2 Day9 Day15 Day16 Day8 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day2 Day9 Day15 Day16 Day8 カイトロリス点滴静注用(オーダ用) *:27mg/m l Day9 Day15 Day16 Day8 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
KRd療法(2-12コース目)		16	12 カイトロリス点滴静注用(オーダ用) *:27mg/m l Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用):1瓶 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
KRd療法(13-18コース目)		16	12 カイトロリス点滴静注用(オーダ用) *:27mg/m l Day2 Day15 Day16 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用):1瓶 Day2 Day15 Day16 ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day2 Day15 Day16 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day15 Day16	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
weekly Kd(1コース目)		15	13 カイトロリス点滴静注用(オーダ用) *:70mg/m l Day8 Day15 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用):1瓶 Day8 Day15 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :90m l Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 カイトロリス点滴静注用(オーダ用) *:20mg/m l Day1	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
weekly Kd(2コース以降)		15	13 カイトロリス点滴静注用(オーダ用) *:70mg/m l Day8 Day15 大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用):1瓶 Day8 Day15 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :90m l Day8 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
VRd【GE】療法	11	10	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「サワイ」 *:1.3m g /m l Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 0 m l :1.2m l Day1 Day4 Day8 Day11	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
Vd維持療法【GE】	22	13	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「サワイ」 *:1.3m g /m l Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 2 0 m l :1A Day1 Day8 Day15 Day22	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
【薬剤部修正】Vd導入療法【GE】	11	10	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「サワイ」 *:1.3m g /m l Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 0 m l :1.2m l Day1 Day4 Day8 Day11	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
【薬剤部修正】Vd維持療法【GE】	22	13	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「サワイ」 *:1.3m g /m l Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 2 0 m l :1.2m l Day1 Day8 Day15 Day22	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
ボルテゾミブ・デキサメタゾン (BD)	11	10	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「サワイ」 *:1.3m g /m l Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 0 m l :1A Day1 Day4 Day8 Day11	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DPd療法 s.c. (1、2サイクル)	22	6	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day8 Day15 Day22	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DPd療法 s.c. (3-6サイクル)	15	13	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DPd療法 s.c. (7サイクル以降)	1	27	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
Isa単剤(1サイクル)		22	6 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20m g 「サワイ」 (20mL/A):1A Day8 Day15 Day22 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22 サークリサ点滴静注(オーダ用) *:10m g /kg Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ソル・メドロール静注用 1 2 5 m g :100m g Day1 Day8 Day15 Day22	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
Isa単剤(2サイクル以降)		15	13 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day15 ファモチジン静注液20m g 「サワイ」 (20mL/A):1A Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day15 サークリサ点滴静注(オーダ用) *:10m g /kg Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day15 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 ソル・メドロール静注用 1 2 5 m g :100m g Day1 Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
IsaD(1サイクル)		22	6 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):6V Day8 Day15 Day22 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20m g 「サワイ」 (20mL/A):1A Day8 Day15 Day22 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22 サークリサ点滴静注(オーダ用) *:10m g /kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
IsaD(2サイクル以降)		15	13 サークリサ点滴静注(オーダ用) *:10m g /kg Day1 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day15 デキサト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):6V Day15 ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day15 ファモチジン静注液20m g 「サワイ」 (20mL/A):1A Day15 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day15 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫

IsaKD（1サイクル）	22	6	デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）：3V Day8 Day15 Day22 ボラミン注 5mg 1ml：1A Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）：1A Day8 Day15 Day22 大塚生食注 100ml：1瓶 Day8 Day15 Day22 Day16 Day9 大塚生食注 50ml：1瓶 Day8 Day15 Day22 Day16 Day9 サークリサ点滴静注（オーダ用）＊：10mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 250ml：1袋 Day8 Day15 Day22 カイトロリス点滴静注用（オーダ用）＊：56mg/ml Day16 Day15 Day9 Day8 大塚蒸留水 100mL（抗がん剤調製用）：1瓶 Day16 Day15 Day2 Day9 Day8 大塚糖液5％ 100mL：90ml Day16 Day15 Day2 Day9 Day8 カイトロリス点滴静注用（オーダ用）＊：20mg/ml Day1 Day2	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
IsaKD（2サイクル以降）	16	12	デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）：3V Day15 ボラミン注 5mg 1ml：1A Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）：1A Day15 大塚生食注 100ml：1瓶 Day15 Day16 Day8 Day2 Day9 大塚生食注 50ml：1瓶 Day15 Day16 Day8 Day2 Day9 サークリサ点滴静注（オーダ用）＊：10mg/kg Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml：1袋 Day15 カイトロリス点滴静注用（オーダ用）＊：56mg/ml Day16 Day15 Day8 Day2 Day9 大塚蒸留水 100mL（抗がん剤調製用）：1瓶 Day16 Day15 Day8 Day2 Day9 大塚糖液5％ 100mL：90ml Day16 Day15 Day2 Day9 大塚糖液5％ 100mL：1瓶 Day8	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
IsaPd（1サイクル）	22	6	デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）：6V Day8 Day15 Day22 ボラミン注 5mg 1ml：1A Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）：1A Day8 Day15 Day22 大塚生食注 100ml：1瓶 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 50ml：1瓶 Day8 Day15 Day22 サークリサ点滴静注（オーダ用）＊：10mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 250ml：1袋 Day8 Day15 Day22	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
IsaPd（2サイクル以降）	15	13	デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）：6V Day15 ボラミン注 5mg 1ml：1A Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）：1A Day15 大塚生食注 100ml：1瓶 Day15 大塚生食注 50ml：1瓶 Day15 サークリサ点滴静注（オーダ用）＊：10mg/kg Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml：1袋 Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DCyBorD療法（1-2サイクル）	22	6	ダラキューロ配合皮下注（15mL/瓶）＊：15ml Day1 Day8 Day15 Day22 ベルケイド注射用 3mg ＊：1.3mg/ml Day1 Day8 Day22 Day15 生食注 20ml：1.2ml Day1 Day8 Day22 Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DCyBorD療法（3-6サイクル）	22	6	ダラキューロ配合皮下注（15mL/瓶）＊：15ml Day1 Day15 ベルケイド注射用 3mg ＊：1.3mg/ml Day1 Day8 Day22 Day15 生食注 20ml：1.2ml Day1 Day8 Day22 Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
DCyBorD療法（7サイクル以降）	1	27	ダラキューロ配合皮下注（15mL/瓶）＊：15ml Day1	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
MEL大量	2	26	大塚生食注 100ml：1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」：1瓶 Day1 大塚生食注 50ml：1瓶 Day2 大塚生食注ソフトバッグ 250ml：1袋 Day1 Day2 アルケラン（Mei）静注用50mg ＊：100mg/ml Day1 Day2	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
VTD-PACE	11	10	ボルテゾミブ注射用 3mg「サワイ」＊：1mg/ml Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20ml：1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液「ヒカリ」500mL：1袋 Day4 Day5 Day6 Day7 シスプラチン点滴静注「マルコ」（オーダ用）：10mg/ml Day4 Day5 Day6 Day7 ドキソビルシン塩酸塩注射用 10mg「NK」：10mg/ml Day4 Day5 Day6 Day7 エンドキサン注（オーダ用）：400mg/ml Day4 Day5 Day6 Day7	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
エルラナタマブ療法 s.c.（1週目）	4	3	エルレフィオ皮下注 44mg：12mg Day1 エルレフィオ皮下注 44mg：32mg Day4	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
エルラナタマブ療法 s.c.（2週から24週目）	1	6	エルレフィオ皮下注 76mg：76mg Day1	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
エルラナタマブ療法 s.c.（25週目以降）	1	13	エルレフィオ皮下注 76mg：76mg Day1	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
IsaVRd（1サイクル）	32	10	デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）：3V Day8 Day15 Day22 Day29 ボラミン注 5mg 1ml：1A Day8 Day15 Day22 Day29 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）：1A Day8 Day15 Day22 Day29 大塚生食注 100ml：1瓶 Day8 Day15 Day22 Day29 大塚生食注 50ml：1瓶 Day8 Day15 Day22 Day29 サークリサ点滴静注（オーダ用）＊：10mg/kg Day8 Day15 Day22 Day29 大塚生食注ソフトバッグ 250ml：1袋 Day8 Day15 Day22 Day29 ボルテゾミブ注射用 3mg「サワイ」＊：1.3mg/ml Day8 Day11 Day4 Day22 Day25 Day32 Day29 生食注 20ml：1.2ml Day8 Day11 Day4 Day22 Day25 Day32 Day29	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
IsaVRd（2-4サイクル）	32	10	デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）：3V Day15 Day29 ボラミン注 5mg 1ml：1A Day15 Day29 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）：1A Day15 Day29 大塚生食注 100ml：1瓶 Day15 Day29 大塚生食注 50ml：1瓶 Day15 Day29 サークリサ点滴静注（オーダ用）＊：10mg/kg Day15 Day29 大塚生食注ソフトバッグ 250ml：1袋 Day15 Day29 ボルテゾミブ注射用 3mg「サワイ」＊：1.3mg/ml Day8 Day11 Day4 Day22 Day25 Day32 Day29 生食注 20ml：1.2ml Day8 Day11 Day4 Day22 Day25 Day32 Day29	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
Isa(V)Rd（5-17サイクル）	15	13	デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）：3V Day15 ボラミン注 5mg 1ml：1A Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）：1A Day15 大塚生食注 100ml：1瓶 Day15 大塚生食注 50ml：1瓶 Day15 サークリサ点滴静注（オーダ用）＊：10mg/kg Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml：1袋 Day15	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
Isa(V)Rd（18サイクル以降）	1	27	大塚生食注 100ml：1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）：3V Day1 ボラミン注 5mg 1ml：1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mL/A）：1A Day1 大塚生食注 50ml：1瓶 Day1 サークリサ点滴静注（オーダ用）＊：10mg/kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml：1袋 Day1	C 血液内科/4. 多発性骨髄腫
MTX15+DEX	1	1	注射用メトトレキセート 50mg：15mg Day1 大塚蒸留水（注射用水）20ml：2ml Day1 デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）：0.5V Day1 生食注 20ml：0.4ml Day1	C 血液内科/5. 髄注
MTX15+CA40+DEX	1	1	注射用メトトレキセート 50mg：15mg Day1 大塚蒸留水（注射用水）20ml：2ml Day1 キロサイド（Arac）注 20mg/mL ＊：40mg Day1 デキサト注射液6.6mg（リン酸塩8mg相当）：0.5V Day1 生食注 20ml：1.4ml Day1	C 血液内科/5. 髄注