

| レジメン名                            | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種            |
|----------------------------------|----------|----------|---|--------------------|
| ドキシル                             | 1        | 12       | ブドウ糖注射液 5% 250ml :1瓶 Day1<br>ドキシル注 20mg/100mL * :20mg/mi Day1   | 感染症内科/1. カボジ肉腫     |
| パクリタキセル                          | 1        | 12       | 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day1<br>パクリタキセル注 100mg/16.7ml [FNK]:100mg/mi Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>アサート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>アサート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>フアモチン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1  | 感染症内科/1. カボジ肉腫     |
| ヘムブロリスマブ q3w                     | 1        | 20       | 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL * :200mg Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1  | 共通                 |
| MSI-H ニボルマブ q2w                  | 1        | 13       | 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>オプジーボ点滴静注用 240mg/24mL * :240mg Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1   | 共通                 |
| IDR+AraC(induction)              | 8        | 20       | 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8<br>イダマイン静注用 5mg * :12mg/mi Day1 Day2 Day3<br>キロサイド注 (オーダ用) * :100mg/mi Day1 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3<br>生食食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3   | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| DNR+AraC(induction)              | 8        | 20       | 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8<br>ダノマイシン (DNR) 静注用 20mg * :50mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>キロサイド注 (オーダ用) * :100mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7<br>生食食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7  | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| HD-AraC(consoli-1,2,3) (HDC→DEX) | 6        | 22       | 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day3 Day4 Day5 Day6 Day1 Day2<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg/100mL [HK]:1袋 Day3 Day4 Day5 Day1 Day2<br>アサート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day3 Day4 Day5 Day1 Day2<br>生食食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day3 Day4 Day5 Day1 Day2<br>キロサイドN注 1000mg/50mL * :2000mg/mi Day3 Day4 Day5 Day1 Day2   | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| MIT+AraC(consoli-1)              | 6        | 22       | 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>リントロン (MIT) 注 10mg (10mg/5mL) * :7mg/mi Day2 Day3 Day1<br>キロサイド注 (オーダ用) * :200mg/mi Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>生食食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg/100mL [HK]:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day2 Day3 Day1 Day6   | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| DNR+AraC(consoli-2)              | 6        | 22       | 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day6<br>ダノマイシン (DNR) 静注用 20mg * :50mg/mi Day1 Day2 Day3<br>キロサイド注 (オーダ用) * :200mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生食食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| ACR+AraC (consoli-3)             | 6        | 3        | 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>アクリン (ACR) 注射用 20mg * :20mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>キロサイド注 (オーダ用) * :200mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生食食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| A-triple V (consoli-4)           | 10       | 18       | 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day10<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg/100mL [HK]:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day10<br>エトボシド点滴静注液 100mg/5ml :100mg/mi Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>生食食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>キロサイド注 (オーダ用) * :200mg/mi Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day8 Day10<br>オンコピン (VCR) 注 1mg :0.8mg/mi Day8<br>注射用フルデシリン (オーダ用) * :2mg/mi Day10 | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| 髄注(MTX+AraC+PSL)(consoli-2)      | 1        | 1        | 注射用メトトレキサート 50mg:15mg Day1<br>大塚蒸留水 (注射用水) 20ml :2ml Day1<br>キロサイド注 (オーダ用) * :40mg Day1<br>水溶性フルドニン 20mg :10mg Day1<br>生食注 20ml :1.4ml Day1   | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| B群 (induction)                   | 8        | 20       | グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg/100mL [HK]:1袋 Day6 Day7 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3<br>キロサイド注 (オーダ用) * :100mg/mi Day6 Day7 Day3 Day1 Day4 Day5 Day2<br>生食食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day6 Day7 Day3 Day1 Day4 Day5 Day2<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day2<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 Day2<br>イダマイン静注用 5mg * :12mg/mi Day1 Day2   | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| C群 (induction)                   | 8        | 20       | 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>キロサイド注 (オーダ用) * :100mg/mi Day4 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2<br>生食食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day4 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day8 Day3 Day1 Day2<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg/100mL [HK]:1袋 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 Day4<br>イダマイン静注用 5mg * :12mg/mi Day3 Day1 Day2   | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| D群 (A群→D群) (induction)           | 8        | 20       | 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>キロサイド注 (オーダ用) * :100mg/mi Day4 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2<br>生食食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day4 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day8 Day3 Day1 Day2<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg/100mL [HK]:1袋 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 Day4<br>イダマイン静注用 5mg * :12mg/mi Day3 Day1 Day2   | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| D群 (B群→D群) (induction)           | 3        | 25       | 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day3 Day1<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg/100mL [HK]:1袋 Day2 Day1<br>キロサイド注 (オーダ用) * :100mg/mi Day2 Day1<br>生食食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day2 Day1<br>イダマイン静注用 5mg * :12mg/mi Day1  | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| D群 (C群→D群) (induction)           | 1        | 27       | 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg/100mL [HK]:1袋 Day1<br>イダマイン静注用 5mg * :12mg/mi Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1   | 血液内科/1. 白血病/1. AML |

| レジメン名                                 | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種            |
|---------------------------------------|----------|----------|---|--------------------|
| MIT+AraC(consoli-1)                   | 6        | 22       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>パントロン (MIT) 注 1 0 m g (10mg/5mL) *:7m g/m Day2 Day3 Day1<br>キロサイド注 (オーダ用) *:200m g/m Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>グラニセトロン点滴静注「ツグ」 3 m g / 1 0 0 m L [HKJ]:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1 Day6  | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| DNR+AraC(consoli-2)                   | 6        | 22       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1<br>グラニセトロン点滴静注「ツグ」 3 m g / 1 0 0 m L [HKJ]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day6<br>タロマイシン (D N R) 静注用 2 0 m g *:50m g/m Day1 Day2 Day3<br>キロサイド注 (オーダ用) *:200m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5   | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| IDR+AraC(consoli-3)                   | 6        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day6 Day3 Day1 Day2<br>グラニセトロン点滴静注「ツグ」 3 m g / 1 0 0 m L [HKJ]:1袋 Day3 Day5 Day1 Day4 Day2<br>イブマイシン静注用 5 m g *:12m g/m Day3 Day1 Day2<br>キロサイド注 (オーダ用) *:140m g/m Day3 Day5 Day1 Day4 Day2<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day3 Day5 Day1 Day4 Day2  | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| MEC (AraC中等量1g/m)                     | 6        | 22       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>パントロン (MIT) 注 1 0 m g (10mg/5mL) *:6m g/m Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6<br>イントロ点滴静注液「0 0 m g [カド]」 5 m l :80m g/m Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6<br>グラニセトロン点滴静注「ツグ」 3 m g / 1 0 0 m L [HKJ]:1袋 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day1<br>キロサイドN注 1000mg/50mL *:1000m g/m Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day1  | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| ゲムツマゾプロギマシ (740P-カ) (HDC→DEX)         | 1        | 13       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>キロサイド注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アトラチン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>マイロターグ点滴静注用 5 m g *:9m g/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m L (抗がん剤調整用) :1瓶 Day1  | 血液内科/1. 白血病/1. AML |
| Ph(-) ALL202-O 地固め療法 (C2, C5)         | 16       | 12       | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day15<br>注射用メトトレキサート (オーダ用) :3000m g/m Day1 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15<br>グラニセトロン点滴静注「ツグ」 3 m g / 1 0 0 m L [HKJ]:1袋 Day1 Day15<br>オコピン (V C R) 注 1 m g :1.3m g/m Day1 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day15 Day16<br>注射用メトトレキサート 5 0 m g :15m g Day1 Day15<br>大塚生食注 (注射用水) 2 0 m l :2m l Day1 Day15<br>アトラチン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :0.5V Day1 Day15<br>生食注 2 0 m l :0.4m l Day1 Day15   | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| Ph(-) ALL202-O 再寛解導入療法 (C3)           | 40       | 2        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39<br>Day40 Day8 Day15<br>グラニセトロン点滴静注「ツグ」 3 m g / 1 0 0 m L [HKJ]:1袋 Day1 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37<br>Day38 Day39 Day40 Day8 Day15 Day29<br>オコピン (V C R) 注 1 m g :1.3m g/m Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40 Day8<br>Day15 Day29<br>エンドキサン注 (オーダ用) :1000m g/m Day29<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day29<br>キロサイド注 (オーダ用) *:75m g/m Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39<br>Day40<br>注射用メトトレキサート 5 0 m g :15m g Day29 Day1<br>大塚生食注 (注射用水) 2 0 m l :2m l Day29 Day1<br>キロサイド(A r a C)注 2 0 m g / m L *:40m g Day29 Day1<br>アトラチン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :0.5V Day29 Day1<br>生食注 2 0 m l :1.4m l Day29 Day1<br>トキソリン酸塩注射液 (オーダ用) :30m g/m Day1 Day8 Day15 | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| Ph(-) ALL202-O 維持療法                   | 1        | 23       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>オコピン (V C R) 注 1 m g :1.3m g/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| Ph(-) ALL202-O 寛解導入療法 (VCR→VDS)       | 22       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22 Day3 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20<br>注射用フルデシン (オーダ用) *:3m g/m Day8 Day15 Day22<br>グラニセトロン点滴静注「ツグ」 3 m g / 1 0 0 m L [HKJ]:1袋 Day1 Day2 Day3<br>タロマイシン (D N R) 静注用 2 0 m g *:60m g/m Day1 Day2 Day3<br>エンドキサン注 (オーダ用) :1200m g/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20<br>ロイネー注用 5 0 0 0 *:3000KU/m Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20  | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| Ph+ ALL213 (地固め療法C2)                  | 1        | 28       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>グラニセトロン点滴静注「ツグ」 3 m g / 1 0 0 m L [HKJ]:1袋 Day1<br>タロマイシン (D N R) 静注用 2 0 m g *:45m g/m Day1<br>オコピン (V C R) 注 1 m g :1.3m g/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) :1200m g/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>注射用メトトレキサート 5 0 m g :15m g Day1<br>大塚生食注 (注射用水) 2 0 m l :2m l Day1<br>アトラチン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :0.5V Day1<br>生食注 2 0 m l :0.4m l Day1   | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| Ph+ ALL213 (非移植群・維持療法)                | 1        | 34       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>オコピン (V C R) 注 1 m g :1.3m g/m Day1   | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| Ph(-) ALL202-O 再寛解導入療法 (C3) (VCR→VDS) | 40       | 2        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39<br>Day40 Day8 Day15<br>グラニセトロン点滴静注「ツグ」 3 m g / 1 0 0 m L [HKJ]:1袋 Day1 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37<br>Day38 Day39 Day40 Day8 Day15 Day29<br>注射用フルデシン (オーダ用) *:3m g/m Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40 Day8<br>Day15 Day29<br>エンドキサン注 (オーダ用) :1000m g/m Day29<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day29<br>キロサイド注 (オーダ用) *:75m g/m Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39<br>Day40<br>注射用メトトレキサート 5 0 m g :15m g Day29 Day1<br>大塚生食注 (注射用水) 2 0 m l :2m l Day29 Day1<br>キロサイド(A r a C)注 2 0 m g / m L *:40m g Day29 Day1<br>アトラチン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :0.5V Day29 Day1<br>生食注 2 0 m l :1.4m l Day29 Day1<br>トキソリン酸塩注射液 (オーダ用) :30m g/m Day1 Day8 Day15       | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |

| レジメン名                                    | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種            |
|--|----------|----------|--|--------------------|
| アリカテマ <sup>®</sup> 寛解導入療法（1コース）（45kg以上）  | 29       | 13       | 大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day3 Day8 Day7 Day5 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>生食注 2.0mL:6mL Day3 Day8 Day7 Day5 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>ピ-リンサイト点滴静注用3.5μg * :18μg Day3 Day7 Day5 Day1<br>大塚蒸留水 2.0mL (抗がん剤調製用) :1A Day3 Day8 Day7 Day5 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>ピ-リンサイト点滴静注用3.5μg * :28μg Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>フ-チ-ト注射液6.6mg (リ-酸塩8mg相当) :2V Day8 Day1<br>フ-チ-ト注射液1.65mg(リ-酸塩2mg相当):2A Day8 Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day8 Day29 Day1            | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| アリカテマ <sup>®</sup> 寛解導入療法（2コース）（45kg以上）  | 29       | 13       | 大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day29 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>生食注 2.0mL:6mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>ピ-リンサイト点滴静注用3.5μg * :28μg Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>大塚蒸留水（注射用水） 2.0mL:3mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>フ-チ-ト注射液6.6mg (リ-酸塩8mg相当) :2V Day1<br>フ-チ-ト注射液1.65mg(リ-酸塩2mg相当):2A Day1     | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| アリカテマ <sup>®</sup> 地固め療法（3-5コース）（45kg以上） | 29       | 13       | 大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day29 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>生食注 2.0mL:6mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>ピ-リンサイト点滴静注用3.5μg * :28μg Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>大塚蒸留水 2.0mL (抗がん剤調製用) :1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>フ-チ-ト注射液6.6mg (リ-酸塩8mg相当) :2V Day1<br>フ-チ-ト注射液1.65mg(リ-酸塩2mg相当):2A Day1 | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| アリカテマ <sup>®</sup> 維持療法（6-9コース）（45kg以上）  | 29       | 55       | 大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day29 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>生食注 2.0mL:6mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>ピ-リンサイト点滴静注用3.5μg * :28μg Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>大塚蒸留水 2.0mL (抗がん剤調製用) :1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28<br>フ-チ-ト注射液6.6mg (リ-酸塩8mg相当) :2V Day1<br>フ-チ-ト注射液1.65mg(リ-酸塩2mg相当):2A Day1 | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| バスボンサ療法1コース目（HDC→DEX）                    | 15       | 6        | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>フ-チ-ト注射液1.65mg(リ-酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>バスボンサ点滴静注用1mg * :0.8mg/m Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>バスボンサ点滴静注用1mg * :0.5mg/m Day8 Day15  | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| バスボンサ療法2, 3コース目（非寛解症例）（HDC→DEX）          | 15       | 13       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>フ-チ-ト注射液1.65mg(リ-酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>バスボンサ点滴静注用1mg * :0.8mg/m Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day8<br>バスボンサ点滴静注用1mg * :0.5mg/m Day8 Day15<br>大塚蒸留水（注射用水） 2.0mL:1A Day15  | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| バスボンサ療法2-6コース目（寛解症例）（HDC→DEX）            | 15       | 13       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>フ-チ-ト注射液1.65mg(リ-酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>バスボンサ点滴静注用1mg * :0.5mg/m Day1 Day8 Day15<br>大塚蒸留水 1.00mL (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day8 Day15  | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| Ph+ ALL213（強化地固め療法）                      | 22       | 16       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>クラニトロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.00mL [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3<br>タウマイシン（DNR）静注用 2.0mg * :45mg/m Day1 Day2 Day3<br>オコピン（VCR）注 1mg :1.3mg/m Day1 Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day3<br>エンドキサン注（オ-ダ用） :1200mg/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.00mL:1袋 Day1<br>注射用ミノレキセ-ト 5.0mg:15mg Day1<br>大塚蒸留水（注射用水） 2.0mL:2mL Day1<br>フ-チ-ト注射液6.6mg (リ-酸塩8mg相当) :0.5V Day1<br>生食注 2.0mL:0.4mL Day1   | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |
| Ph+ ALL213（地固め療法C1）                      | 4        | 27       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>ソル-メド-ル静注用 4.0mg:50mg Day1 Day2 Day3<br>クラニトロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.00mL [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3<br>注射用ミノレキセ-ト（オ-ダ用） :100mg/m Day1<br>注射用ミノレキセ-ト（オ-ダ用） :900mg/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.00mL:1袋 Day1 Day2 Day3<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day2 Day3 Day4<br>キロサイド注（オ-ダ用） * :2000mg/m Day2 Day3<br>キロサイドN注 1000mg/50mL * :2000mg/m Day2 Day3<br>注射用ミノレキセ-ト 5.0mg:15mg Day1<br>大塚蒸留水（注射用水） 2.0mL:2mL Day1<br>フ-チ-ト注射液6.6mg (リ-酸塩8mg相当) :0.5V Day1<br>生食注 2.0mL:0.4mL Day1  | 血液内科/1. 白血病/2. ALL |

| レジメン名                               | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種               |
|-------------------------------------|----------|----------|--|-----------------------|
| Hyper-CVAD                          | 14       | 7        | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day4 Day2 Day3 Day11 Day12 Day13 Day14<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」:1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :6V Day1 Day4 Day3 Day11 Day12 Day13 Day14 Day2<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3<br>エンドキサン注 (ﾌﾞｰｸﾞ用) :300mg/m Day1 Day2 Day3<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day11<br>ｸﾞﾗﾆセﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾌﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m l「HJK」:1袋 Day1 Day2 Day3<br>オンコピン (VCR) 注 1 m g :1.4m g/m Day4 Day11<br>ﾄﾞｷﾞﾙﾋﾞﾝｼﾞﾝ塩酸塩注射用 (ﾌﾞｰｸﾞ用) :50m g/m Day4   | 血液内科/1. 白血病/2. ALL    |
| MA療法                                | 4        | 27       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day3<br>ｼﾞﾙ・ﾏﾄﾞﾛｰﾙ静注用 4 0 m g :50m g Day1 Day2 Day3<br>ｸﾞﾗﾆセﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾌﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m l「HJK」:1袋 Day1 Day2 Day3<br>注射用ﾓﾝﾄﾞﾚｷｾｰﾄﾞ (ﾌﾞｰｸﾞ用) :200mg/m Day1<br>大塚生食注ソフトﾌﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>注射用ﾓﾝﾄﾞﾚｷｾｰﾄﾞ (ﾌﾞｰｸﾞ用) :800mg/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day4<br>ｷﾛｻｲﾄﾞN注 1000mg/50mL *:3000mg/m Day2 Day3  | 血液内科/1. 白血病/2. ALL    |
| Ph(-) ALL202-O[25以上60歳未満] induction | 22       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22 Day3 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20<br>オンコピン (VCR) 注 1 m g :1.3m g/m Day8 Day15 Day22<br>ｸﾞﾗﾆセﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾌﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m l「HJK」:1袋 Day1 Day2 Day3<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾓｲｼﾞﾝ (DNR) 静注用 2 0 m g *:60m g/m Day1 Day2 Day3<br>エンドキサン注 (ﾌﾞｰｸﾞ用) :1200m g/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>ﾌﾞﾄﾞの糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20<br>ロｲｹｰｾﾞ用 5 0 0 0 *:3000KU/m Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20                                  | 血液内科/1. 白血病/2. ALL    |
| Ph(-) ALL202-O 地固め (C1, C4)         | 4        | 24       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day3 Day4 Day1 Day2<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day3 Day1 Day2<br>ｷﾛｻｲﾄﾞN注 1000mg/50mL *:2000mg/m Day3 Day1 Day2<br>ｸﾞﾗﾆセﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾌﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m l「HJK」:1袋 Day3 Day2 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :6V Day2 Day3 Day1<br>ｲﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ点滴静注液 1 0 0 m g「ﾌﾟﾗﾄﾞ」 5 m l :100m g/m Day1 Day2 Day3<br>注射用ﾓﾝﾄﾞﾚｷｾｰﾄﾞ 5 0 m g :15m g Day1<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :2m l Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :0.5V Day1<br>生食注 2 0 m l :0.4m l Day1                                 | 血液内科/1. 白血病/2. ALL    |
| AG療法 (ガザイバ1コース目)                    | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2<br>ｼﾞﾙ・ﾏﾄﾞﾛｰﾙ静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 Day8 Day15 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2<br>ｱｾﾘｮ静注液 1 0 0 0 m g / ｻﾞｸﾞ :1袋 Day1 Day8 Day15 Day2<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 Day2<br>ｶﾞｻｲﾊﾞ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m l *:100m g Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :96m l Day1<br>ｶﾞｻｲﾊﾞ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m l *:1000m g Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトﾌﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :210m l Day8 Day15<br>ｶﾞｻｲﾊﾞ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m l (薬備なし) *:900m g Day2<br>大塚生食注ソフトﾌﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :214m l Day2 | 血液内科/1. 白血病/3. CLL    |
| AG療法 (ガザイバ2コース目以降)                  | 1        | 27       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ｼﾞﾙ・ﾏﾄﾞﾛｰﾙ静注用 4 0 m g :2瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｱｾﾘｮ静注液 1 0 0 0 m g / ｻﾞｸﾞ :1袋 Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ｶﾞｻｲﾊﾞ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m l *:1000m g Day1<br>大塚生食注ソフトﾌﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :210m l Day1   | 血液内科/1. 白血病/3. CLL    |
| [GE]JAZA療法 (皮下注)                    | 7        | 21       | 大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7<br>ｱﾌﾞｼﾞﾝｼﾞﾝ注射用 1 0 0 0 m g「ﾌﾞｯｸﾞ」 *:75m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7  | 血液内科/2. 骨髄異形成症候群      |
| [GE]JAZA療法 (点滴)                     | 7        | 21       | ｸﾞﾗﾆセﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾌﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m l「HJK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調整用) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7<br>ｱﾌﾞｼﾞﾝｼﾞﾝ注射用 1 0 0 m g「ﾌﾞｯｸﾞ」 *:75m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7  | 血液内科/2. 骨髄異形成症候群      |
| CA療法 (MDS200) : cytarabine点滴        | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4<br>ｸﾞﾗﾆセﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾌﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m l「HJK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day15 Day4<br>ｱｸﾗﾝｼﾞﾝ (ACR) 注射用 2 0 m g *:14m g/m Day1 Day2 Day3 Day4<br>ｷﾛｻｲﾄﾞ注 (ﾌﾞｰｸﾞ用) *:20m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11<br>Day12 Day13 Day14<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day5 Day3 Day4 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11<br>Day12 Day13 Day14  | 血液内科/2. 骨髄異形成症候群      |
| CA療法 (MDS200) : cytarabine皮下注射      | 14       | 14       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4<br>ｸﾞﾗﾆセﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾌﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m l「HJK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4<br>ｱｸﾗﾝｼﾞﾝ (ACR) 注射用 2 0 m g *:14m g/m Day1 Day2 Day3 Day4<br>ｷﾛｻｲﾄﾞ注 (ﾌﾞｰｸﾞ用) *:10m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11<br>Day12 Day13 Day14<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4  | 血液内科/2. 骨髄異形成症候群      |
| ガザイバ単剤 (他レジメン追加用)                   | 1        | 1        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ｼﾞﾙ・ﾏﾄﾞﾛｰﾙ静注用 4 0 m g :2瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｱｾﾘｮ静注液 1 0 0 0 m g / ｻﾞｸﾞ :1袋 Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ｶﾞｻｲﾊﾞ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m l *:1000m g Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :460m l Day1  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| ガザイバ導入                              | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ｼﾞﾙ・ﾏﾄﾞﾛｰﾙ静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ｱｾﾘｮ静注液 1 0 0 0 m g / ｻﾞｸﾞ :1袋 Day1 Day8 Day15<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>ｶﾞｻｲﾊﾞ点滴静注 1 0 0 0 m g / 4 0 m l *:1000m g Day1 Day8 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :460m l Day1 Day8 Day15   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| CHASE                               | 3        | 18       | ｸﾞﾗﾆセﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾌﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m l「HJK」:1袋 Day1 Day2 Day3<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :5V Day1 Day2 Day3<br>ﾌﾞﾄﾞの糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>ｲﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ点滴静注液 1 0 0 m g「ﾌﾟﾗﾄﾞ」 5 m l :100m g/m Day1 Day2 Day3<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>エンドキサン注 (ﾌﾞｰｸﾞ用) :1200m g/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>(GE-ｸﾞﾗﾌ)ｼﾞﾙﾃﾞﾑ3 A輸液 5 0 0 m l :1袋 Day2 Day3<br>ｷﾛｻｲﾄﾞN注 1000mg/50mL *:2000m g/m Day2 Day3<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |

| レジメン名                                  | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種               |
|--|----------|----------|---|-----------------------|
| mini-MEAM                              | 6        | 22       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 Day6<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day3 Day4 Day5 Day1 Day2 Day6<br>キゾリド注 (オード用) *:100mg/m Day3 Day4 Day5 Day2<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day3 Day4 Day5 Day2<br>エトホシド点滴静注液 1 0 0 m g [キゾ] 5 m l :75mg/m Day3 Day4 Day5 Day2<br>生理食塩液[ヒカリ] 5 0 0 m l :1袋 Day3 Day4 Day5 Day2<br>注射用サイメリン 5 0 m g (M C N U) *:60mg/m Day1<br>アルケラン (M e l) 静注用 5 0 m g *:30mg/m Day6        | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| ICE療法                                  | 3        | 18       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3<br>生理食塩液[ヒカリ] 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3<br>エトホシド点滴静注液 1 0 0 m g [キゾ] 5 m l :100mg/m Day1 Day2 Day3<br>イホマイド (I F X) 注射用 1 g :5000mg/m Day2<br>ウロミキサン注 4 0 0 m g 4 m l :5000mg/m Day2<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day2<br>カルボプラチン点滴静注液 (オード用) :0m g /A Day2   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| modified ICE療法                         | 5        | 16       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液[ヒカリ] 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>エトホシド点滴静注液 1 0 0 m g [キゾ] 5 m l :100mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>イホマイド (I F X) 注射用 1 g :1200mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オード用) :400mg/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ウロミキサン注 4 0 0 m g 4 m l :4000mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| ESHAP                                  | 5        | 16       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>生理食塩液[ヒカリ] 5 0 0 m l :1袋 Day5 Day2 Day3 Day4 Day1<br>シタラビン点滴静注液 1 g [デバ] (1g/5 0 m l) *:2000mg/m Day5<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>ソル・メドロール静注用 5 0 0 m g :500mg Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>エトホシド点滴静注液 1 0 0 m g [キゾ] 5 m l :40mg/m Day2 Day3 Day4 Day1<br>シスプラチン点滴静注液 [マルコ] (オード用) :25mg/m Day2 Day3 Day4 Day1  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| DA-EPOCH                               | 5        | 16       | グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 Day5<br>水溶性ブレドニン 2 0 m g :60mg/m Day2 Day3 Day4 Day1 Day5<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ドキシソリン塩酸塩注射液 (オード用) :10mg/m Day1 Day2 Day3 Day4<br>オンコピン (V C R) 注 1 m g :0.4mg/m Day1 Day2 Day3 Day4<br>エトホシド点滴静注液 1 0 0 m g [キゾ] 5 m l :50mg/m Day1 Day2 Day3 Day4<br>生理食塩液[ヒカリ] 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day5<br>インドキサン注 (オード用) :750mg/m Day5  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| G-B (G別日投与) 1サイクル目                     | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15<br>ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 Day3<br>アゼリオ静注液 1 0 0 0 m g /バッグ:1袋 Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g /4 0 m l *:1000mg Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 Day8 Day15<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day2<br>ベンダムスチン点滴静注液[トロー] (オード用) *:90mg/m Day2 Day3<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day3                             | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| G-B (G別日投与) 1サイクル目 Benda10分投与          | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15<br>ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 Day3<br>アゼリオ静注液 1 0 0 0 m g /バッグ:1袋 Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g /4 0 m l *:1000mg Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1 Day8 Day15<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day2<br>ベンダムスチン点滴静注液[トロー] (オード用) *:90mg/m Day2 Day3  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| G-B (G別日投与) 2サイクル以降                    | 3        | 25       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>アゼリオ静注液 1 0 0 0 m g /バッグ:1袋 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g /4 0 m l *:1000mg Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day2<br>ベンダムスチン点滴静注液[トロー] (オード用) *:90mg/m Day2 Day3<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day3  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| G-B (G別日投与) 2サイクル以降 Benda10分投与         | 3        | 25       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>アゼリオ静注液 1 0 0 0 m g /バッグ:1袋 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g /4 0 m l *:1000mg Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day2<br>ベンダムスチン点滴静注液[トロー] (オード用) *:90mg/m Day2 Day3   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| G維持療法                                  | 1        | 54       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>アゼリオ静注液 1 0 0 0 m g /バッグ:1袋 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g /4 0 m l *:1000mg Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :210m l Day1   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| PCNSL inuduction (MPV)                 | 1        | 13       | 生理食塩液[ヒカリ] 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>注射用メソレキセート (オード用) :3500mg/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>オンコピン (V C R) 注 1 m g :1.4mg/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| PCNSL consolidation(HD-AraC) (HDC→DEX) | 2        | 26       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1 Day2<br>アキチ注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1 Day2<br>キゾリドN注 1000mg/50mL *:3000mg/m Day1 Day2<br>生理食塩液[ヒカリ] 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |

| レジメン名                                | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種               |
|--------------------------------------|----------|----------|--|-----------------------|
| Pola-R-CHP【2日レジメン】【初回】(HDC→DEX)      | 2        | 19       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day2<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ2mg相当):2A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>ﾘｯｷｼﾏﾌﾞB5Fﾌｧｲｻﾞｰ(ﾈｰﾀﾞ) :375m g/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2<br>水溶性プレドニン 2 0 m g :100m g Day2<br>ボライビー点滴静注用 (ﾎｰﾀﾞ) * :1.8mg/kg Day2<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day2<br>ドキソルビシン塩酸塩注射用 (ﾎｰﾀﾞ) :50m g/m Day2<br>エンドキサン (C P A) 注 5 0 0 m g :750m g/m Day2<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day2   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| Pola-R-CHP【2日レジメン】【2-6ｸﾞｲﾌ】(HDC→DEX) | 2        | 19       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day2<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ2mg相当):2A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>ﾘｯｷｼﾏﾌﾞB5Fﾌｧｲｻﾞｰ(ﾈｰﾀﾞ) :375m g/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2<br>水溶性プレドニン 2 0 m g :100m g Day2<br>ボライビー点滴静注用 (ﾎｰﾀﾞ) * :1.8mg/kg Day2<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day2<br>ドキソルビシン塩酸塩注射用 (ﾎｰﾀﾞ) :50m g/m Day2<br>エンドキサン (C P A) 注 5 0 0 m g :750m g/m Day2<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day2   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| Pola-R-CHP【1日】ｼﾞﾂﾂ(初回)               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>水溶性プレドニン 2 0 m g :100m g Day1<br>ﾘｯｷｼﾏﾌﾞB5Fﾌｧｲｻﾞｰ(ﾈｰﾀﾞ) :375m g/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>ボライビー点滴静注用 (ﾎｰﾀﾞ) * :1.8mg/kg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>ドキソルビシン塩酸塩注射用 (ﾎｰﾀﾞ) :50m g/m Day1<br>エンドキサン (C P A) 注 5 0 0 m g :750m g/m Day1  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| Pola-R-CHP【1日】ｼﾞﾂﾂ(2-6ｸﾞｲﾌ)          | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>水溶性プレドニン 2 0 m g :100m g Day1<br>ﾘｯｷｼﾏﾌﾞB5Fﾌｧｲｻﾞｰ(ﾈｰﾀﾞ) :375m g/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>ボライビー点滴静注用 (ﾎｰﾀﾞ) * :1.8mg/kg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>ドキソルビシン塩酸塩注射用 (ﾎｰﾀﾞ) :50m g/m Day1<br>エンドキサン (C P A) 注 5 0 0 m g :750m g/m Day1  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| CHOP                                 | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>水溶性プレドニン 2 0 m g :100m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｵﾝｺﾞﾋﾞﾝ (V C R) 注 1 m g :1.4m g/m Day1<br>ドキソルビシン塩酸塩注射用 (ﾎｰﾀﾞ) :50m g/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>エンドキサン注 (ﾎｰﾀﾞ) :750m g/m Day1   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| R-CHASE                              | 4        | 17       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>ﾘｯｷｼﾏﾌﾞB5Fﾌｧｲｻﾞｰ(ﾈｰﾀﾞ) :375m g/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day2 Day3 Day4<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ8mg相当) :5V Day2 Day3 Day4<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day4<br>ｲﾄﾞﾎﾝﾄﾞ点滴静注液 1 0 0 m g [ｸﾞ] 5 m l :100m g/m Day2 Day3 Day4<br>(GE-ｸﾞ)ソルヂム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day3 Day4<br>エンドキサン注 (ﾎｰﾀﾞ) :1200m g/m Day2<br>ｷｯｸﾞｲﾄﾞN注 1000mg/50mL * :2000m g/m Day3 Day4  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| R-THP-COP                            | 2        | 18       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2<br>ﾘｯｷｼﾏﾌﾞB5Fﾌｧｲｻﾞｰ(ﾈｰﾀﾞ) :375m g/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day2<br>ｵﾝｺﾞﾋﾞﾝ (V C R) 注 1 m g :1.4m g/m Day2<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day2<br>ﾋﾞﾙﾌﾞｲﾝ注射用 (ﾎｰﾀﾞ) :30m g/m Day2<br>エンドキサン注 (ﾎｰﾀﾞ) :750m g/m Day2   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| THP-COP                              | 1        | 19       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｵﾝｺﾞﾋﾞﾝ (V C R) 注 1 m g :1.4m g/m Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾋﾞﾙﾌﾞｲﾝ注射用 (ﾎｰﾀﾞ) :30m g/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>エンドキサン注 (ﾎｰﾀﾞ) :750m g/m Day1   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| THP-COP (70-79歳)                     | 1        | 19       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>水溶性プレドニン 2 0 m g :40m g/m Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1<br>ﾋﾞﾙﾌﾞｲﾝ注射用 (ﾎｰﾀﾞ) :40m g/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｵﾝｺﾞﾋﾞﾝ (V C R) 注 1 m g :1.4m g/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>エンドキサン注 (ﾎｰﾀﾞ) :650m g/m Day1  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| SMILE療法 (ロイナーゼ点滴)                    | 20       | 8        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 Day3 Day4<br>注射用ｷﾞﾗﾝｼﾞﾝ (ﾎｰﾀﾞ) :2000m g/m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ8mg相当) :5V Day2 Day3 Day4<br>ｲﾄﾞﾎﾝﾄﾞ点滴静注液 1 0 0 m g [ｸﾞ] 5 m l :100m g/m Day2 Day3 Day4<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注液 4 0 0 m g 4 m l :300m g/m Day2 Day3 Day4<br>ロイナーゼ点滴 5 0 0 0 * :6000KU/m Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20<br>大塚蒸留水 2 0 m L (抗がん剤調製用) :1A Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |

| レジメン名                                 | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種               |
|---------------------------------------|----------|----------|--|-----------------------|
| SMILE療法（ロイナーゼ療法）                      | 20       | 8        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4<br>注射用メトトレキサート（オード用）:2000mg/m <sup>2</sup> Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4<br>グラニセトロン点滴静注「フグ」 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4<br>テート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):5V Day2 Day3 Day4<br>イホマイド（I F X）注射用 1 g :1500mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4<br>エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g 「リナド」 5 m l :100mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4<br>ウロミキサン注 4 0 0 m g 4 m l :300mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4<br>ロイナーゼ注用 5 0 0 0 * :6000KU/m <sup>2</sup> Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20<br>大塚蒸留水 2 0 m L (抗がん剤調製用) :1A Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20<br>キノロイシン注ポリリブ 2 % 5 m L :0.5m l Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| ベンダムスチン(トリアキシンGE)                     | 2        | 19       | グラニセトロン点滴静注「フグ」 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1 Day2<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day2<br>ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オード用) *:120mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| ベンダムスチン(トリアキシンGE)Benda10分投与           | 2        | 19       | グラニセトロン点滴静注「フグ」 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オード用) *:120mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| リツキシマブ+ベンダムスチン                        | 3        | 25       | グラニセトロン点滴静注「フグ」 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day2 Day3<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day3<br>ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オード用) *:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>リツキシマブBSIファイザー(オード用) :375m g / m <sup>2</sup> Day1   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| リツキシマブ+ベンダムスチン B10分                   | 3        | 25       | グラニセトロン点滴静注「フグ」 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day2 Day3<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1<br>ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オード用) *:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>リツキシマブBSIファイザー(オード用) :375m g / m <sup>2</sup> Day1  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| リツキシマブ単独                              | 1        | 6        | リツキシマブBSIファイザー(オード用) :375m g / m <sup>2</sup> Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :500m l Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| リツキシマブ単独 (4mg/m <sup>2</sup> )        | 1        | 6        | リツキシマブBSIファイザー(オード用) :375m g / m <sup>2</sup> Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :56.25m l / m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| DeVIC                                 | 3        | 18       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>グラニセトロン点滴静注「フグ」 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3<br>テート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):6V Day1 Day2 Day3<br>イホマイド（I F X）注射用 1 g :1500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3<br>ウロミキサン注 4 0 0 m g 4 m l :300mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g 「リナド」 5 m l :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>カルボプラチン点滴静注液(オード用) :300m g / m <sup>2</sup> Day1  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| GCD                                   | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):5V Day1 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オード用) :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>カルボプラチン点滴静注液(オード用) :0m g / A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>テート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day8   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| GDP                                   | 8        | 13       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1 Day4 Day8<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8<br>シスプラチン点滴静注液「マルコ」(オード用) :25m g / m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day2 Day3 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):5V Day1 Day2 Day3 Day4<br>ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オード用) :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| Pola-BR (1サイクル目) (HDC→DEX)            | 3        | 18       | 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day3<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>テート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>リツキシマブBSIファイザー(オード用) :375m g / m <sup>2</sup> Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>ボライビ点滴静注用(オード用) *:1.8mg/kg Day2<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day2<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2<br>ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オード用) *:90m g / m <sup>2</sup> Day2 Day3   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |
| Pola-BR (1サイクル目) Benda10分投与 (HDC→DEX) | 3        | 18       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>テート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>リツキシマブBSIファイザー(オード用) :375m g / m <sup>2</sup> Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>ボライビ点滴静注用(オード用) *:1.8mg/kg Day2<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day2<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2<br>ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オード用) *:90m g / m <sup>2</sup> Day2 Day3  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL |

| レジメン名                                   | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種                |
|---|----------|----------|--|------------------------|
| Pola-BR (2~6サイクル目) (HDC→DEX)            | 2        | 19       | 大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1 Day2<br>大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day2<br>テラト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day2<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day2<br>リツキシマブBSIファイザー(オゲ用):375mg/m <sup>2</sup> Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.00mL:1袋 Day1<br>ベンダムスチン点滴静注液「トロー」 (オゲ用) *:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1<br>ボライビー点滴静注用 (オゲ用) *:1.8mg/kg Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL  |
| Pola-BR (2~6サイクル目) Benda10分投与 (HDC→DEX) | 2        | 19       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day2<br>テラト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day2<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day2<br>リツキシマブBSIファイザー(オゲ用):375mg/m <sup>2</sup> Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.00mL:1袋 Day1<br>ベンダムスチン点滴静注液「トロー」 (オゲ用) *:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1<br>ボライビー点滴静注用 (オゲ用) *:1.8mg/kg Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL  |
| エポリタマブ 1サイクル目                           | 22       | 6        | エプキソ皮下注 4mg/0.8mL *:0.8mg Day8<br>生食注 2.0mL:4.2mL Day8<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.00mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22<br>テラト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):2V Day1 Day8 Day15 Day22<br>テラト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1 Day8 Day15 Day22<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22<br>エプキソ皮下注 4mg/0.8mL *:0.16mg Day1<br>生食注 2.0mL:1A Day1<br>エプキソ皮下注 4.8mg/0.8mL *:48mg Day15 Day22   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL  |
| エポリタマブ 2-3サイクル目                         | 22       | 6        | エプキソ皮下注 4.8mg/0.8mL *:48mg Day1 Day22 Day8 Day15   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL  |
| エポリタマブ 4-9サイクル目                         | 15       | 13       | エプキソ皮下注 4.8mg/0.8mL *:48mg Day1 Day15  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL  |
| エポリタマブ 10サイクル目以降                        | 1        | 27       | エプキソ皮下注 4.8mg/0.8mL *:48mg Day1  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL  |
| mLSG15療法                                | 17       | 11       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17<br>クラセトロン点滴静注「ツグ」3mg/1.00mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17<br>水溶性ブレドニン 2.0mg:40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day16 Day17<br>オンコピン (VCR)注 1mg:1mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17<br>ドキソリピン塩酸塩注射用 (オゲ用):40mg/m <sup>2</sup> Day1<br>エンドキサン注 (オゲ用):350mg/m <sup>2</sup> Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.00mL:1袋 Day1 Day15 Day16 Day17<br>ドキソリピン塩酸塩注射用 (オゲ用):30mg/m <sup>2</sup> Day8<br>注射用サイクリン 5.0mg(MCNU) *:60mg/m <sup>2</sup> Day8<br>注射用フィルデシン (オゲ用) *:2.4mg/m <sup>2</sup> Day15<br>イトボンド点滴静注液 1.00mg「サド」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day15 Day16 Day17<br>カルボプラチン点滴静注液 (オゲ用):250mg/m <sup>2</sup> Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day15 | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/3. ATLL |
| mLSG15用輔注(MTX+AraC+PSL)                 | 1        | 1        | 注射用メトトレキサート 5.0mg:15mg Day1<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2.0mL:2mL Day1<br>キロサイド注 (オゲ用) *:40mg Day1<br>水溶性ブレドニン 2.0mg:10mg Day1<br>生食注 2.0mL:1.4mL Day1   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/3. ATLL |
| モガムリズマブ (ボネリジオ)                         | 50       | 1        | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43<br>ソル・コーテフ注射用 1.00mg (溶解液付):1瓶 Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43<br>ボネリジオ点滴静注 2.0mg/5mL *:1mg/kg Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/3. ATLL |
| モガムリズマブ (ボネリジオ) (HDC→DEX)               | 50       | 1        | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43<br>テラト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43<br>ボネリジオ点滴静注 2.0mg/5mL *:1mg/kg Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/3. ATLL |
| ABVD                                    | 15       | 13       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day15<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day15<br>ソル・コーテフ注射用 1.00mg (溶解液付):3瓶 Day1 Day15<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day15<br>ブレオ (BLEO)注 1.5mg *:10mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>ダカルバジン注 1.00mg:375mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2.0mL:3A Day1 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.00mL:1袋 Day1 Day15<br>ドキソリピン塩酸塩注射用 (オゲ用):25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>エプガール (VBL) 1.0mg:6mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/4. HL   |
| ABVd                                    | 15       | 13       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day15<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day15<br>ソル・コーテフ注射用 1.00mg (溶解液付):3瓶 Day1 Day15<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day15<br>ブレオ (BLEO)注 1.5mg *:9mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>ダカルバジン注 1.00mg:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>大塚蒸留水 1.00mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.00mL:1袋 Day1 Day15<br>ドキソリピン塩酸塩注射用 (オゲ用):25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>エプガール (VBL) 1.0mg:6mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/4. HL   |
| A+AVD (HDC→DEX)                         | 15       | 13       | パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day15<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day15<br>ダカルバジン注 1.00mg:375mg/m <sup>2</sup> Day15<br>大塚蒸留水 1.00mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day15<br>(GE-リカ)ソルチム3A輸液 5.00mL:1袋 Day15<br>ドキソリピン塩酸塩注射用 (オゲ用):25mg/m <sup>2</sup> Day15<br>エプガール (VBL) 1.0mg:6mg/m <sup>2</sup> Day15<br>テラト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day15<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day15<br>アドセトリス点滴静注用 5.0mg *:1.2mg/kg Day15<br>大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day15   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/4. HL   |
| アドセトリス単剤 救療療法 (HDC→DEX)                 | 1        | 20       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>テラト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1<br>アドセトリス点滴静注用 5.0mg *:1.8mg/kg Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/4. HL   |



| レジメン名                     | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種                |
|---------------------------|----------|----------|--|------------------------|
| アドセトリス単剤療法                | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ソルコチン注 1 0 0 m g (溶解液付) : 1 瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アドセトリス点滴静注用 5 0 m g * : 1.8 m g / k g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) : 1 瓶 Day1   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/5. PTCL |
| A+CHP (HDC→DEX)           | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>グラニセロン点滴静注/ツグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK] : 1 袋 Day1<br>水溶性ブレドニン 2 0 m g : 100 m g Day1<br>ドキシタキソン点滴静注用 (オーダ用) : 50 m g / m l Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) : 750 m g / m l Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ﾍﾞｰｼﾞｰ注 1.65 m g (ｼﾞﾝｸﾞﾙ 2 m g 相当) : 2 A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>アドセトリス点滴静注用 5 0 m g * : 1.8 m g / k g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) : 1 瓶 Day1   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/5. PTCL |
| プラトレキサト療法                 | 36       | 13       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>ｼﾞﾌﾞﾙﾀﾞ注 20 m g / 1 m l * : 30 m g / m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36  | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/5. PTCL |
| MEAM                      | 6        | 22       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>グラニセロン点滴静注/ツグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK] : 1 袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>注射用サイミン 5 0 m g (M C N U) * : 300 m g / m l Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>キロサイド注 (オーダ用) * : 200 m g / m l Day2 Day3 Day4 Day5<br>エトボシ点滴静注用 1 0 0 m g 「サウ」 5 m l : 200 m g / m l Day2 Day3 Day4 Day5<br>生食注 2 0 m l : 1 A Day2 Day3 Day4 Day5<br>ｱﾙｸﾞﾗﾝ (M e l) 静注用 5 0 m g * : 140 m g / m l Day6 | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/6. 自家移植 |
| Bu+TT療法                   | 6        | 22       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>グラニセロン点滴静注/ツグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK] : 1 袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>ﾌﾙｽﾞﾌﾞﾙｽﾞ点滴静注用 6 0 m g 1 0 m l * : 3.2 m g / k g Day1 Day2 Day3 Day4<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 5.3 m l / k g Day1 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>ﾘﾝｸﾞ点滴静注用 1 0 0 m g / 2 . 5 m l * : 5 m g / k g Day5 Day6<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day5 Day6   | 血液内科/3. 悪性リンパ腫/6. 自家移植 |
| DKd療法 s.c. (1サイクル)        | 22       | 6        | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15<br>ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (オーダ用) * : 20 m g / m l Day2 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) : 1 瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 90 m l Day2 Day9 Day16 Day8 Day15<br>ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (オーダ用) * : 56 m g / m l Day9 Day16 Day8 Day15<br>ﾀﾞｷﾞｰ-ｵ配合皮下注 (15mL/瓶) * : 15 m l Day1 Day22 Day8 Day15   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DKd療法 s.c. (2サイクル)        | 22       | 6        | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15<br>ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (オーダ用) * : 56 m g / m l Day9 Day16 Day2 Day8 Day15<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) : 1 瓶 Day9 Day16 Day2 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 90 m l Day9 Day16 Day2 Day8 Day15<br>ﾀﾞｷﾞｰ-ｵ配合皮下注 (15mL/瓶) * : 15 m l Day1 Day22 Day8 Day15   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DKd療法 s.c. (3-6サイクル)      | 16       | 12       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15<br>ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (オーダ用) * : 56 m g / m l Day9 Day16 Day2 Day8 Day15<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) : 1 瓶 Day9 Day16 Day2 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 90 m l Day9 Day16 Day2 Day8 Day15<br>ﾀﾞｷﾞｰ-ｵ配合皮下注 (15mL/瓶) * : 15 m l Day1 Day15  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DKd療法 s.c. (7サイクル以降)      | 16       | 12       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15<br>ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (オーダ用) * : 56 m g / m l Day9 Day16 Day2 Day8 Day15<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) : 1 瓶 Day9 Day16 Day2 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 90 m l Day9 Day16 Day2 Day8 Day15<br>ﾀﾞｷﾞｰ-ｵ配合皮下注 (15mL/瓶) * : 15 m l Day1  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DRd療法 s.c. (1, 2サイクル)     | 22       | 6        | ﾀﾞｷﾞｰ-ｵ配合皮下注 (15mL/瓶) * : 15 m l Day8 Day15 Day22  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DRd療法 s.c. (3-6サイクル)      | 15       | 13       | ﾀﾞｷﾞｰ-ｵ配合皮下注 (15mL/瓶) * : 15 m l Day15   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DRd療法 s.c. (7サイクル以降)      | 1        | 27       | ﾀﾞｷﾞｰ-ｵ配合皮下注 (15mL/瓶) * : 15 m l Day1  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DRd療法 (1サイクル)             | 22       | 6        | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 Day22<br>ﾀﾞﾗｸﾞﾚｯｽ点滴静注 (オーダ用) * : 16 m g / k g Day1 Day8 Day15 Day22<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day8 Day15 Day22  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DRd療法 (2サイクル)             | 22       | 6        | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15 Day22<br>ﾀﾞﾗｸﾞﾚｯｽ点滴静注 (オーダ用) * : 16 m g / k g Day1 Day8 Day15 Day22<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1 Day8 Day15 Day22  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DRd療法 (3-6サイクル)           | 15       | 13       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day15<br>ﾀﾞﾗｸﾞﾚｯｽ点滴静注 (オーダ用) * : 16 m g / k g Day1 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1 Day15   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DRd療法 (7サイクル以降)           | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ﾀﾞﾗｸﾞﾚｯｽ点滴静注 (オーダ用) * : 16 m g / k g Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DVd療法 s.c. [GE] (1-3サイクル) | 15       | 6        | ﾀﾞｷﾞｰ-ｵ配合皮下注 (15mL/瓶) * : 15 m l Day1 Day8 Day15<br>ﾎﾙﾃﾞﾐﾝ注 3 m g 「サウ」 * : 1.3 m g / m l Day1 Day8 Day4 Day11<br>生食注 2 0 m l : 1.2 m l Day1 Day8 Day4 Day11  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DVd療法 s.c. [GE] (4-8サイクル) | 11       | 10       | ﾀﾞｷﾞｰ-ｵ配合皮下注 (15mL/瓶) * : 15 m l Day1<br>ﾎﾙﾃﾞﾐﾝ注 3 m g 「サウ」 * : 1.3 m g / m l Day1 Day8 Day11 Day4<br>生食注 2 0 m l : 1.2 m l Day1 Day8 Day11 Day4   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DVd療法 s.c. (9サイクル以降)      | 1        | 27       | ﾀﾞｷﾞｰ-ｵ配合皮下注 (15mL/瓶) * : 15 m l Day1  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DVd療法 (点滴) [GE] (1-3サイクル) | 15       | 6        | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾀﾞﾗｸﾞﾚｯｽ点滴静注 (オーダ用) * : 16 m g / k g Day1 Day8 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day8 Day15<br>ﾎﾙﾃﾞﾐﾝ注 3 m g 「サウ」 * : 1.3 m g / m l Day1 Day8 Day4 Day11<br>生食注 2 0 m l : 1.2 m l Day1 Day8 Day4 Day11   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DVd療法 (点滴) [GE] (4-8サイクル) | 11       | 10       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ﾀﾞﾗｸﾞﾚｯｽ点滴静注 (オーダ用) * : 16 m g / k g Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>ﾎﾙﾃﾞﾐﾝ注 3 m g 「サウ」 * : 1.3 m g / m l Day1 Day8 Day11 Day4<br>生食注 2 0 m l : 1.2 m l Day1 Day8 Day11 Day4  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DVd療法 (点滴) (9サイクル以降)      | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ﾀﾞﾗｸﾞﾚｯｽ点滴静注 (オーダ用) * : 16 m g / k g Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| EPd (導入) (1, 2サイクル)       | 22       | 6        | ｴﾑﾌﾙｼﾞﾝ点滴静注用 (オーダ用) * : 10 m g / k g Day8 Day15 Day22<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) : 1 瓶 Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day8 Day15 Day22<br>ﾍﾞｰｼﾞｰ注 6.6 m g (ｼﾞﾝｸﾞﾙ 8 m g 相当) : 1 V Day8 Day15 Day22<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day8 Day15 Day22<br>ﾌﾞﾗﾓﾝ点滴静注 20 m g 「サウ」 (20mL/A) : 1 A Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day8 Day15 Day22   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |

| レジメン名                | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種        |
|----------------------|----------|----------|---|----------------|
| EPd (維持) (3サイクル以降)   | 1        | 27       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ﾌﾞﾗﾓﾁﾝ静注液20mg「ｻｲｲ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ｴﾑﾌﾟﾘﾝﾃﾞｨ点滴静注用 (ｵｰｸﾞ用) *:20mg/kg Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| ERd (導入) (1,2サイクル)   | 22       | 6        | ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15 Day22<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day15 Day22<br>ﾌﾞﾗﾓﾁﾝ静注液20mg「ｻｲｲ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22<br>ｴﾑﾌﾟﾘﾝﾃﾞｨ点滴静注用 (ｵｰｸﾞ用) *:10mg/kg Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| ERd (維持) (3サイクル以降)   | 15       | 13       | ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :1V Day15<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day15<br>ﾌﾞﾗﾓﾁﾝ静注液20mg「ｻｲｲ」 (20mL/A) :1A Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day15<br>ｴﾑﾌﾟﾘﾝﾃﾞｨ点滴静注用 (ｵｰｸﾞ用) *:10mg/kg Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day15<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day15   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| KRd療法 (1コース目)        | 16       | 12       | ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (ｵｰｸﾞ用) *:20mg/m Day2 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day2 Day9 Day15 Day16 Day8<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day2 Day9 Day15 Day16 Day8<br>ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (ｵｰｸﾞ用) *:27mg/m Day9 Day15 Day16 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| KRd療法 (2-12コース目)     | 16       | 12       | ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (ｵｰｸﾞ用) *:27mg/m Day2 Day8 Day9 Day15 Day16<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| KRd療法 (13-18コース目)    | 16       | 12       | ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (ｵｰｸﾞ用) *:27mg/m Day2 Day15 Day16<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day2 Day15 Day16<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day2 Day15 Day16<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day15 Day16  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| weekly Kd (1コース目)    | 15       | 13       | ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (ｵｰｸﾞ用) *:70mg/m Day8 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :90m l Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (ｵｰｸﾞ用) *:20mg/m Day1   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| weekly Kd (2コース以降)   | 15       | 13       | ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (ｵｰｸﾞ用) *:70mg/m Day8 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :90m l Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| VRd[GE]療法            | 11       | 10       | ﾎﾙﾃﾞﾝｼﾞﾝ注射用 3 m g 「ｻｲｲ」 *:1.3m g /m Day1 Day4 Day8 Day11<br>生食注 2 0 m l :1.2m l Day1 Day4 Day8 Day11  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| DPd療法 s.c. (1,2サイクル) | 22       | 6        | ｸﾞﾗｷﾞｬｰ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day8 Day15 Day22  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| DPd療法 s.c. (3-6サイクル) | 15       | 13       | ｸﾞﾗｷﾞﾞｰ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day15   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| DPd療法 s.c. (7サイクル以降) | 1        | 27       | ｸﾞﾗｷﾞﾞｰ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| Isa単剤 (1サイクル)        | 22       | 6        | ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day15 Day22<br>ﾌﾞﾗﾓﾁﾝ静注液20mg「ｻｲｲ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22<br>ｻｰｸﾘｻ点滴静注 (ｵｰｸﾞ用) *:20m g /kg Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22<br>ｼﾞﾙ-ﾓﾄﾞﾛｰﾙ静注用 1 2 5 m g :100m g Day1 Day8 Day15 Day22  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| Isa単剤 (2サイクル以降)      | 15       | 13       | ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day15<br>ﾌﾞﾗﾓﾁﾝ静注液20mg「ｻｲｲ」 (20mL/A) :1A Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day15<br>ｻｰｸﾘｻ点滴静注 (ｵｰｸﾞ用) *:20m g /kg Day15<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15<br>ｼﾞﾙ-ﾓﾄﾞﾛｰﾙ静注用 1 2 5 m g :100m g Day1 Day15   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| IsaD (1サイクル)         | 22       | 6        | ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :6V Day8 Day15 Day22<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day15 Day22<br>ﾌﾞﾗﾓﾁﾝ静注液20mg「ｻｲｲ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22<br>ｻｰｸﾘｻ点滴静注 (ｵｰｸﾞ用) *:20m g /kg Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day8 Day15 Day22  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| IsaD (2サイクル以降)       | 15       | 13       | ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :6V Day15<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day15<br>ﾌﾞﾗﾓﾁﾝ静注液20mg「ｻｲｲ」 (20mL/A) :1A Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day15<br>ｻｰｸﾘｻ点滴静注 (ｵｰｸﾞ用) *:20m g /kg Day15<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day15   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| IsaKD (1サイクル)        | 22       | 6        | ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :3V Day8 Day15 Day22<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day15 Day22<br>ﾌﾞﾗﾓﾁﾝ静注液20mg「ｻｲｲ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22 Day16 Day9<br>ｻｰｸﾘｻ点滴静注 (ｵｰｸﾞ用) *:10m g /kg Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day8 Day15 Day22<br>ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (ｵｰｸﾞ用) *:56mg/m Day16 Day15 Day9 Day8<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day16 Day15 Day2 Day9 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :90m l Day16 Day15 Day2 Day9 Day8<br>ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (ｵｰｸﾞ用) *:20mg/m Day1 Day2 | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |
| IsaKD (2サイクル以降)      | 16       | 12       | ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当) :3V Day15<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day15<br>ﾌﾞﾗﾓﾁﾝ静注液20mg「ｻｲｲ」 (20mL/A) :1A Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day15 Day16 Day8 Day2 Day9<br>ｻｰｸﾘｻ点滴静注 (ｵｰｸﾞ用) *:10m g /kg Day15<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day15<br>ｶｲﾌﾟﾘｽ点滴静注用 (ｵｰｸﾞ用) *:56mg/m Day16 Day15 Day8 Day2 Day9<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day16 Day15 Day8 Day2 Day9<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :90m l Day16 Day15 Day2 Day9<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day8   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫 |

| レジメン名                         | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種                |
|-------------------------------|----------|----------|---|------------------------|
| IsaPd (1サイクル)                 | 22       | 6        | 7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :6V Day8 Day15 Day22<br>ボラミン注 5mg 1m l :1A Day8 Day15 Day22<br>アモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22<br>サーグサ点滴静注 (オーダ用) *:10mg/kg Day8 Day15 Day22<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.5 0 m l :1袋 Day8 Day15 Day22   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| IsaPd (2サイクル以降)               | 15       | 13       | 7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :6V Day15<br>ボラミン注 5mg 1m l :1A Day15<br>アモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day15<br>大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day15<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day15<br>サーグサ点滴静注 (オーダ用) *:10mg/kg Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.5 0 m l :1袋 Day15  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DCyBorD療法 (1-2サイクル)           | 22       | 6        | ダキニューロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1 Day8 Day15 Day22<br>ベルケイド注射用 3mg *:1.3mg/g/ml Day1 Day8 Day22 Day15<br>生食注 2.0 m l :1.2m l Day1 Day8 Day22 Day15  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DCyBorD療法 (3-6サイクル)           | 22       | 6        | ダキニューロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1 Day15<br>ベルケイド注射用 3mg *:1.3mg/g/ml Day1 Day8 Day22 Day15<br>生食注 2.0 m l :1.2m l Day1 Day8 Day22 Day15   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| DCyBorD療法 (7サイクル以降)           | 1        | 27       | ダキニューロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| MEL大量                         | 2        | 26       | 大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.5 0 m l :1袋 Day1 Day2<br>アルケラン (Me l) 静注用 5.0 mg *:100mg/ml Day1 Day2  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| エルラナタマブ療法 s.c. (1週目)          | 4        | 3        | エルルフィオ皮下注 4.4 mg :12mg Day1<br>エルルフィオ皮下注 4.4 mg :32mg Day4  | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| エルラナタマブ療法 s.c. (2週から24週目)     | 1        | 6        | エルルフィオ皮下注 7.6 mg :76mg Day1   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| エルラナタマブ療法 s.c. (25週目以降)       | 1        | 13       | エルルフィオ皮下注 7.6 mg :76mg Day1   | 血液内科/4. 多発性骨髄腫         |
| MTX15+DEX                     | 1        | 1        | 注射用メトトレキサート 5.0 mg :15mg Day1<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2.0 m l :2m l Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :0.5V Day1<br>生食注 2.0 m l :0.4m l Day1   | 血液内科/5. 髄注             |
| MTX15+CA40+DEX                | 1        | 1        | 注射用メトトレキサート 5.0 mg :15mg Day1<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2.0 m l :2m l Day1<br>キロサイド(A r a C)注 2.0 mg/m L *:40mg Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :0.5V Day1<br>生食注 2.0 m l :1.4m l Day1   | 血液内科/5. 髄注             |
| CBDCA+ベムトレキセド併用療法             | 1        | 20       | グラネセトロン点滴静注バッグ 3mg / 1.0 0 m L「HK」:1袋 Day1<br>7-チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day1<br>アロカリス点滴静注 2.3 5 mg :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day1<br>ベムトレキセド点滴静注液「NK」(オーダ用) :500mg/g/ml Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/g/A Day1<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫 |
| シスプラチン+ベムトレキセド併用療法            | 1        | 20       | 大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2.3 5 mg :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>7-チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ベムトレキセド点滴静注液「NK」(オーダ用) :500mg/g/ml Day1<br>(GE-カ)ソルデム3 A 輸液 5.0 0 m L :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1mEq/m l (2.0 mL/A) :0.4A Day1<br>マンニトールS注射液 3.0 0 m l :300mL Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.0 0 m L :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :75mg/g/ml Day1<br>ソルデム3 A 輸液 2.0 0 m l :1袋 Day1<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day1 | 呼吸器内科/呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫 |
| ベムトレキセド単剤療法                   | 1        | 20       | 大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day1<br>グラネセトロン点滴静注バッグ 3mg / 1.0 0 m L「HK」:1袋 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ベムトレキセド点滴静注液「NK」(オーダ用) :500mg/g/ml Day1<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫 |
| ニボルマブ療法 (悪性胸膜中皮腫)             | 1        | 13       | 大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day1<br>オプジーボ点滴静注用 2.4 0 mg / 2.4 m L *:240mg Day1<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫 |
| ニボルマブ+イビリムマブ療法 (ニボ2週毎)        | 29       | 20       | 大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day1 Day29 Day15<br>オプジーボ点滴静注用 2.4 0 mg / 2.4 m L *:240mg Day1 Day29 Day15<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29<br>ボラミン注 5mg 1m l :1A Day15 Day29<br>ヤーボイ点滴静注液 (オーダ用) *:1mg/kg Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫 |
| ニボルマブ+イビリムマブ療法 (ニボ3週毎)        | 22       | 20       | 大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day1 Day22<br>オプジーボ点滴静注 (オーダ用) :360mg Day1 Day22<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day1 Day22<br>ボラミン注 5mg 1m l :1A Day22 Day1<br>ヤーボイ点滴静注液 (オーダ用) *:1mg/kg Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫 |
| CBDCA+nabPTX(75mg/m)+Pemb 導入  | 15       | 6        | 大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>キイトルーダ点滴静注 1.0 0 mg / 4 m L *:200mg Day1<br>アロカリス点滴静注 2.3 5 mg :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>7-チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day1<br>アプライン点滴静注用 1.0 0 mg :75mg/ml Day1 Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/g/A Day1<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15<br>ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌      |
| CBDCA+nabPTX(100mg/m)+Pemb 導入 | 15       | 6        | 大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>キイトルーダ点滴静注 1.0 0 mg / 4 m L *:200mg Day1<br>アロカリス点滴静注 2.3 5 mg :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>7-チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day1<br>アプライン点滴静注用 1.0 0 mg :100mg/ml Day1 Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/g/A Day1<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15<br>ボラミン注 5mg 1m l :1A Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌      |

| レジメン名                            | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種           |
|----------------------------------|----------|----------|--|-------------------|
| CBDCA+nabPTX+Atezo               | 15       | 6        | 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1<br>テセントリク点滴静注 1200mg/20mL *:1200mg Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>テラト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):3A Day1<br>アラキサン点滴静注用 100mg:100mg/ml Day1 Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>テラト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day8 Day15<br>ボラミン注 5mg1ml:1A Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| CBDCA/PEM/Pemb 導入                | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1<br>テラト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):3A Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ベムトレキセド点滴静注液「NK」(オーダ用):500mg/ml Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1<br>ボラミン注 5mg1ml:1A Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| CBDCA/PEM/Pemb 維持療法              | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>テラト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ベムトレキセド点滴静注液「NK」(オーダ用):500mg/ml Day1<br>ボラミン注 5mg1ml:1A Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| シスプラチン・ベムトレキセド・Pemb 導入           | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>テラト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>テラト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>ベムトレキセド点滴静注液「NK」(オーダ用):500mg/ml Day1<br>(GE-リカ)ソルデム3A輸液 500ml:1袋 Day1<br>硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1<br>マンニトールS注射液 300ml:1瓶 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 500ml:1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):75mg/ml Day1<br>ソルデム3A輸液 200ml:1袋 Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg1ml:1A Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| シスプラチン・ベムトレキセド・Pemb 維持           | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>テラト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ベムトレキセド点滴静注液「NK」(オーダ用):500mg/ml Day1<br>ボラミン注 5mg1ml:1A Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| デュルバルマブ (イフィング) 療法[体重≦30kg, Q4W] | 1        | 27       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1<br>イフィング点滴静注 (オーダ用) *:20mg/kg Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg1ml:1A Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| デュルバルマブ (イフィング) 療法[用量固定, Q4W]    | 1        | 27       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1<br>イフィング点滴静注 (オーダ用) *:1500mg Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg1ml:1A Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ニボルマブ (オブジーボ) 療法[q2W]            | 1        | 13       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>オブジーボ点滴静注用 240mg/24mL *:240mg Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg1ml:1A Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ベムプロリスマブ療法 q[3]w                 | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg1ml:1A Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ベムプロリスマブ療法 q[6]w                 | 1        | 41       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:400mg Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg1ml:1A Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| アテゾリズマブ(テセントリク) 療法               | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1<br>テセントリク点滴静注 1200mg/20mL *:1200mg Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg1ml:1A Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| 小細胞肺癌 CBDCA+VP-16+デュルバルマブ療法      | 3        | 18       | 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>ボラミン注 5mg1ml:1A Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>生理食塩液「ヒカリ」 500ml:1袋 Day2 Day3 Day1<br>イトボシド点滴静注液 100mg「リカ」5ml:80mg/ml Day2 Day3 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1<br>テラト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):3A Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1<br>イフィング点滴静注 (オーダ用) *:1500mg Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| 小細胞肺癌 CDDP+VP-16+デュルバルマブ療法       | 3        | 18       | 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>ボラミン注 5mg1ml:1A Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1<br>テラト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>テラト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1<br>イフィング点滴静注 (オーダ用) *:1500mg Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 500ml:1袋 Day1 Day2 Day3<br>イトボシド点滴静注液 100mg「リカ」5ml:100mg/ml Day1 Day2 Day3<br>(GE-リカ)ソルデム3A輸液 500ml:1袋 Day1<br>硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1<br>マンニトールS注射液 300ml:1瓶 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/ml Day1<br>ソルデム3A輸液 200ml:1袋 Day1 | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |

| レジメン名                                   | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種               |
|---|----------|----------|---|-----------------------|
| 小細胞肺癌 チェルバルマブ維持療法                       | 1        | 27       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>イマチニブ点滴静注 ( オード用 ) * : 1500mg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1  | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| CBDCA/Etop/Atezo 導入療法                   | 3        | 18       | 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m l * : 1200m g Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロセトロン静注 0.75mg/5mL [ タイホウ ] : 1 瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液 1.65mg ( 酢酸塩 2mg 相当 ) : 3 A Day1<br>生理食塩液 [ ヒカリ ] 5 0 0 m l : 1 袋 Day1 Day2 Day3<br>エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g / 5 m l : 100m g / m l Day1 Day2 Day3<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 ( オード用 ) : 0m g / A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1  | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| CBDCA/Etop/Atezo 維持療法                   | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m l * : 1200m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1   | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| CBDCA/PAC/Bev/Atezo 導入 [ Bev BS ]       | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m l * : 1200m g Day1<br>ベシズマブBS点滴静注 ( オード用 ) : 15m g / kg Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロセトロン静注 0.75mg/5mL [ タイホウ ] : 1 瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液 1.65mg ( 酢酸塩 2mg 相当 ) : 2 A Day1<br>デキサメタゾン注射液 6.6mg ( 酢酸塩 8mg 相当 ) : 2 V Day1<br>フアモジソン静注液 20m g [ サワイ ] ( 20m l / A ) : 1 A Day1<br>生理食塩液 [ ヒカリ ] 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>パカリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [ NK ] : 175m g / m l Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 ( オード用 ) : 0m g / A Day1 | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| CBDCA/PAC/Bev/Atezo 維持療法 [ Bev BS ]     | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m l * : 1200m g Day1<br>ベシズマブBS点滴静注 ( オード用 ) : 15m g / kg Day1   | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| A* M* D + カルボ + A* M* D + B* T* H* 併用療法 | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液 1.65mg ( 酢酸塩 2mg 相当 ) : 3 A Day1<br>パロセトロン静注 0.75mg/5mL [ タイホウ ] : 1 瓶 Day1<br>キイトルガ点点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * : 200m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ベトキシセド点点滴静注液 [ NK ] ( オード用 ) : 500m g / m l Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 ( オード用 ) : 0m g / A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1   | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| CPT単剤                                   | 15       | 13       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [ HK ] : 1 袋 Day1 Day8 Day15<br>デキサメタゾン注射液 6.6mg ( 酢酸塩 8mg 相当 ) : 1 V Day1 Day8 Day15<br>生理食塩液 [ ヒカリ ] 5 0 0 m l : 1 袋 Day1 Day8 Day15<br>リノリカン塩酸塩点滴静注液 ( オード用 ) : 60m g / m l Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15   | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| DOC単剤                                   | 1        | 20       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [ HK ] : 1 袋 Day1<br>デキサメタゾン注射液 6.6mg ( 酢酸塩 8mg 相当 ) : 1 V Day1<br>生理食塩液 [ ヒカリ ] 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注 [ ニプロ ] ( オード用 ) : 60m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1  | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| DTX + Bev併用療法 [ Bev BS ]                | 1        | 20       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [ HK ] : 1 袋 Day1<br>デキサメタゾン注射液 6.6mg ( 酢酸塩 8mg 相当 ) : 1 V Day1<br>生理食塩液 [ ヒカリ ] 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注 [ ニプロ ] ( オード用 ) : 75m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ベシズマブBS点滴静注 ( オード用 ) : 15m g / kg Day1  | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| ドセタキセル + ラムシルマブ                         | 1        | 20       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [ HK ] : 1 袋 Day1<br>デキサメタゾン注射液 6.6mg ( 酢酸塩 8mg 相当 ) : 1 V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注 [ ニプロ ] ( オード用 ) : 60m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>サイラムザ点点滴静注液 ( オード用 ) : 10m g / kg Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1  | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| GEM単剤 ( day 1, 8 )                      | 8        | 13       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [ HK ] : 1 袋 Day1 Day8<br>グムシタピン点滴静注液 [ NK ] ( オード用 ) : 1000m g / m l Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8  | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| GEM単剤 ( day 1, 8, 15 )                  | 15       | 13       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [ HK ] : 1 袋 Day1 Day8 Day15<br>グムシタピン点滴静注液 [ NK ] ( オード用 ) : 1000m g / m l Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15  | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| VNR単剤 ( day 1, 8 )                      | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>デキサメタゾン注射液 1.65mg ( 酢酸塩 2mg 相当 ) : 2 A Day1 Day8<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>ロゼクス静注液 1 0 m g / 1 m l : 25m g / m l Day1 Day8<br>ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l : 1 袋 Day1 Day8  | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| VNR単剤 ( day 1, 8, 15 )                  | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day15 Day8<br>デキサメタゾン注射液 1.65mg ( 酢酸塩 2mg 相当 ) : 2 A Day1 Day15 Day8<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day15 Day8<br>ロゼクス静注液 1 0 m g / 1 m l : 25m g / m l Day1 Day15 Day8<br>ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m l : 1 袋 Day1 Day15 Day8  | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |

| レジメン名  | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種           |
|--|----------|----------|---|-------------------|
| アムルピシ35mg/m2単剤療法                             | 3        | 18       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ静注0.75mg/5mLﾀｲﾎﾟﾙ:1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>ｶﾙセﾄﾞ注射用(ｵｰｸﾞ用) *:35mg/m Day1 Day2 Day3  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| アムルピシ45mg/m2単剤療法                             | 3        | 18       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ静注0.75mg/5mLﾀｲﾎﾟﾙ:1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>ｶﾙセﾄﾞ注射用(ｵｰｸﾞ用) *:45mg/m Day1 Day2 Day3  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ﾉﾞﾃｶﾝ標準(1mg/m2)                              | 5        | 16       | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞｰﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ注射用1. 1 m g *:1m g / m Day1 Day5 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ﾉﾞﾃｶﾝ半量(0.5mg/m2)                            | 5        | 16       | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞｰﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ注射用1. 1 m g *:0.5m g / m Day1 Day5 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ﾉﾞﾃｶﾝ減量(0.8mg/m2)                            | 5        | 16       | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞｰﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ注射用1. 1 m g *:0.8m g / m Day1 Day5 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ﾉﾞﾃｶﾝ増量(1.2mg/m2)                            | 5        | 16       | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞｰﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ注射用1. 1 m g *:1.2m g / m Day1 Day5 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ﾊﾞ(ｼｽﾞﾏﾌﾞ)維持療法(15mg/kg) [Bev BS]             | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞ(ｼｽﾞﾏﾌﾞ)BS点滴静注(ｵｰｸﾞ用) :15m g / kg Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ﾊﾞ(ｼｽﾞﾏﾌﾞ)維持療法(7.5mg/kg) [Bev BS]            | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞ(ｼｽﾞﾏﾌﾞ)BS点滴静注(ｵｰｸﾞ用) :7.5m g / kg Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| PEM単剤  | 1        | 20       | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞｰﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ点滴静注液「N K」(ｵｰｸﾞ用) :500m g / m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ﾊﾞﾓﾄﾞｷｾﾄﾞ+ｴﾙｵﾃﾞﾆﾌﾞ併用療法                       | 1        | 20       | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞｰﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ点滴静注液「N K」(ｵｰｸﾞ用) :500m g / m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ﾊﾞ(ｼｽﾞﾏﾌﾞ) + ｴﾙｵﾃﾞﾆﾌﾞ (15mg/kg) 維持療法[BV BS]  | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞ(ｼｽﾞﾏﾌﾞ)BS点滴静注(ｵｰｸﾞ用) :15m g / kg Day1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞｰﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ点滴静注液「N K」(ｵｰｸﾞ用) :500m g / m Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ﾊﾞ(ｼｽﾞﾏﾌﾞ) + ｴﾙｵﾃﾞﾆﾌﾞ (7.5mg/kg) 維持療法[BV BS] | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞ(ｼｽﾞﾏﾌﾞ)BS点滴静注(ｵｰｸﾞ用) :7.5m g / kg Day1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞｰﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ点滴静注液「N K」(ｵｰｸﾞ用) :500m g / m Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ﾅﾌﾞﾊﾞｸﾞﾀｷｾﾙ(125mg/m2)単剤療法                    | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ静注0.75mg/5mLﾀｲﾎﾟﾙ:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾟﾗｸﾞｷﾝ点滴静注用1 0 0 m g :125mg/m Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ﾅﾌﾞﾊﾞｸﾞﾀｷｾﾙ(100mg/m2) 単剤療法                   | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ静注0.75mg/5mLﾀｲﾎﾟﾙ:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾟﾗｸﾞｷﾝ点滴静注用1 0 0 m g :100mg/m Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ﾅﾌﾞﾊﾞｸﾞﾀｷｾﾙ(75mg/m2)単剤療法                     | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ静注0.75mg/5mLﾀｲﾎﾟﾙ:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾟﾗｸﾞｷﾝ点滴静注用1 0 0 m g :75mg/m Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| ﾅﾌﾞﾊﾞｸﾞﾀｷｾﾙ(50mg/m2)単剤療法                     | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15<br>ﾊﾞﾙｾﾄｰﾝ静注0.75mg/5mLﾀｲﾎﾟﾙ:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾟﾗｸﾞｷﾝ点滴静注用1 0 0 m g :50mg/m Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| CBDCA/CPT (day1.8)                           | 8        | 13       | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞｰﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day8<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>生理食塩液「ﾋｶﾘ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day8<br>ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液(ｵｰｸﾞ用):50m g / m Day1 Day8<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾃﾞﾝ点滴静注液(ｵｰｸﾞ用) :0m g / A Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| CBDCA/CPT (day1.8.15)                        | 15       | 13       | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞｰﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day15 Day8<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15 Day8<br>生理食塩液「ﾋｶﾘ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day15 Day8<br>ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液(ｵｰｸﾞ用):50m g / m Day1 Day15 Day8<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day8<br>ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾃﾞﾝ点滴静注液(ｵｰｸﾞ用) :0m g / A Day1 Day15 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day8<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| CBDCA/ETOP                                   | 3        | 18       | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞｰﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>ﾌﾟﾙｶﾞﾙ点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>生理食塩液「ﾋｶﾘ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3<br>ｴﾄﾌﾟｼﾞﾝ点滴静注液1 0 0 m g / 5 m l :80m g / m Day1 Day2 Day3<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾃﾞﾝ点滴静注液(ｵｰｸﾞ用) :0m g / A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day3 Day2<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day1        | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |

| レジメン名                           | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種           |
|---------------------------------|----------|----------|--|-------------------|
| CBDCA/PAC                       | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1<br>7-チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注20mg「ザワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1<br>グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:200mg/㎡ Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| CBDCA/PAC210/Bev[BV BS]         | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1<br>7-チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注20mg「ザワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1<br>グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:210mg/㎡ Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day1<br>ベシズマブBS点滴静注 (オーダ用) :15mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| CBDCA/PAC175/Bev[BV BS]         | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1<br>7-チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注20mg「ザワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1<br>グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175mg/㎡ Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day1<br>ベシズマブBS点滴静注 (オーダ用) :15mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| weeklyCBDCA/PTX/TRT             | 36       | 6        | グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>7-チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>ファモチジン静注20mg「ザワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>大塚生食注/バッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:40mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| CBDCA/PEM                       | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>7-チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ベストレキセド点滴静注液「NK」 (オーダ用) :500mg/㎡ Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| CBDCA/PEM/Bev [BV BS]           | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ベシズマブBS点滴静注 (オーダ用) :15mg/kg Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>7-チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ベストレキセド点滴静注液「NK」 (オーダ用) :500mg/㎡ Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| CBDCA/PEM/オシメルチニブ併用療法 (1~4コース目) | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>7-チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ベストレキセド点滴静注液「NK」 (オーダ用) :500mg/㎡ Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| CBDCA/TS-1                      | 1        | 27       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>7-チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| CBDCA(5/6)/nab-PTX(100mg/m2)    | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day8<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15 Day8<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/㎡ Day1 Day15 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day8<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |
| CBDCA(AUC5)/nab-PTX(75mg/m2)    | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day8<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15 Day8<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :75mg/㎡ Day1 Day15 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day8<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌 |

| レジメン名                          | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種               |
|--------------------------------|----------|----------|---|-----------------------|
| CDDP・PEM併用療法                   | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞﾙ8mg相当) : 1 V Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞﾙ2mg相当): 2 A Day1<br>ﾊﾞｰﾄﾞ注射液0.75mg(ｲﾝﾄﾞﾙ2mg相当): 2 A Day1<br>(GE-ｼﾝｸﾞ) ﾎﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 m l / A ) : 0.4 A Day1<br>ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 3 0 0 m l : 300mL Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「マルコ」 ( ﾀﾞｸﾞ用 ) : 75m g / m l Day1<br>(GE-ｼﾝｸﾞ) ﾎﾙﾃﾞﾑ 1 輸液 2 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1  | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| CDDP・PEM・BV (7.5mg/kg) [BV BS] | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ﾊﾞｰﾄﾞ注射液BS点滴静注 ( ﾀﾞｸﾞ用 ) : 7.5m g / k g Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞﾙ8mg相当) : 1 V Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞﾙ2mg相当): 2 A Day1<br>ﾊﾞｰﾄﾞ注射液0.75mg(ｲﾝﾄﾞﾙ2mg相当): 2 A Day1<br>(GE-ｼﾝｸﾞ) ﾎﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 m l / A ) : 0.4 A Day1<br>ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 3 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「マルコ」 ( ﾀﾞｸﾞ用 ) : 75m g / m l Day1<br>ｼﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 2 0 0 m l : 1 袋 Day1                          | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| CDDP・PEM・BV (15mg/kg) [BV BS]  | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ﾊﾞｰﾄﾞ注射液BS点滴静注 ( ﾀﾞｸﾞ用 ) : 15m g / k g Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞﾙ8mg相当) : 1 V Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞﾙ2mg相当): 2 A Day1<br>ﾊﾞｰﾄﾞ注射液0.75mg(ｲﾝﾄﾞﾙ2mg相当): 2 A Day1<br>(GE-ｼﾝｸﾞ) ﾎﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 m l / A ) : 0.4 A Day1<br>ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 3 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「マルコ」 ( ﾀﾞｸﾞ用 ) : 75m g / m l Day1<br>ｼﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 2 0 0 m l : 1 袋 Day1                           | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| CDDP・PEM・オシメルチニブ併用療法 (1~4コース目) | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞﾙ8mg相当) : 1 V Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞﾙ2mg相当): 2 A Day1<br>ﾊﾞｰﾄﾞ注射液0.75mg(ｲﾝﾄﾞﾙ2mg相当): 2 A Day1<br>(GE-ｼﾝｸﾞ) ﾎﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 m l / A ) : 0.4 A Day1<br>ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 3 0 0 m l : 300mL Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「マルコ」 ( ﾀﾞｸﾞ用 ) : 75m g / m l Day1<br>(GE-ｼﾝｸﾞ) ﾎﾙﾃﾞﾑ 1 輸液 2 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1  | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| CDDP・PEM・オシメルチニブ併用療法 (5コース目以降) | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞﾙ8mg相当) : 1 V Day1<br>ﾊﾞｰﾄﾞ注射液0.75mg(ｲﾝﾄﾞﾙ2mg相当): 2 A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1  | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| CDDP・CPT併用療法                   | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞﾙ8mg相当) : 1 V Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞﾙ2mg相当): 2 A Day1 Day8 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1 Day8 Day15<br>ｲﾝﾄﾞﾙ点滴静注( ﾀﾞｸﾞ用 ) : 60m g / m l Day1 Day8 Day15<br>(GE-ｼﾝｸﾞ) ﾎﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 m l / A ) : 0.4 A Day1<br>ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 3 0 0 m l : 300mL Day1<br>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「マルコ」 ( ﾀﾞｸﾞ用 ) : 60m g / m l Day1<br>ｼﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 2 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day8 Day15          | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| CDDP・ETOP (100mg/m) 併用療法       | 3        | 18       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞﾙ8mg相当) : 1 V Day1 Day2 Day3<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞﾙ2mg相当): 2 A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1 Day2 Day3<br>ｲﾄﾞﾎﾞｼﾞﾝ点滴静注 1 0 0 m g 「 ﾀﾞｸﾞ 」 5 m l : 100m g / m l Day1 Day2 Day3<br>(GE-ｼﾝｸﾞ) ﾎﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 m l / A ) : 0.4 A Day1<br>ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 3 0 0 m l : 300mL Day1<br>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「マルコ」 ( ﾀﾞｸﾞ用 ) : 80m g / m l Day1<br>ｼﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 2 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day2 Day3 Day1 | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |
| CDDP・ETOP (80mg/m) 併用療法        | 3        | 18       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞﾙ8mg相当) : 1 V Day1 Day2 Day3<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞﾙ2mg相当): 2 A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1 Day2 Day3<br>ｲﾄﾞﾎﾞｼﾞﾝ点滴静注 1 0 0 m g 「 ﾀﾞｸﾞ 」 5 m l : 80m g / m l Day1 Day2 Day3<br>(GE-ｼﾝｸﾞ) ﾎﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 5 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 m l / A ) : 0.4 A Day1<br>ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 3 0 0 m l : 300mL Day1<br>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「マルコ」 ( ﾀﾞｸﾞ用 ) : 80m g / m l Day1<br>ｼﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 2 0 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day2 Day3 Day1  | 呼吸器内科 / 呼吸器外科 / 2. 肺癌 |



| レジメン名                              | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種            |
|------------------------------------|----------|----------|---|--------------------|
| CDDP-VNR(25mg/m <sup>2</sup> )併用療法 | 8        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾌﾟﾗﾄ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m l :25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8<br>(GE-ｼﾞﾝｸﾞ)ｼﾞﾝｸﾞ A 輸液 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生理食塩液[ヒカリ] 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注[マルコ] (オーダ用) :75m g /m l Day1<br>ｼﾞﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌  |
| CDDP-VNR(20mg/m <sup>2</sup> )併用   | 8        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾌﾟﾗﾄ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m l :20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8<br>(GE-ｼﾞﾝｸﾞ)ｼﾞﾝｸﾞ A 輸液 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生理食塩液[ヒカリ] 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注[マルコ] (オーダ用) :75m g /m l Day1<br>ｼﾞﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌  |
| CDDP-GEM併用療法                       | 8        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾌﾟﾗﾄ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注液[ N K ] (オーダ用) :1000m g /m l Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>(GE-ｼﾞﾝｸﾞ)ｼﾞﾝｸﾞ A 輸液 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1<br>生理食塩液[ヒカリ] 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注[マルコ] (オーダ用) :80m g /m l Day1<br>ｼﾞﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌  |
| 周期期 CDDP+GEM+ヘムプロシズマブ              | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ﾌﾟﾗﾄ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注液[ N K ] (オーダ用) :1000m g /m l Day1 Day8<br>(GE-ｼﾞﾝｸﾞ)ｼﾞﾝｸﾞ A 輸液 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生理食塩液[ヒカリ] 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注[マルコ] (オーダ用) :75m g /m l Day1<br>ｼﾞﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1 | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌  |
| 周期期 CDDP+PEM+ヘムプロシズマブ              | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾌﾟﾗﾄ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ﾍﾞﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液[ N K ] (オーダ用) :500m g /m l Day1<br>(GE-ｼﾞﾝｸﾞ)ｼﾞﾝｸﾞ A 輸液 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生理食塩液[ヒカリ] 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注[マルコ] (オーダ用) :75m g /m l Day1<br>ｼﾞﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 2 0 0 m l :1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌  |
| 周期期 ヘムプロシズマブ療法 q[3]w               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌  |
| 周期期 ヘムプロシズマブ療法 q[6]w               | 1        | 41       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :400m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌  |
| アテゾリズマブ (テセントリク) 術後補助療法            | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフバグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g / 2 0 m l * :1200m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1  | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌  |
| CBDCA/PEM/オシメルチニブ併用療法 (5コース目以降)    | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾍﾞﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液[ N K ] (オーダ用) :500m g /m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌  |
| CDDP+ADR+CPA併用療法                   | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾌﾟﾗﾄ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾄﾞｷﾞﾙﾋﾞﾝｼﾝｸﾞ酸塩注射液 (オーダ用) :50m g /m l Day1<br>ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ注 (オーダ用) :500m g /m l Day1<br>(GE-ｼﾞﾝｸﾞ)ｼﾞﾝｸﾞ A 輸液 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :200mL Day1<br>生理食塩液[ヒカリ] 5 0 0 m l :0.5袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注[マルコ] (オーダ用) :50m g /m l Day1   | 呼吸器内科/呼吸器外科/3. 胸腺腫 |

| レジメン名                    | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種 |
|--------------------------|----------|----------|---|---------|
| CDDP+RT                  | 1        | 20       | 生理食塩液「バッグフソール」1 L:1袋 Day1<br>硫酸Mg補正液 1mEq/ml (2.0mL/A):0.4A Day1<br>大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2.35mg:1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (9.0mg相当):1V Day1<br>デキサメタゾン注射液1.65mg(9.0mg相当):2A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.00mL:1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):100mg/ml Day1<br>マンニトールS注射液 3.00mL:1瓶 Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1<br>(GE-リカ)ソルデム3A輸液 5.00mL:1袋 Day1   | 口腔外科    |
| weeklyCDDP+RT療法          | 1        | 6        | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.00mL:1袋 Day1<br>硫酸Mg補正液 1mEq/ml (2.0mL/A):0.4A Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1<br>グラニセトロン点滴静注「バッグ」3mg/1.00mL「HK」:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2.35mg:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (9.0mg相当):1V Day1<br>デキサメタゾン注射液1.65mg(9.0mg相当):2A Day1<br>マンニトールS注射液 3.00mL:1瓶 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):40mg/ml Day1   | 口腔外科    |
| Cmab+RT (1クール目)          | 1        | 6        | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (9.0mg相当):1V Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>アーピタックス注射液 (オーダー用):400mg/ml Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1   | 口腔外科    |
| Cmab+RT (2クール目以降)        | 1        | 6        | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (9.0mg相当):1V Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>アーピタックス注射液 (オーダー用):250mg/ml Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1   | 口腔外科    |
| Cmab+FP (1クール目)          | 15       | 6        | 生理食塩液「バッグフソール」1 L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2.35mg:1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (9.0mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15<br>デキサメタゾン注射液1.65mg(9.0mg相当):2A Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1 Day8 Day15<br>アーピタックス注射液 (オーダー用):400mg/ml Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day5 Day8 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.00mL:1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):100mg/ml Day1<br>マンニトールS注射液 3.00mL:300mL Day1<br>フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用):1000mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4<br>(GE-リカ)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4<br>アーピタックス注射液 (オーダー用):250mg/ml Day8 Day15 | 口腔外科    |
| Cmab+FP (2クール目以降)        | 15       | 6        | 生理食塩液「バッグフソール」1 L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2.35mg:1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (9.0mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15<br>デキサメタゾン注射液1.65mg(9.0mg相当):2A Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1 Day8 Day15<br>アーピタックス注射液 (オーダー用):250mg/ml Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day5 Day8 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.00mL:1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):100mg/ml Day1<br>マンニトールS注射液 3.00mL:300mL Day1<br>フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用):1000mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4<br>(GE-リカ)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4                                | 口腔外科    |
| Cmab+weekly PTX (1クール目)  | 1        | 6        | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (9.0mg相当):1V Day1<br>デキサメタゾン注射液1.65mg(9.0mg相当):1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>アーピタックス注射液 (オーダー用):400mg/ml Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1<br>ファモチジン静注20mg「サイイ」(20mL/A):1A Day1<br>バクリタキセル注 1.00mg/16.7mL「NK」:80mg/ml Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1  | 口腔外科    |
| Cmab+weeklyPTX (2クール目以降) | 1        | 6        | 大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>アーピタックス注射液 (オーダー用):250mg/ml Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1<br>バクリタキセル注 1.00mg/16.7mL「NK」:80mg/ml Day1<br>大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (9.0mg相当):1V Day1<br>ファモチジン静注20mg「サイイ」(20mL/A):1A Day1   | 口腔外科    |
| ニボルマブ                    | 1        | 13       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1<br>オブザーボ点滴静注用 2.40mg/2.4mL *:240mg Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1  | 口腔外科    |
| キイトルーダ療法 (3週) (頭頸部がん)    | 1        | 20       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1.00mg/4mL *:200mg Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1  | 口腔外科    |
| キイトルーダ療法 (6週) (頭頸部がん)    | 1        | 41       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1.00mg/4mL *:400mg Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1  | 口腔外科    |

| レジメン名                                | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種 |
|--------------------------------------|----------|----------|---|---------|
| ヘムブrosisマブ+FP療法（頭頸部がん）               | 4        | 17       | 生理食塩液「フソ」1 L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4<br>フルオウラシル注「トロー」(オーダー用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4<br>(GE-リカ)ソルチム3 A 輸液 1 L:1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day4<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day2 Day3 Day4 Day1<br>硫酸Mg 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 m l / A ) :0.4A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロ/静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テチト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):100mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ラシックス注 2 0 m g 2 m l :0.5A Day1              | 口腔外科    |
| 導入化学療法PCE療法（初回）                      | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>テチト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>アモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>アーピタックス注射液 (オーダー用):400m g/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>パロ/セトロ/静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダー用):0m g/A Day1  | 口腔外科    |
| 導入化学療法PCE療法（2コース目以降）                 | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>テチト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>アモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>アーピタックス注射液 (オーダー用):250m g/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>パロ/セトロ/静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダー用):0m g/A Day1   | 口腔外科    |
| 進行・再発PCE療法（初回）                       | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>テチト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15<br>アモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>アーピタックス注射液 (オーダー用):400m g/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パロ/セトロ/静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:100m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダー用):0m g/A Day1 Day8<br>アーピタックス注射液 (オーダー用):250m g/m <sup>2</sup> Day8 Day15 | 口腔外科    |
| 進行・再発PCE療法（2コース目以降）（6コース目まで）         | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>テチト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15<br>アモチジン静注液20m g「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>アーピタックス注射液 (オーダー用):250m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パロ/セトロ/静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:100m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダー用):0m g/A Day1 Day8  | 口腔外科    |
| 進行・再発 PCE療法（7コース目以降）                 | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>アーピタックス注射液 (オーダー用):250m g/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 口腔外科    |
| CDDP+DTX（ルート1本）                      | 5        | 2        | シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダー用):10mg/m <sup>2</sup> Day1   | 口腔外科    |
| CDDP+DTX（ルート2本）                      | 5        | 2        | シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):2.5m g/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダー用):5mg/m <sup>2</sup> Day1   | 口腔外科    |
| 新_TPF                                | 6        | 1        | (GE-リカ)ソルチム3 A 輸液 1 L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>ソリアセト F 輸液 5 0 0 m l /袋:1袋 Day2<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day2<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day2<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダー用):60mg/m <sup>2</sup> Day2<br>グラニセトロン点滴静注「バッグ」3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day2<br>生理食塩液「フソ」1 L:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用):80m g/m <sup>2</sup> Day2<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :200mL Day2<br>フルオウラシル注「トロー」(オーダー用):500m g Day3 Day4 Day5 Day6<br>アムペンラン注射液 1 0 m g 2 m l :1A Day3 Day4 Day5 Day6                    | 口腔外科    |
| Pemb r o l izmab+CBDCA+5-FU療法（頭頸部がん） | 4        | 17       | 生理食塩液「フソ」1 L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4<br>フルオウラシル注「トロー」(オーダー用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4<br>(GE-リカ)ソルチム3 A 輸液 1 L:1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day4 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day2 Day3 Day4 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>パロ/セトロ/静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テチト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダー用):0m g/A Day1   | 口腔外科    |

| レジメン名                           | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種            |
|---------------------------------|----------|----------|--|--------------------|
| 分割DCF-RT [臨床試験][アロカリス]          | 33       | 9        | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1 Day15 Day29<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A ) : 0.4A Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 Day15 Day29<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) : 35mg/m Day1 Day15 Day29<br>生理食塩液「バグフソール」1 L : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day29<br>Day30 Day31 Day32 Day33<br>フルオロウラシル注「トロー」(オーダ用) : 400m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day15 Day16 Day17 Day18<br>Day19 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) : 40m g /m Day1 Day15 Day29<br>ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day15 Day29<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当): 1A Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day19 Day29 Day33 Day5<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1筒 Day15 Day29<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL: 1筒 Day19 Day33 Day5 | 消化器外科/1. 食道癌       |
| 分割DCF-RT [臨床試験][アロカリス]_BW測定指示あり | 33       | 9        | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1 Day15 Day29<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A ) : 0.4A Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 Day15 Day29<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) : 35mg/m Day1 Day15 Day29<br>生理食塩液「バグフソール」1 L : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day29<br>Day30 Day31 Day32 Day33<br>フルオロウラシル注「トロー」(オーダ用) : 400m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day15 Day16 Day17 Day18<br>Day19 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) : 40m g /m Day1 Day15 Day29<br>ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day15 Day29<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当): 1A Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day19 Day29 Day33 Day5<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1筒 Day15 Day29<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL: 1筒 Day19 Day33 Day5 | 消化器外科/1. 食道癌       |
| NAC FP                          | 5        | 16       | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A ) : 0.4A Day1<br>生理食塩液「バグフソール」1 L : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>フルオロウラシル注「トロー」(オーダ用) : 800m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) : 80m g /m Day1<br>ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day5<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当): 1A Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL: 1筒 Day5  | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |
| NAF                             | 5        | 16       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当): 2A Day1<br>トキソリン酸塩点滴静注(オーダ用) : 30m g /m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1<br>アワプラ注 (オーダ用) : 60m g /m Day1<br>(GE-ツカ)ソルチム3 A 輸液 1 L : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day5 Day4<br>フルオロウラシル注「トロー」(オーダ用) : 700m g /m Day1 Day2 Day3 Day5 Day4<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day5<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL: 1筒 Day5  | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |
| 食道FP                            | 5        | 23       | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A ) : 0.4A Day1<br>生理食塩液「バグフソール」1 L : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>フルオロウラシル注「トロー」(オーダ用) : 800m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) : 80m g /m Day1<br>ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当): 1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day5<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL: 1筒 Day5<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |
| 食道DCF                           | 5        | 16       | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 mL/A ) : 0.4A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) : 70mg/m Day1<br>生理食塩液「バグフソール」1 L : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>フルオロウラシル注「トロー」(オーダ用) : 700m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) : 70m g /m Day1<br>ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当): 1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day5<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL: 1筒 Day5  | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |

| レジメン名                       | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種            |
|-----------------------------|----------|----------|--|--------------------|
| 分割DCF                       | 15       | 13       | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1<br>硫酸Mg補正液 1mEq/m l ( 2 0 m L/A) : 0.4A Day1<br>大塚生食注ソフトバグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 Day15<br>トセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) : 30mg/m Day1 Day15<br>生理食塩液「バグフソー」1 L : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>フルオロウラル注「トロー」(オーダ用) : 800m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) : 80m g/m Day1<br>ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day15 Day5<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) : 1V Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1<br>ﾊﾞﾛ/ｾﾄﾞ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞ」: 1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当): 1A Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1 Day15<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝ/Na100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾌﾞｰ」10mL: 1筒 Day15 Day5                             | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |
| 食道mFOLFOX6 (入院)             | 2        | 12       | (GE-ツカ)ソルデム3 A輸液 1 L : 1袋 Day2 Day1<br>フルオロウラル注「トロー」(オーダ用) : 1200m g/m Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day2 Day1<br>ｸﾗﾝﺴﾞﾄﾞ点滴静注「ﾊﾞｯｸ」3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l : 1A Day1<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>ｼﾎﾞﾘｰﾅﾄﾞ点滴静注用 (オーダ用) : 200m g/m Day1<br>ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾎｽﾋﾞｰ」(オーダ用) : 85m g/m Day1<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>フルオロウラル注「トロー」(オーダ用) : 400m g/m Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝ/Na100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾌﾞｰ」10mL: 1筒 Day2  | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |
| 食道mFOLFOX6 (ホプ)             | 1        | 13       | ｸﾗﾝﺴﾞﾄﾞ点滴静注「ﾊﾞｯｸ」3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l : 1A Day1<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>ｼﾎﾞﾘｰﾅﾄﾞ点滴静注用 (オーダ用) : 200m g/m Day1<br>ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾎｽﾋﾞｰ」(オーダ用) : 85m g/m Day1<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>フルオロウラル注「トロー」(オーダ用) : 400m g/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>フルオロウラル注「トロー」(オーダ用) : 2400m g/m Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝ/Na100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾌﾞｰ」10mL: 1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1   | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |
| 食道SOX                       | 1        | 20       | ｸﾗﾝﺴﾞﾄﾞ点滴静注「ﾊﾞｯｸ」3 m g / 1 0 0 m L「HK」: 1袋 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l : 1A Day1<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾎｽﾋﾞｰ」(オーダ用) : 130m g/m Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当): 1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝ/Na100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾌﾞｰ」10mL: 1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |
| 食道FP+Pembrolizumab療法        | 5        | 16       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1<br>ﾊﾞﾛ/ｾﾄﾞ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞ」: 1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当): 1A Day1<br>生理食塩液「バグフソー」1 L : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>フルオロウラル注「トロー」(オーダ用) : 800m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) : 80m g/m Day1<br>ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day5<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝ/Na100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾌﾞｰ」10mL: 1筒 Day5<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l : 1A Day1<br>硫酸Mg補正液 1mEq/m l ( 2 0 m L/A) : 0.4A Day1<br>ｷｲﾄﾙｰｸﾞ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1  | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |
| 食道FP+PembrolizumabのPembroのみ | 1        | 20       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝ/Na100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾌﾞｰ」10mL: 1筒 Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l : 1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>ｷｲﾄﾙｰｸﾞ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1  | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |
| 食道FP+Nivolumab【Nivo2週間隔】    | 15       | 13       | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1<br>硫酸Mg補正液 1mEq/m l ( 2 0 m L/A) : 0.4A Day1<br>フルオロウラル注「トロー」(オーダ用) : 800m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液「バグフソー」1 L : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) : 80m g/m Day1<br>(GE-ツカ)ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L : 1袋 Day1<br>ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day15<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝ/Na100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾌﾞｰ」10mL: 1筒 Day15 Day5<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day5 Day15<br>ﾊﾞﾛ/ｾﾄﾞ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞ」: 1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当): 1A Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l : 1A Day1 Day15<br>ｵﾌﾞｼｰﾎﾟ点滴静注 (オーダ用) : 240mg Day1 Day15 | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |

| レジメン名                      | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種                |
|----------------------------|----------|----------|---|------------------------|
| 食道FP+Nivolumab【Nivo4週間隔】   | 5        | 23       | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day1<br>硫酸Mg 補正液 1 mEq/m l ( 2 0 m L/A ) : 0.4A Day1<br>フルオロウラル注「トール」 ( オード用 ) : 800m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液「バグフソール」 1 L : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 ( オード用 ) : 80m g / m l Day1<br>(GE-ツカ)ソルチム3 A 輸液 5 0 0 m L : 1袋 Day1<br>ラシックス注 2 0 m g 2 m l : 0.5A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day5<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>アロカリア点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1<br>デキスト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>デキスト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day5<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1<br>オプジーボ点滴静注 (オード用) : 480mg Day1   | 消化器内科 / 消化器外科 / 1. 食道癌 |
| 食道5-FU+Nivolumab【Nivo2週間隔】 | 15       | 13       | フルオロウラル注「トール」 ( オード用 ) : 800m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液「バグフソール」 1 L : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day15<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day15 Day5<br>デキスト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 Day15<br>オプジーボ点滴静注 (オード用) : 240mg Day1 Day15   | 消化器内科 / 消化器外科 / 1. 食道癌 |
| 食道5-FU+Nivolumab【Nivo4週間隔】 | 5        | 23       | フルオロウラル注「トール」 ( オード用 ) : 800m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液「バグフソール」 1 L : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day5<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day5<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1<br>オプジーボ点滴静注 (オード用) : 480mg Day1  | 消化器内科 / 消化器外科 / 1. 食道癌 |
| 食道二ボルマブ・イピリムマブ併用療法         | 29       | 13       | (ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1 Day15 Day29<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 5m g Day1 Day15 Day29<br>オプジーボ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m L : 240m g Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注 5 0 m l : 0.4瓶 Day1<br>ヤーボイ点滴静注液 (オード用) * : 1mg/kg Day1  | 消化器内科 / 消化器外科 / 1. 食道癌 |
| 食道二ボルマブ療法 (2W間隔)           | 1        | 13       | 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>オプジーボ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m L * : 240m g Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科 / 消化器外科 / 1. 食道癌 |
| 食道二ボルマブ療法【4W間隔】            | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>オプジーボ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m L * : 480m g Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1   | 消化器内科 / 消化器外科 / 1. 食道癌 |
| 食道 P T X (初回)【6週レジメン】      | 36       | 7        | クラニセトロン点滴静注「バグフソール」 3 m g / 1 0 0 m L [HK]: 1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>デキスト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>デキスト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1 Day22 Day29 Day36<br>ファミチン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) : 1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]: 100m g / m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>デキスト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 | 消化器内科 / 消化器外科 / 1. 食道癌 |
| 食道 P T X (コース目以降)【6週レジメン】  | 36       | 7        | クラニセトロン点滴静注「バグフソール」 3 m g / 1 0 0 m L [HK]: 1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>デキスト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>ファミチン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) : 1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]: 100m g / m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36  | 消化器内科 / 消化器外科 / 1. 食道癌 |
| 食道 P T X (初回)【1週レジメン】      | 1        | 6        | クラニセトロン点滴静注「バグフソール」 3 m g / 1 0 0 m L [HK]: 1袋 Day1<br>デキスト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>デキスト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>ファミチン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) : 1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]: 100m g / m l Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1   | 消化器内科 / 消化器外科 / 1. 食道癌 |
| 食道 P T X (2回目以降)【1週レジメン】   | 1        | 6        | クラニセトロン点滴静注「バグフソール」 3 m g / 1 0 0 m L [HK]: 1袋 Day1<br>デキスト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファミチン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) : 1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]: 100m g / m l Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本: 1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科 / 1. 食道癌 |

| レジメン名          | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種            |
|----------------|----------|----------|--|--------------------|
| 食道ドセタキセル単独療法   | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注「バグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」500mL:1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」10mL/本:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1   | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |
| RT併用FP         | 4        | 24       | 生理食塩液「ヒカリ」500mL:1袋 Day1<br>硫酸Mg補正液 1mEq/mL (2.0mL/A):0.4A Day1<br>生理食塩液「バグ」1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4<br>フルオロウラシル注「トーウ」(オーダ用):700mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ラシックス注 20mg/2mL:0.5A Day1<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>デキストラン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day4<br>生食注シリンジ「オーツカ」10mL/本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day4          | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |
| 食道癌 RT併用FOLFOX | 2        | 12       | (GE-カ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day2 Day1<br>フルオロウラシル注「トーウ」(オーダ用):800mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day1<br>グラニセロン点滴静注「バグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」(オーダ用):85mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1<br>フルオロウラシル注「トーウ」(オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」10mL/本:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day2 | 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌 |
| 胃SP 3週ごと       | 1        | 20       | 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>デキストラン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」500mL:1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ラシックス注 20mg/2mL:0.5A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」500mL:2袋 Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1<br>硫酸Mg補正液 1mEq/mL (2.0mL/A):0.4A Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」10mL/本:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌  |
| FU-LV          | 36       | 20       | ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):250mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36<br>ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36<br>フルオロウラシル注「トーウ」(オーダ用):600mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 Day22 Day8 Day15 Day29 Day36<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day22 Day8 Day15 Day29 Day36<br>生食注シリンジ「オーツカ」10mL/本:1筒 Day1 Day22 Day8 Day15 Day29 Day36                | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌  |
| 胃CapeOX[130]   | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注「バグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」(オーダ用):130mg/m <sup>2</sup> Day1<br>デキストラン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」10mL/本:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌  |
| 胃DOS           | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注「バグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1<br>デキストラン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):40mg/m <sup>2</sup> Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」10mL/本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌  |
| 胃SOX (100)     | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注「バグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1<br>デキストラン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」10mL/本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌  |
| 胃SOX[130]      | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注「バグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」(オーダ用):130mg/m <sup>2</sup> Day1<br>デキストラン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」10mL/本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌  |

| レジメン名                  | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種             |
|------------------------|----------|----------|--|---------------------|
| 胃mFOLFOX6              | 2        | 12       | (GE-ツク)ソルデム3 A 輸液 1 L :1袋 Day2 Day1<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day2 Day1<br>グラニセトロン点滴静注「ブツ」3mg / 1 0 0 mL [HK] :1袋 Day1<br>フマリン注 5mg 1ml :1A Day1<br>ポラミン注 5mg 1ml :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250ml :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50ml :1瓶 Day1<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day2 | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃mFOLFOX6 (ホンプ)        | 1        | 13       | グラニセトロン点滴静注「ブツ」3mg / 1 0 0 mL [HK] :1袋 Day1<br>フマリン注 5mg 1ml :1A Day1<br>ポラミン注 5mg 1ml :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250ml :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50ml :1瓶 Day1<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :2400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃XP                    | 1        | 20       | 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1<br>硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A) :0.4A Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :80mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ラックス注 20mg 2ml :0.5A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 500mL :2袋 Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>フマリン注 5mg 1ml :1A Day1<br>フマリン注 1.65mg (乳酸塩2mg相当) :1A Day1<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1   | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃SP                    | 8        | 27       | 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day8<br>硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A) :0.4A Day8<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :60mg/m <sup>2</sup> Day8<br>ラックス注 20mg 2ml :0.5A Day8<br>生理食塩液「ヒカリ」 500mL :2袋 Day8<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day8<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day8<br>フマリン注 5mg 1ml :1A Day8<br>フマリン注 1.65mg (乳酸塩2mg相当) :1A Day8<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 :1瓶 Day8<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day8<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day8<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day8   | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃Weekly PTX (初回)       | 15       | 13       | グラニセトロン点滴静注「ブツ」3mg / 1 0 0 mL [HK] :1袋 Day1 Day8 Day15<br>フマリン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 Day15<br>ポラミン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトパック 250ml :1袋 Day1 Day8 Day15<br>バロ/タキセル注 100mg / 1 6. 7ml [NK] :80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15<br>フマリン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 Day15   | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃Weekly PTX (2回目以降)    | 15       | 13       | グラニセトロン点滴静注「ブツ」3mg / 1 0 0 mL [HK] :1袋 Day1 Day8 Day15<br>フマリン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 Day15<br>ポラミン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトパック 250ml :1袋 Day1 Day8 Day15<br>バロ/タキセル注 100mg / 1 6. 7ml [NK] :80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1 Day8 Day15  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃Weekly [nab-] PTX     | 15       | 13       | グラニセトロン点滴静注「ブツ」3mg / 1 0 0 mL [HK] :1袋 Day15 Day8<br>フマリン注 5mg 1ml :1A Day15 Day8<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day15 Day8<br>アブラキサン点滴静注用 100mg :100mg/m <sup>2</sup> Day15 Day8<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day15 Day8<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day15 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day15 Day8 Day15  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃 BIRIPシスプラチン・イリリネカン併用 | 1        | 13       | 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 :1瓶 Day1<br>フマリン注 5mg 1ml :1A Day1<br>大塚生食注ソフトパック 250ml :1袋 Day1<br>イリリネカン塩酸塩点滴静注(オーダ用) :60mg/m <sup>2</sup> Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :30mg/m <sup>2</sup> Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃イリリネカン単剤              | 1        | 13       | グラニセトロン点滴静注「ブツ」3mg / 1 0 0 mL [HK] :1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1<br>フマリン注 5mg 1ml :1A Day1<br>大塚生食注ソフトパック 250ml :1袋 Day1<br>イリリネカン塩酸塩点滴静注(オーダ用) :150mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1   | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |



| レジメン名                    | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種           |
|--------------------------|----------|----------|---|-------------------|
| 胃NAC SOX                 | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.00mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :130mg / ml Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃補助DS (2~7コース目)          | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.00mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>ドセタセリル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :40mg/ml Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃CapeOX[130]+Her (初回)    | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.00mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :130mg / ml Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調整用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8mg / kg Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃CapeOX[130]+Her (2回目以降) | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.00mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :130mg / ml Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調整用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6mg / kg Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃SOX (100) + Her (初回)    | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.00mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :100mg / ml Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調整用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8mg / kg Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1 | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃SOX (100) + Her (2回目以降) | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.00mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :100mg / ml Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調整用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6mg / kg Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1 | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃SOX[130]+ Her (初回)      | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.00mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :130mg / ml Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調整用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8mg / kg Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1 | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃SOX[130]+ Her (2回目以降)   | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.00mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :130mg / ml Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調整用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6mg / kg Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1 | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |

| レジメン名                             | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種           |
|-----------------------------------|----------|----------|---|-------------------|
| 胃S-1+Her (初回)                     | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オゲダ用) :8m g/kg Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃S-1+Her (2回目以降)                  | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オゲダ用) :6m g/kg Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃mFOLFOX6-Her (初回) [6週レジメン]       | 30       | 12       | (GE-ウカ)ソルチム3 A輸液 1 L :1袋 Day2 Day1 Day15 Day29 Day16 Day30<br>フルオウラル注「トロー」 (オゲダ用) :1200m g/m Day2 Day1 Day15 Day29 Day16 Day30<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day15 Day29 Day16 Day30 Day22<br>グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day15 Day29<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15 Day29<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day15 Day29<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29<br>レボリナート点滴静注用 (オゲダ用) :200m g/m Day1 Day15 Day29<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オゲダ用) :85m g/m Day1 Day15 Day29<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29<br>フルオウラル注「トロー」 (オゲダ用) :400m g/m Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day22<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day22<br>ハーセプチン注射液 (オゲダ用) :8m g/kg Day1<br>生食注シリンジ「オツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day15 Day29 Day22<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day15 Day29 Day22<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day16 Day30 Day22<br>ハーセプチン注射液 (オゲダ用) :6m g/kg Day22 | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃mFOLFOX6-Her (初回) ポンプ用[6週レジメン]   | 29       | 13       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day15 Day29<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15 Day29<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day15 Day29<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29<br>レボリナート点滴静注用 (オゲダ用) :200m g/m Day1 Day15 Day29<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オゲダ用) :85m g/m Day1 Day15 Day29<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29<br>フルオウラル注「トロー」 (オゲダ用) :400m g/m Day1 Day15 Day29<br>フルオウラル注「トロー」 (オゲダ用) :2400m g/m Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29 Day22<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day22<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day22<br>ハーセプチン注射液 (オゲダ用) :8m g/kg Day1<br>生食注シリンジ「オツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1 Day15 Day29 Day22<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day15 Day29 Day22<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day15 Day29 Day22<br>ハーセプチン注射液 (オゲダ用) :6m g/kg Day22   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃mFOLFOX6-Her (2回目～) [6週レジメン]     | 30       | 12       | (GE-ウカ)ソルチム3 A輸液 1 L :1袋 Day2 Day1 Day15 Day29 Day16 Day30<br>フルオウラル注「トロー」 (オゲダ用) :1200m g/m Day2 Day1 Day15 Day29 Day16 Day30<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day15 Day29 Day16 Day30 Day22<br>グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day15 Day29<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15 Day29<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day15 Day29<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29<br>レボリナート点滴静注用 (オゲダ用) :200m g/m Day1 Day15 Day29<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オゲダ用) :85m g/m Day1 Day15 Day29<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29<br>フルオウラル注「トロー」 (オゲダ用) :400m g/m Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day22<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day22<br>ハーセプチン注射液 (オゲダ用) :6m g/kg Day1 Day22<br>生食注シリンジ「オツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day15 Day29 Day22<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day15 Day29 Day22<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day16 Day30 Day22                              | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃mFOLFOX6-Her (2回目～) ポンプ用[6週レジメン] | 29       | 13       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day15 Day29<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15 Day29<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day15 Day29<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29<br>レボリナート点滴静注用 (オゲダ用) :200m g/m Day1 Day15 Day29<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オゲダ用) :85m g/m Day1 Day15 Day29<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29<br>フルオウラル注「トロー」 (オゲダ用) :400m g/m Day1 Day15 Day29<br>フルオウラル注「トロー」 (オゲダ用) :2400m g/m Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29 Day22<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day22<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day22<br>ハーセプチン注射液 (オゲダ用) :6m g/kg Day1 Day22<br>生食注シリンジ「オツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1 Day15 Day29 Day22<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day15 Day29 Day22<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day15 Day29 Day22  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃[2週回し]mFOLFOX6-Her (初回)          | 2        | 12       | (GE-ウカ)ソルチム3 A輸液 1 L :1袋 Day2 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オゲダ用) :1200m g/m Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボリナート点滴静注用 (オゲダ用) :200m g/m Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オゲダ用) :85m g/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オゲダ用) :400m g/m Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オゲダ用) :8m g/kg Day1<br>生食注シリンジ「オツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |

| レジメン名                          | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種             |
|--------------------------------|----------|----------|---|---------------------|
| 胃[2週回し]mFOLFOX6-Her (初回) ポンプ用  | 1        | 13       | クラニセトン点滴静注/バッグ 3 mg / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>シボリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg / ml Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :85m g / ml Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :400m g / ml Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :2400m g / ml Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8m g / kg Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃[2週回し]mFOLFOX6-Her (2回目)      | 2        | 12       | (GE-カ)ソルデム 3 A 輸液 1 L :1袋 Day2 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :1200m g / ml Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>クラニセトン点滴静注/バッグ 3 mg / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>シボリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg / ml Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :85m g / ml Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :400m g / ml Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6m g / kg Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day2 | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃[2週回し]mFOLFOX6-Her (2回目) ポンプ用 | 1        | 13       | クラニセトン点滴静注/バッグ 3 mg / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>シボリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg / ml Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :85m g / ml Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :400m g / ml Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :2400m g / ml Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6m g / kg Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃X P Her (初回)                  | 1        | 20       | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq / m l ( 2 0 m L / A ) :0.4A Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :80m g / ml Day1<br>ランックス注 2 0 m g 2 m l :0.5A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :2袋 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ティマト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホリ」:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1                                    | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃X P Her (2回目以降)               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホリ」:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :80m g / ml Day1<br>ランックス注 2 0 m g 2 m l :0.5A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :2袋 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq / m l ( 2 0 m L / A ) :0.4A Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃S P Her (初回)                  | 1        | 20       | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq / m l ( 2 0 m L / A ) :0.4A Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :60m g / ml Day1<br>ランックス注 2 0 m g 2 m l :0.5A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :2袋 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ティマト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホリ」:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 m l :1A Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1                                    | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |

| レジメン名              | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種           |
|--------------------|----------|----------|--|-------------------|
| 胃SP Her (2回目以降)    | 1        | 20       | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>硫酸Mg補正液 1mEq/m l ( 2 0 mL/A) :0.4A Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :60m g/m l Day1<br>ラモックス注 2 0 m g 2 m l :0.5A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :2袋 Day1<br>大塚生食注ソフト「フグ」 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6m g/kg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):1A Day1<br>ﾊﾞﾛｾﾄﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞ」:1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾛｶﾘｽ点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツｶ」 1 0 m L /本:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃PTX+Her (初回)      | 71       | 6        | ｸﾗﾆｾﾄﾝ点滴静注/ﾊﾞｯｸ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day64<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):1A Day1 Day29 Day43 Day57 Day36 Day71<br>ﾌｱﾓﾁﾝ静注20m g「ｻｳｲ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day36 Day71<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71<br>大塚生食注ソフト「フグ」 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71<br>ﾊﾞﾘﾀｹｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」:80m g/m l Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):2A Day8 Day15<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day22 Day43 Day64<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8m g/kg Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6m g/kg Day22 Day43 Day64<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツｶ」 1 0 m L /本:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃PTX+Her (2回目以降)   | 71       | 6        | ｸﾗﾆｾﾄﾝ点滴静注/ﾊﾞｯｸ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day36 Day71<br>ﾌｱﾓﾁﾝ静注20m g「ｻｳｲ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day36 Day71<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71<br>大塚生食注ソフト「フグ」 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71<br>ﾊﾞﾘﾀｹｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」:80m g/m l Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day22 Day43 Day64<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6m g/kg Day1 Day22 Day43 Day64<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day64<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツｶ」 1 0 m L /本:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃エンハーツ             | 1        | 17       | ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツｶ」 1 0 m L /本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1<br>ｸﾗﾆｾﾄﾝ静注 3 m g ｼﾘﾝｼﾞ「ｻｳｲ」:1筒 Day1<br>ﾌﾟﾛｶﾘｽ点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>ｴﾝﾊｰﾂ点滴静注100mg:6.4mg/kg Day1   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃CapeOX[130]+ニボルマブ | 1        | 20       | ｸﾗﾆｾﾄﾝ点滴静注/ﾊﾞｯｸ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾌﾞﾄﾞﾞ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｵｷｻﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾎｽﾋﾞｰﾗ」(オーダ用) :130m g/m l Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツｶ」 1 0 m L /本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾟ点滴静注 (オーダ用) :360mg Day1   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃SOX(100)+ニボルマブ    | 1        | 20       | ｸﾗﾆｾﾄﾝ点滴静注/ﾊﾞｯｸ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾌﾞﾄﾞﾞ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｵｷｻﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾎｽﾋﾞｰﾗ」(オーダ用) :100m g/m l Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツｶ」 1 0 m L /本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾟ点滴静注 (オーダ用) :360mg Day1   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃SOX[130]+ニボルマブ    | 1        | 20       | ｸﾗﾆｾﾄﾝ点滴静注/ﾊﾞｯｸ 3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾌﾞﾄﾞﾞ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｵｷｻﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾎｽﾋﾞｰﾗ」(オーダ用) :130m g/m l Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツｶ」 1 0 m L /本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾟ点滴静注 (オーダ用) :360mg Day1   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |

| レジメン名                      | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種             |
|----------------------------|----------|----------|--|---------------------|
| 胃mFOLFOX6+Nivo (入院)        | 2        | 12       | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>(GE-ツカ)ソルチム3 A輸液 1L :1袋 Day1 Day2<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day2<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day2<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>オブジーホ点滴静注 2.40mg / 2.4mL :240mg Day1                                     | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃mFOLFOX6+Nivo (ポンプ)       | 1        | 13       | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :2400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>オブジーホ点滴静注 2.40mg / 2.4mL :240mg Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃ニボルマブ療法【2週毎】              | 1        | 13       | 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>オブジーホ点滴静注 2.40mg / 2.4mL * :240mg Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃ニボルマブ療法 (4週毎)             | 1        | 27       | 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>オブジーホ点滴静注 2.40mg / 2.4mL * :480mg Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃 FP+Pembrolizumab療法       | 5        | 16       | 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 1L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>デキストラン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当) :1A Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>生理食塩液/バッグ「フソ」 1L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :80mg/m <sup>2</sup> Day1<br>フラックス注 20mg 2mL :0.5A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day5<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day5<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A) :0.4A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1.00mg / 4mL * :200mg Day1 | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃SOX(100)+Pembrolizumab    | 1        | 20       | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :100mg/m <sup>2</sup> Day1<br>デキストラン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当) :1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1.00mg / 4mL * :200mg Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃SOX[130]+Pembrolizumab    | 1        | 20       | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :130mg/m <sup>2</sup> Day1<br>デキストラン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当) :1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1.00mg / 4mL * :200mg Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃CapeOX(100)+Pembrolizumab | 1        | 20       | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :100mg/m <sup>2</sup> Day1<br>デキストラン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当) :1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1.00mg / 4mL * :200mg Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃CapeOX[130]+Pembrolizumab | 1        | 20       | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :130mg/m <sup>2</sup> Day1<br>デキストラン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当) :1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1.00mg / 4mL * :200mg Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/2. 胃癌 |

| レジメン名                                 | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種           |
|---------------------------------------|----------|----------|---|-------------------|
| mFOLFOX6+Zolbetuximab (末梢 入院用)【初回】    | 2        | 12       | ブドウ糖注射液 5% 250ml : 1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) : 200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) : 85mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50ml : 1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」(オーダ用) : 400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>(GE-ツカ)ソルチム3A輸液 1L : 1袋 Day1 Day2<br>フルオウラシル注「トロー」(オーダ用) : 1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2<br>大塚生食注 50ml : 1瓶 Day1 Day2<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本 : 1筒 Day1<br>大塚生食注 100ml : 1瓶 Day1<br>(ロクク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネ-カ」10mL : 1筒 Day2<br>アロカリス点滴静注 235mg : 1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1<br>テーサート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>テーサート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当): 2A Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml : 1A Day1<br>生理食塩液「バグフソ」1L : 1袋 Day1<br>大塚蒸留水 100ml : 1瓶 Day1<br>ビロイ点滴静注用 100mg : 800mg/m <sup>2</sup> Day1    | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| mFOLFOX6+Zolbetuximab (末梢 入院用)【2回目以降】 | 2        | 12       | ブドウ糖注射液 5% 250ml : 1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) : 200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) : 85mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50ml : 1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」(オーダ用) : 400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>(GE-ツカ)ソルチム3A輸液 1L : 1袋 Day1 Day2<br>フルオウラシル注「トロー」(オーダ用) : 1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2<br>大塚生食注 50ml : 1瓶 Day1 Day2<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本 : 1筒 Day1<br>大塚生食注 100ml : 1瓶 Day1<br>(ロクク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネ-カ」10mL : 1筒 Day2<br>アロカリス点滴静注 235mg : 1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1<br>テーサート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>テーサート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当): 2A Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml : 1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 500ml : 1袋 Day1<br>大塚蒸留水 100ml : 1瓶 Day1<br>ビロイ点滴静注用 100mg : 400mg/m <sup>2</sup> Day1 | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| mFOLFOX6+Zolbetuximab (ポンプ入院用)【初回】    | 1        | 13       | ブドウ糖注射液 5% 250ml : 1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) : 200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) : 85mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50ml : 1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」(オーダ用) : 400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 100ml : 1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」(オーダ用) : 2400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>(ロクク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネ-カ」10mL : 1筒 Day1<br>大塚生食注 50ml : 1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本 : 1筒 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg : 1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1<br>テーサート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>テーサート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当): 2A Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml : 1A Day1<br>生理食塩液「バグフソ」1L : 1袋 Day1<br>大塚蒸留水 100ml : 1瓶 Day1<br>ビロイ点滴静注用 100mg : 800mg/m <sup>2</sup> Day1   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| mFOLFOX6+Zolbetuximab (ポンプ入院用)【2回目以降】 | 1        | 13       | ブドウ糖注射液 5% 250ml : 1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) : 200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) : 85mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50ml : 1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」(オーダ用) : 400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 100ml : 1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」(オーダ用) : 2400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>(ロクク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネ-カ」10mL : 1筒 Day1<br>大塚生食注 50ml : 1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本 : 1筒 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg : 1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1<br>テーサート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>テーサート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当): 2A Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml : 1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 500ml : 1袋 Day1<br>大塚蒸留水 100ml : 1瓶 Day1<br>ビロイ点滴静注用 100mg : 400mg/m <sup>2</sup> Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| mFOLFOX6+Zolbetuximab (外来用)【初回】       | 1        | 13       | ブドウ糖注射液 5% 250ml : 1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) : 200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) : 85mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50ml : 1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」(オーダ用) : 400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 100ml : 1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」(オーダ用) : 2400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>プリンベラン注射液 10mg 2ml : 1A Day1<br>(ロクク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネ-カ」10mL : 1筒 Day1<br>大塚生食注 50ml : 1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本 : 1筒 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg : 1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1<br>テーサート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>テーサート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当): 2A Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml : 1A Day1<br>生理食塩液「バグフソ」1L : 1袋 Day1<br>大塚蒸留水 100ml : 1瓶 Day1<br>ビロイ点滴静注用 100mg : 800mg/m <sup>2</sup> Day1                   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |

| レジメン名                              | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種           |
|------------------------------------|----------|----------|--|-------------------|
| mFOLFOX6+Zolbetuximab (外来用)【2回目以降】 | 1        | 13       | ドド糖注射液 5% 2.5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :85mg/m Day1<br>ドド糖注射液 5% 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオロウラシル注「トーフ」(オーダ用) :400mg/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオロウラシル注「トーフ」(オーダ用) :2400mg/m Day1<br>プリンペラン注射液 1 0 m g 2 m l :1A Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ティチト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1<br>ヒロイ点滴静注用 1 0 0 m g :400m g /m Day1 | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| CapeOX+Zolbetuximab (入院用)【初回】      | 1        | 20       | ドド糖注射液 5% 2.5 0 m l :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :130mg/m Day1<br>ティチト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1<br>ヒロイ点滴静注用 1 0 0 m g :800m g /m Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| CapeOX+Zolbetuximab (入院用)【2回目以降】   | 1        | 20       | ドド糖注射液 5% 2.5 0 m l :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :130mg/m Day1<br>ティチト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1<br>ヒロイ点滴静注用 1 0 0 m g :600m g /m Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| CapeOX+Zolbetuximab (外来用)【初回】      | 1        | 20       | ドド糖注射液 5% 2.5 0 m l :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :130mg/m Day1<br>ティチト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>プリンペラン注射液 1 0 m g 2 m l :1A Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1<br>ヒロイ点滴静注用 1 0 0 m g :800m g /m Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| CapeOX+Zolbetuximab (外来用)【2回目以降】   | 1        | 20       | ドド糖注射液 5% 2.5 0 m l :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :130mg/m Day1<br>ティチト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>プリンペラン注射液 1 0 m g 2 m l :1A Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1<br>ヒロイ点滴静注用 1 0 0 m g :600m g /m Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃癌RAM単剤 (bi-weekly)                | 1        | 13       | 大塚生食注ソフトパック 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃癌RAM+PTX (初回)                     | 15       | 13       | 大塚生食注ソフトパック 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1 Day15<br>クラニセトロン点滴静注「パック」3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day8 Day15<br>ティチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ティチト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>ファモチジン静注液20mg「ザワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g /m Day1 Day8 Day15<br>ティチト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1 Day8 Day15  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |

| レジメ名                           | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種           |
|--------------------------------|----------|----------|--|-------------------|
| 胃RAM+ PTX (2回以降)               | 15       | 13       | 大塚生食注ソフトバッグ 2.50m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1 Day15<br>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg / 1.00m l [HK]:1袋 Day1 Day8 Day15<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):1A Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾓｰｼﾞﾝ静注液20mg [ｻﾞｲﾝ] (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ﾎﾟﾗｰﾐﾝ注 5mg 1m l :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 50m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾊﾞﾘｰﾀﾞｷｾﾙ注 1.00mg / 1.67m l [NK]:80mg / m l Day1 Day8 Day15<br>(ﾛｯｸ用) ﾍﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 10mL:1筒 Day1 Day8 Day15<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 1.0m l / 本:1筒 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 1.00m l :1瓶 Day1 Day8 Day15  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃RAM+ PTX (初回) (bi-weekly)     | 1        | 13       | 大塚生食注ソフトバッグ 2.50m l :1袋 Day1<br>サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg / 1.00m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):1A Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾓｰｼﾞﾝ静注液20mg [ｻﾞｲﾝ] (20mL/A) :1A Day1<br>ﾎﾟﾗｰﾐﾝ注 5mg 1m l :1A Day1<br>大塚生食注 50m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞﾘｰﾀﾞｷｾﾙ注 1.00mg / 1.67m l [NK]:80mg / m l Day1<br>(ﾛｯｸ用) ﾍﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1.00m l :1瓶 Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 1.0m l / 本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃RAM+ PTX (2回以降) (bi-weekly)   | 1        | 13       | 大塚生食注ソフトバッグ 2.50m l :1袋 Day1<br>サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg / 1.00m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾓｰｼﾞﾝ静注液20mg [ｻﾞｲﾝ] (20mL/A) :1A Day1<br>ﾎﾟﾗｰﾐﾝ注 5mg 1m l :1A Day1<br>大塚生食注 50m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞﾘｰﾀﾞｷｾﾙ注 1.00mg / 1.67m l [NK]:80mg / m l Day1<br>(ﾛｯｸ用) ﾍﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 10mL:1筒 Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 1.0m l / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1.00m l :1瓶 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃RAM+ [nab]PTX                 | 15       | 13       | グラニセロン点滴静注バッグ 3mg / 1.00m l [HK]:1袋 Day15 Day8<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day15 Day8<br>ﾎﾟﾗｰﾐﾝ注 5mg 1m l :1A Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50m l :1袋 Day15<br>サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day15<br>大塚生食注 50m l :1瓶 Day15 Day8<br>大塚生食注 1.00m l :1瓶 Day15 Day8<br>ﾌﾞﾗｰｷﾞﾝ点滴静注用 1.00mg :100mg / m l Day15 Day8<br>(ﾛｯｸ用) ﾍﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 10mL:1筒 Day1 Day8 Day15<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 1.0m l / 本:1筒 Day1 Day8 Day15  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃RAM+ [nab]PTX (bi-weekly)     | 1        | 13       | 大塚生食注ソフトバッグ 2.50m l :1袋 Day1<br>サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg / 1.00m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾎﾟﾗｰﾐﾝ注 5mg 1m l :1A Day1<br>大塚生食注 50m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1.00m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰｷﾞﾝ点滴静注用 1.00mg :100mg / m l Day1<br>(ﾛｯｸ用) ﾍﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 10mL:1筒 Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 1.0m l / 本:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃RAM+ IRI                      | 1        | 13       | 大塚生食注ソフトバッグ 2.50m l :1袋 Day1<br>サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg / 1.00m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ﾌﾟﾛｶﾞﾘｽ点滴静注 2.35mg :1瓶 Day1<br>ｲﾘﾝﾃﾞﾝ酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg / m l Day1<br>大塚生食注 50m l :1瓶 Day1<br>(ﾛｯｸ用) ﾍﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 10mL:1筒 Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 1.0m l / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1.00m l :1瓶 Day1   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃NEC シスプラチン・ｲﾘﾝﾃﾞﾝ             | 15       | 13       | 大塚生食注 1.00m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾟﾛｶﾞﾘｽ点滴静注 2.35mg :1瓶 Day1<br>ｲｲｵ/ｾﾄﾞﾛﾝ静注0.75mg/5mL [ﾀｲﾎﾞ] :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>生理食塩液 [ﾋﾞｶﾘ] 500m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>ｲﾘﾝﾃﾞﾝ酸塩点滴静注液(オーダ用):60mg / m l Day1 Day8 Day15<br>(GE-ﾌﾞﾗﾝ) ﾖﾙﾃﾞﾑ 3A 輸液 500m l :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1mEq / m l :0.4A Day1<br>ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300m l :300mL Day1<br>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注 [ﾏﾙｺ] (オーダ用) :60mg / m l Day1<br>ﾖﾙﾃﾞﾑ 3A 輸液 200m l :1袋 Day1<br>大塚生食注 50m l :1瓶 Day8 Day15<br>(ﾛｯｸ用) ﾍﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 10mL:1筒 Day1 Day8 Day15<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 1.0m l / 本:1筒 Day1 Day8 Day15            | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 胃NEC シスプラチン・ｲﾄﾞﾎﾞﾄﾞ療法          | 3        | 18       | 大塚生食注 50m l :1瓶 Day2 Day3 Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day2 Day3 Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day2 Day3 Day1<br>生理食塩液 [ﾋﾞｶﾘ] 500m l :1袋 Day2 Day3 Day1<br>ｲﾄﾞﾎﾞﾄﾞ点滴静注液 1.00mg [ｻﾞｲﾝ] 5m l :100mg / m l Day2 Day3 Day1<br>ﾖﾙﾃﾞﾑ 3A 輸液 200m l :1袋 Day2 Day3 Day1<br>大塚生食注 1.00m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>ﾌﾟﾛｶﾞﾘｽ点滴静注 2.35mg :1瓶 Day1<br>ｲｲｵ/ｾﾄﾞﾛﾝ静注0.75mg/5mL [ﾀｲﾎﾞ] :1瓶 Day1<br>(GE-ﾌﾞﾗﾝ) ﾖﾙﾃﾞﾑ 3A 輸液 500m l :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1mEq / m l :0.4A Day1<br>ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300m l :300mL Day1<br>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注 [ﾏﾙｺ] (オーダ用) :80mg / m l Day1<br>(ﾛｯｸ用) ﾍﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 10mL:1筒 Day1 Day2 Day3<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 1.0m l / 本:1筒 Day1 | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 2018-0004胃癌E7389 リボソーム製剤 前投薬2種 | 1        | 18       | 大塚生食注ソフトバッグ 2.50m l :1袋 Day1<br>治)E7389 1mg/5mL :2.3mg / m l Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg / 1.00m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾓｰｼﾞﾝ静注液20mg [ｻﾞｲﾝ] (20mL/A) :1A Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注 50m l :1瓶 Day1<br>(ﾛｯｸ用) ﾍﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 10mL:1筒 Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ [ﾈｰｶ] 1.0m l / 本:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |



| レジメン名   | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種           |
|---|----------|----------|--|-------------------|
| 2018-0004胃 (治) Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ*     | 1        | 0        | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)E7389Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ*<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>F*チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-ツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オ-ツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ファミチン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 2020-0013食道胃癌E7389 Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ* | 1        | 18       | 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)E7389Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ*<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ファミチン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-ツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オ-ツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>治)ONO-4538注(100mg/10mL)[20200013]:360mg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| FLOT療法 (術前、4コース) [臨床試験]   | 2        | 12       | グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>F*チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):3A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>トキサケル点静注「ニプロ」 (オ-ダ用) :50mg/m Day1<br>オキサリプラチン点滴静注 (オ-ダ用) :85mg/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>シホリナート点滴静注用 (オ-ダ用) :200mg/m Day1<br>生理食塩液バッグ「フソ」 1 L :1袋 Day1<br>フルオロラシル注「ト-ウ」 (オ-ダ用) :2600mg/m Day1<br>生食注シリンジ「オ-ツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day2 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-ツカ」10mL:1筒 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 治) HLX22/ア*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ*         | 1        | 20       | F*チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オ-ダ用) :130m g / m Day1<br>F*チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)HLX又はア*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ* 500mg/10mL[20240019]:15mg/kg Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-ツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オ-ツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>治)ト*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ* 150mg[20240019]:8mg/kg Day1<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 治) HLX22/ア*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ*         | 1        | 20       | F*チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オ-ダ用) :130m g / m Day1<br>F*チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)HLX又はア*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ* 500mg/10mL[20240019]:15mg/kg Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-ツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オ-ツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>治)ト*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ* 150mg[20240019]:6mg/kg Day1<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 治) HLX22/ア*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ*         | 1        | 20       | ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>F*チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オ-ダ用) :130m g / m Day1<br>F*チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)HLX又はア*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ* 500mg/10mL[20240019]:15mg/kg Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-ツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オ-ツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>治)ト*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ* 100mg[20240019]:200mg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>治)ト*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ* 150mg[20240019]:8mg/kg Day1 | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |
| 治) HLX22/ア*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ*         | 1        | 20       | ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>F*チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オ-ダ用) :130m g / m Day1<br>F*チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)HLX又はア*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ* 500mg/10mL[20240019]:15mg/kg Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-ツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オ-ツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>治)ト*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ* 100mg[20240019]:200mg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>治)ト*Ⅱ*Ⅲ*Ⅳ*Ⅴ*Ⅵ*Ⅶ*Ⅷ*Ⅸ*Ⅹ*Ⅺ*Ⅻ*Ⅼ*Ⅽ*Ⅾ*Ⅿ*ⅰ*ⅱ*ⅲ*ⅴ*ⅵ*ⅶ*ⅷ*ⅸ*ⅹ*ⅺ*ⅻ*ⅼ*ⅽ*ⅾ*ⅿ*ⅿ* 150mg[20240019]:6mg/kg Day1 | 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌 |

| レジメ名            | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種            |
|-----------------|----------|----------|---|--------------------|
| FOLFOXIRI (入院)  | 2        | 12       | (GE-ツク)ソルデム3 A 輸液 1 L : 1袋 Day2 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダ用) :1600mg/g/m Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セト静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>フ「サ」ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>イリノチカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):165m g/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>オキザリブチン点滴静注「ホスピー」 (オーダ用) :85m g/m Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200m g/m Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day2  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFOXIRI (ポンプ) | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セト静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>フ「サ」ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>イリノチカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):165m g/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>オキザリブチン点滴静注「ホスピー」 (オーダ用) :85m g/m Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200m g/m Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダ用) :3200m g/m Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| mFOLFOX6 (入院)   | 2        | 12       | (GE-ツク)ソルデム3 A 輸液 1 L : 1袋 Day2 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダ用) :1200m g/m Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>グラニセロン点滴静注「フック」3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1<br>フ「サ」ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200m g/m Day1<br>オキザリブチン点滴静注「ホスピー」 (オーダ用) :85m g/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダ用) :400m g/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day2                                | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| mFOLFOX6 (ポンプ)  | 1        | 13       | グラニセロン点滴静注「フック」3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1<br>フ「サ」ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200m g/m Day1<br>オキザリブチン点滴静注「ホスピー」 (オーダ用) :85m g/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダ用) :400m g/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダ用) :2400m g/m Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFIRI (入院)    | 2        | 12       | (GE-ツク)ソルデム3 A 輸液 1 L : 1袋 Day2 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダ用) :1200m g/m Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200m g/m Day1<br>グラニセロン点滴静注「フック」3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>フ「サ」ト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダ用) :400m g/m Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>イリノチカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150m g/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day2 | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFIRI (ポンプ)   | 1        | 13       | グラニセロン点滴静注「フック」3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>フ「サ」ト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200m g/m Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>イリノチカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150m g/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダ用) :400m g/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダ用) :2400m g/m Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| mFL (入院)        | 2        | 12       | (GE-ツク)ソルデム3 A 輸液 1 L : 1袋 Day2 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダ用) :1200m g/m Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2<br>グラニセロン点滴静注「フック」3 m g / 1 0 0 m L「HK」:1袋 Day1<br>フ「サ」ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200m g/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダ用) :400m g/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day2   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名              | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種            |
|--------------------|----------|----------|---|--------------------|
| mFL (ポンプ)          | 1        | 13       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｰ糖注射液 5% 2 5 0 mL :1瓶 Day1<br>ｼﾎﾞﾘｰﾅｰﾄ点滴静注用 (オーダ用) :200mg /mi Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｰ糖注射液 5% 5 0 mL :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :400mg /g/mi Day1<br>大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :2400mg /g/mi Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾌﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| RPMI               | 15       | 13       | ﾌﾞﾄﾞｰ糖注射液 5% 2 5 0 mL :1瓶 Day8 Day1 Day15<br>ｼﾎﾞﾘｰﾅｰﾄ点滴静注用 (オーダ用) :250mg /mi Day8 Day1 Day15<br>ﾌﾞﾄﾞｰ糖注射液 5% 5 0 mL :1瓶 Day8 Day1 Day15<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :500mg /g/mi Day8 Day1 Day15<br>大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day8 Day1 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1 Day8 Day15<br>(ﾛｯｸ用)へﾌﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| イリノカン              | 1        | 13       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 mL :1袋 Day1<br>イリノカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg /g/mi Day1<br>大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾌﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CapeOX             | 1        | 20       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ｾﾞﾗﾐﾝ注 5 mg 1 mL :1A Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｰ糖注射液 5% 2 5 0 mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :130mg /g/mi Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾌﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| XELIRI療法           | 1        | 20       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 mL :1袋 Day1<br>イリノカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):200mg /g/mi Day1<br>大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾌﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| IRIS               | 15       | 12       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1 Day15<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):3A Day1 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 mL :1袋 Day1 Day15<br>イリノカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):100mg /g/mi Day1 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1 Day15<br>大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day1 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1 Day15<br>(ﾛｯｸ用)へﾌﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1 Day15  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| SOX                | 1        | 20       | グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ｾﾞﾗﾐﾝ注 5 mg 1 mL :1A Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｰ糖注射液 5% 2 5 0 mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :130mg /g/mi Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾌﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFOXIRI+BV (入院)  | 2        | 12       | (GE-ｸﾞﾗ)ｼﾞﾙﾃﾑ 3 A 輸液 1 L :1袋 Day2 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :1600mg /g/mi Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day2 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1<br>ﾈﾞﾛ/ｾﾄﾞｰ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞ」:1瓶 Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾏﾞ/ｽﾁﾝ点滴静注用 (オーダ用) :5mg /kg Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 mL :1袋 Day1<br>イリノカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):165mg /g/mi Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｰ糖注射液 5% 2 5 0 mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :85mg /g/mi Day1<br>ｼﾎﾞﾘｰﾅｰﾄ点滴静注用 (オーダ用) :200mg /g/mi Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾌﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day2 | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFOXIRI+BV (ポンプ) | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 mL :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1<br>ﾈﾞﾛ/ｾﾄﾞｰ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞ」:1瓶 Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 mL :1袋 Day1<br>イリノカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):165mg /g/mi Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｰ糖注射液 5% 2 5 0 mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :85mg /g/mi Day1<br>ｼﾎﾞﾘｰﾅｰﾄ点滴静注用 (オーダ用) :200mg /g/mi Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :3200mg /g/mi Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾌﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｶ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 mL :1瓶 Day1<br>ﾏﾞ/ｽﾁﾝ点滴静注用 (オーダ用) :5mg /kg Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名             | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種            |
|-------------------|----------|----------|--|--------------------|
| mFOLFOX6+BV (入院)  | 2        | 12       | グラネセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ｾﾞﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アｽﾁﾅﾝ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :5mg/kg Day1<br>ｾﾞﾞﾄﾞ糖注射液 5% 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｾﾞﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :200mg/g/ｍ Day1<br>ｵｷﾞﾗﾌﾞﾗﾁﾝ点滴静注「ﾎｽﾋﾞｰﾗ」 (ｵｰﾀﾞ用) :85mg/g/ｍ Day1<br>ｾﾞﾞﾄﾞ糖注射液 5% 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾙｵﾜﾗﾝ注「ﾄｰﾄﾞ」 (ｵｰﾀﾞ用) :400mg/g/ｍ Day1<br>(GE-ｸﾞ)ﾉﾙﾃﾞﾑ3 A輸液 1 L :1袋 Day1 Day2<br>ﾌﾙｵﾜﾗﾝ注「ﾄｰﾄﾞ」 (ｵｰﾀﾞ用) :1200mg/g/ｍ Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>生食注ｼﾝｼﾞ「ｵｰｯｶ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾝｼﾞ「ｵｰｯ」10mL:1筒 Day2                              | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| mFOLFOX6+BV (ポンプ) | 1        | 13       | グラネセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ｾﾞﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アｽﾁﾅﾝ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :5mg/kg Day1<br>ｾﾞﾞﾄﾞ糖注射液 5% 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｾﾞﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :200mg/g/ｍ Day1<br>ｵｷﾞﾗﾌﾞﾗﾁﾝ点滴静注「ﾎｽﾋﾞｰﾗ」 (ｵｰﾀﾞ用) :85mg/g/ｍ Day1<br>ｾﾞﾞﾄﾞ糖注射液 5% 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾙｵﾜﾗﾝ注「ﾄｰﾄﾞ」 (ｵｰﾀﾞ用) :400mg/g/ｍ Day1<br>ﾌﾙｵﾜﾗﾝ注「ﾄｰﾄﾞ」 (ｵｰﾀﾞ用) :2400mg/g/ｍ Day1<br>生食注ｼﾝｼﾞ「ｵｰｯｶ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾝｼﾞ「ｵｰｯ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFIRI+BV (入院)   | 2        | 12       | (GE-ｸﾞ)ﾉﾙﾃﾞﾑ3 A輸液 1 L :1袋 Day2 Day1<br>ﾌﾙｵﾜﾗﾝ注「ﾄｰﾄﾞ」 (ｵｰﾀﾞ用) :1200mg/g/ｍ Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>グラネセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>ｱﾛｶﾘｽ点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アｽﾁﾅﾝ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :5mg/kg Day1<br>ｾﾞﾞﾄﾞ糖注射液 5% 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｾﾞﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :200mg/g/ｍ Day1<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ｲﾘﾉﾃﾞｶﾝ塩酸塩点滴静注液(ｵｰﾀﾞ用):150mg/g/ｍ Day1<br>ｾﾞﾞﾄﾞ糖注射液 5% 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾙｵﾜﾗﾝ注「ﾄｰﾄﾞ」 (ｵｰﾀﾞ用) :400mg/g/ｍ Day1<br>生食注ｼﾝｼﾞ「ｵｰｯｶ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾝｼﾞ「ｵｰｯ」10mL:1筒 Day2 | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFIRI+BV (ポンプ)  | 1        | 13       | グラネセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>ｱﾛｶﾘｽ点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アｽﾁﾅﾝ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :5mg/kg Day1<br>ｾﾞﾞﾄﾞ糖注射液 5% 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｾﾞﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :200mg/g/ｍ Day1<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ｲﾘﾉﾃﾞｶﾝ塩酸塩点滴静注液(ｵｰﾀﾞ用):150mg/g/ｍ Day1<br>ｾﾞﾞﾄﾞ糖注射液 5% 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾙｵﾜﾗﾝ注「ﾄｰﾄﾞ」 (ｵｰﾀﾞ用) :400mg/g/ｍ Day1<br>ﾌﾙｵﾜﾗﾝ注「ﾄｰﾄﾞ」 (ｵｰﾀﾞ用) :2400mg/g/ｍ Day1<br>生食注ｼﾝｼﾞ「ｵｰｯｶ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾝｼﾞ「ｵｰｯ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| IRI+BV療法          | 1        | 13       | グラネセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>ｱﾛｶﾘｽ点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1<br>ｼﾞｰｷﾞｰﾄ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アｽﾁﾅﾝ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :5mg/kg Day1<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ｲﾘﾉﾃﾞｶﾝ塩酸塩点滴静注液(ｵｰﾀﾞ用):150mg/g/ｍ Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾝｼﾞ「ｵｰｯ」10mL:1筒 Day1<br>生食注ｼﾝｼﾞ「ｵｰｯｶ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| sLV5FU2+BV (入院)   | 2        | 12       | (GE-ｸﾞ)ﾉﾙﾃﾞﾑ3 A輸液 1 L :1袋 Day2 Day1<br>ﾌﾙｵﾜﾗﾝ注「ﾄｰﾄﾞ」 (ｵｰﾀﾞ用) :1200mg/g/ｍ Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2<br>グラネセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アｽﾁﾅﾝ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :5mg/kg Day1<br>ｾﾞﾞﾄﾞ糖注射液 5% 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｾﾞﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :200mg/g/ｍ Day1<br>ｾﾞﾞﾄﾞ糖注射液 5% 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾙｵﾜﾗﾝ注「ﾄｰﾄﾞ」 (ｵｰﾀﾞ用) :400mg/g/ｍ Day1<br>生食注ｼﾝｼﾞ「ｵｰｯｶ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾝｼﾞ「ｵｰｯ」10mL:1筒 Day2  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| sLV5FU2+BV (ポンプ)  | 1        | 13       | グラネセロン点滴静注/バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アｽﾁﾅﾝ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :5mg/kg Day1<br>ｾﾞﾞﾄﾞ糖注射液 5% 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｾﾞﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (ｵｰﾀﾞ用) :200mg/g/ｍ Day1<br>ｾﾞﾞﾄﾞ糖注射液 5% 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾙｵﾜﾗﾝ注「ﾄｰﾄﾞ」 (ｵｰﾀﾞ用) :400mg/g/ｍ Day1<br>ﾌﾙｵﾜﾗﾝ注「ﾄｰﾄﾞ」 (ｵｰﾀﾞ用) :2400mg/g/ｍ Day1<br>生食注ｼﾝｼﾞ「ｵｰｯｶ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾝｼﾞ「ｵｰｯ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名                       | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種            |
|-----------------------------|----------|----------|--|--------------------|
| LV5FU2+BV (入院)              | 2        | 12       | ブドウ糖注射液 5% 250ml : 1瓶 Day2 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :100mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50ml : 1瓶 Day2 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1<br>(GE-ツリ)ソルチム3 A 輸液 1L :1袋 Day2 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :600mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day2<br>クラニセトロン点滴静注「ツグ」3mg/100ml「HK」:1袋 Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>アバスタン点滴静注用 (オーダ用) :5mg/kg Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day2   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| RPMI + BV [6週投与、2週休業]       | 8        | 6        | ブドウ糖注射液 5% 250ml : 1瓶 Day8 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :250mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50ml : 1瓶 Day8 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :500mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day8 Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8<br>アバスタン点滴静注用 (オーダ用) :5mg/kg Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1 Day8   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| RPMI + BV [3週投与、1週休業]       | 15       | 13       | ブドウ糖注射液 5% 250ml : 1瓶 Day8 Day1 Day15<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :250mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5% 50ml : 1瓶 Day8 Day1 Day15<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :500mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day8 Day1 Day15<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アバスタン点滴静注用 (オーダ用) :5mg/kg Day1 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CAPOXIRI + BEV (QUATRO-II)  | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ジ-チ-ト注射液6.6mg (リ-酸塩8mg相当) :1V Day1<br>アバスタン点滴静注用 (オーダ用) :7.5mg/kg Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day1<br>イリリチン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250ml : 1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オーダ用) :130mg/m <sup>2</sup> Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CapeOX + BV                 | 1        | 20       | クラニセトロン点滴静注「ツグ」3mg/100ml「HK」:1袋 Day1<br>ジ-チ-ト注射液6.6mg (リ-酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1ml :1A Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>アバスタン点滴静注用 (オーダ用) :7.5mg/kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250ml : 1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オーダ用) :130mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ジ-チ-ト注射液1.65mg(リ-酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| XELIRI + BV療法               | 1        | 20       | クラニセトロン点滴静注「ツグ」3mg/100ml「HK」:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1<br>ジ-チ-ト注射液1.65mg(リ-酸塩2mg相当):3A Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>アバスタン点滴静注用 (オーダ用) :7.5mg/kg Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day1<br>イリリチン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| Cape + B V                  | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>アバスタン点滴静注用 (オーダ用) :7.5mg/kg Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| ロンサーフ (TAS102) + B V療法      | 15       | 13       | 大塚生食注 50ml :1瓶 Day15<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day15<br>アバスタン点滴静注用 (オーダ用) :5mg/kg Day15<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day15  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| SOX + BV                    | 1        | 20       | クラニセトロン点滴静注「ツグ」3mg/100ml「HK」:1袋 Day1<br>ジ-チ-ト注射液6.6mg (リ-酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1ml :1A Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>アバスタン点滴静注用 (オーダ用) :7.5mg/kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250ml : 1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オーダ用) :130mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ジ-チ-ト注射液1.65mg(リ-酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFIRI (IRI180) +Ram (ポンプ) | 1        | 13       | ブドウ糖注射液 5% 250ml : 1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>クラニセトロン点滴静注「ツグ」3mg/100ml「HK」:1袋 Day1<br>ジ-チ-ト注射液1.65mg(リ-酸塩2mg相当):3A Day1<br>ポラミン注 5mg 1ml :1A Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50ml : 1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 100ml :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダ用) :2400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day1<br>イリリチン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):180mg/m <sup>2</sup> Day1<br>サイラム点点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1<br>大塚生食注 50ml :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1 | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名                      | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種            |
|----------------------------|----------|----------|---|--------------------|
| FOLFIRI + Ram (入院)         | 2        | 12       | (GE-ツカ)ソルデム3 A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1<br>フルオロウラル注「トロー」 (オダ用):1200mg/g/mi Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オダ用):200mg/g/mi Day1<br>クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾍﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ポラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオロウラル注「トロー」 (オダ用):400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>イリリチン塩酸塩点滴静注液(オダ用):150m g/mi Day1<br>サイラムザ点滴静注液 (オダ用):8mg/kg Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)へリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day2 | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFIRI + Ram (ポンプ)        | 1        | 13       | ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オダ用):200mg/g/mi Day1<br>クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾍﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ポラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオロウラル注「トロー」 (オダ用):400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオロウラル注「トロー」 (オダ用):2400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>イリリチン塩酸塩点滴静注液(オダ用):150m g/mi Day1<br>サイラムザ点滴静注液 (オダ用):8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)へリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| IRI180 + Ram               | 1        | 13       | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾍﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ポラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>イリリチン塩酸塩点滴静注液(オダ用):180m g/mi Day1<br>サイラムザ点滴静注液 (オダ用):8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)へリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| IRI150 + Ram               | 1        | 13       | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾍﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ポラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>イリリチン塩酸塩点滴静注液(オダ用):150m g/mi Day1<br>サイラムザ点滴静注液 (オダ用):8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)へリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFIRI + Afibercept (入院)  | 2        | 12       | (GE-ツカ)ソルデム3 A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1<br>フルオロウラル注「トロー」 (オダ用):1200mg/g/mi Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オダ用):200mg/g/mi Day1<br>クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ﾍﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオロウラル注「トロー」 (オダ用):400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>イリリチン塩酸塩点滴静注液(オダ用):150m g/mi Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ガルトラップ点滴静注 (オダ用) *:4mg/kg Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)へリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day2                             | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFIRI + Afibercept (ポンプ) | 1        | 13       | ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オダ用):200mg/g/mi Day1<br>クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ﾍﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ﾘﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオロウラル注「トロー」 (オダ用):400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオロウラル注「トロー」 (オダ用):2400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>イリリチン塩酸塩点滴静注液(オダ用):150m g/mi Day1<br>ガルトラップ点滴静注 (オダ用) *:4mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)へリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| Cma b (1クール目)              | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾍﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当):1V Day1<br>ポラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>アピタックス注射液 (オダ用):400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)へリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| Cma b (2クール目以降)            | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾍﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ﾘﾝ酸塩8mg相当):1V Day1<br>ポラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>アピタックス注射液 (オダ用):250m g/mi Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)へリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名                        | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種              |
|------------------------------|----------|----------|--|----------------------|
| FOLFIRI+Cmab (入院) (1クール目)    | 8        | 6        | グラネセトン点滴静注/バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1<br>ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ｾﾞﾗﾗﾐﾝ注 5 mg 1 ml :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 ml :1袋 Day1 Day8<br>アｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液 (オーダー用) :400mg /m Day1<br>ｳﾞﾄﾞｰ糖注射液 5 % 2 5 0 ml :1瓶 Day1<br>ｾﾞﾍﾞﾛﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (オーダー用) :200mg /m Day1<br>ｲﾝﾄﾞﾈｰｼﾞﾝ塩酸塩点静注液(オーダー用):150mg /m Day1<br>ｳﾞﾄﾞｰ糖注射液 5 % 5 0 ml :1瓶 Day1<br>ｳﾞﾙｵｰﾗﾗｼﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダー用) :400mg /m Day1<br>(GE-ｼﾞﾝｸﾞ)ｼﾞﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day2<br>ｳﾞﾙｵｰﾗﾗｼﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダー用) :1200mg /m Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 ml :1瓶 Day2 Day8 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 ml :1瓶 Day8 Day1<br>アｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液 (オーダー用) :250mg /m Day8<br>生食注ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ「オーツｶ」 1 0 mL /本:1筒 Day1 Day8<br>(ﾛｯｸ用)へﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ「オーツｶ」10mL:1筒 Day2 | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFIRI+Cmab (入院) (2クール目以降)  | 8        | 6        | グラネセトン点滴静注/バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1<br>ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ｾﾞﾗﾗﾐﾝ注 5 mg 1 ml :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 ml :1袋 Day1 Day8<br>アｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液 (オーダー用) :250mg /m Day1 Day8<br>ｳﾞﾄﾞｰ糖注射液 5 % 2 5 0 ml :1瓶 Day1<br>ｾﾞﾍﾞﾛﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (オーダー用) :200mg /m Day1<br>ｲﾝﾄﾞﾈｰｼﾞﾝ塩酸塩点静注液(オーダー用):150mg /m Day1<br>ｳﾞﾄﾞｰ糖注射液 5 % 5 0 ml :1瓶 Day1<br>ｳﾞﾙｵｰﾗﾗｼﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダー用) :400mg /m Day1<br>(GE-ｼﾞﾝｸﾞ)ｼﾞﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day2<br>ｳﾞﾙｵｰﾗﾗｼﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダー用) :1200mg /m Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 ml :1瓶 Day2 Day8 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 ml :1瓶 Day8 Day1<br>生食注ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ「オーツｶ」 1 0 mL /本:1筒 Day1 Day8<br>(ﾛｯｸ用)へﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ「オーツｶ」10mL:1筒 Day8 Day2                             | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFIRI+Cmab (ポンプ) (1クール目)   | 8        | 6        | グラネセトン点滴静注/バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1<br>ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ｾﾞﾗﾗﾐﾝ注 5 mg 1 ml :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 ml :1袋 Day1 Day8<br>アｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液 (オーダー用) :400mg /m Day1<br>ｳﾞﾄﾞｰ糖注射液 5 % 2 5 0 ml :1瓶 Day1<br>ｾﾞﾍﾞﾛﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (オーダー用) :200mg /m Day1<br>ｲﾝﾄﾞﾈｰｼﾞﾝ塩酸塩点静注液(オーダー用):150mg /m Day1<br>ｳﾞﾄﾞｰ糖注射液 5 % 5 0 ml :1瓶 Day1<br>ｳﾞﾙｵｰﾗﾗｼﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダー用) :400mg /m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 ml :1瓶 Day8 Day1<br>アｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液 (オーダー用) :250mg /m Day8<br>(ﾛｯｸ用)へﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ「オーツｶ」10mL:1筒 Day8 Day1<br>ｳﾞﾙｵｰﾗﾗｼﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダー用) :2400mg /m Day1<br>生食注ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ「オーツｶ」 1 0 mL /本:1筒 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 ml :1瓶 Day8 Day1   | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFIRI+Cmab (ポンプ) (2クール目以降) | 8        | 6        | グラネセトン点滴静注/バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 mg :1瓶 Day1<br>ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ｾﾞﾗﾗﾐﾝ注 5 mg 1 ml :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 ml :1袋 Day1 Day8<br>アｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液 (オーダー用) :250mg /m Day1 Day8<br>ｳﾞﾄﾞｰ糖注射液 5 % 2 5 0 ml :1瓶 Day1<br>ｾﾞﾍﾞﾛﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (オーダー用) :200mg /m Day1<br>ｲﾝﾄﾞﾈｰｼﾞﾝ塩酸塩点静注液(オーダー用):150mg /m Day1<br>ｳﾞﾄﾞｰ糖注射液 5 % 5 0 ml :1瓶 Day1<br>ｳﾞﾙｵｰﾗﾗｼﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダー用) :400mg /m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 ml :1瓶 Day8 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ「オーツｶ」10mL:1筒 Day8 Day1<br>ｳﾞﾙｵｰﾗﾗｼﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダー用) :2400mg /m Day1<br>生食注ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ「オーツｶ」 1 0 mL /本:1筒 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 ml :1瓶 Day8 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| mFOLFOX6+Cmab (入院) (1クール目)   | 8        | 6        | グラネセトン点滴静注/バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ｾﾞﾗﾗﾐﾝ注 5 mg 1 ml :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 ml :1袋 Day1 Day8<br>アｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液 (オーダー用) :400mg /m Day1<br>ｳﾞﾄﾞｰ糖注射液 5 % 2 5 0 ml :1瓶 Day1<br>ｾﾞﾍﾞﾛﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (オーダー用) :200mg /m Day1<br>ｵｷﾞｻﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾎｽﾋﾞｰﾌﾞ」 (オーダー用) :85mg /m Day1<br>ｳﾞﾄﾞｰ糖注射液 5 % 5 0 ml :1瓶 Day1<br>ｳﾞﾙｵｰﾗﾗｼﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダー用) :400mg /m Day1<br>(GE-ｼﾞﾝｸﾞ)ｼﾞﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day2<br>ｳﾞﾙｵｰﾗﾗｼﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダー用) :1200mg /m Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 ml :1瓶 Day2 Day8 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 ml :1瓶 Day8 Day1<br>アｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液 (オーダー用) :250mg /m Day8<br>生食注ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ「オーツｶ」 1 0 mL /本:1筒 Day1 Day8<br>(ﾛｯｸ用)へﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ「オーツｶ」10mL:1筒 Day8 Day2                   | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| mFOLFOX6+Cmab (入院) (2クール目以降) | 8        | 6        | グラネセトン点滴静注/バッグ 3mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ｾﾞﾗﾗﾐﾝ注 5 mg 1 ml :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 ml :1袋 Day1 Day8<br>アｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液 (オーダー用) :250mg /m Day1 Day8<br>ｳﾞﾄﾞｰ糖注射液 5 % 2 5 0 ml :1瓶 Day1<br>ｾﾞﾍﾞﾛﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (オーダー用) :200mg /m Day1<br>ｵｷﾞｻﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾎｽﾋﾞｰﾌﾞ」 (オーダー用) :85mg /m Day1<br>ｳﾞﾄﾞｰ糖注射液 5 % 5 0 ml :1瓶 Day1<br>ｳﾞﾙｵｰﾗﾗｼﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダー用) :400mg /m Day1<br>(GE-ｼﾞﾝｸﾞ)ｼﾞﾙﾃﾞﾑ 3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day2<br>ｳﾞﾙｵｰﾗﾗｼﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダー用) :1200mg /m Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 ml :1瓶 Day2 Day8 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 ml :1瓶 Day8 Day1<br>生食注ｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ「オーツｶ」 1 0 mL /本:1筒 Day1 Day8<br>(ﾛｯｸ用)へﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾞﾝｸﾞｰﾄﾞ「オーツｶ」10mL:1筒 Day2 Day8  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名                         | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種              |
|-------------------------------|----------|----------|---|----------------------|
| mFOLFOX6+Cmab (ポンプ) (1クール目)   | 8        | 6        | グラネセロン点滴静注パック 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>ティート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 Day8<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :400mg / mL Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg / mL Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用) :85mg / mL Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダー用) :400mg / mL Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day8 Day1<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :250mg / mL Day8<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day8 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダー用) :2400mg / mL Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1 Day8<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day8 Day1 | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| mFOLFOX6+Cmab (ポンプ) (2クール目以降) | 8        | 6        | グラネセロン点滴静注パック 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>ティート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 Day8<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :250mg / mL Day1 Day8<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg / mL Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用) :85mg / mL Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダー用) :400mg / mL Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day8 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day8 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day8 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダー用) :2400mg / mL Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| sLV5FU2+Cmab (入院) (1クール目)     | 8        | 6        | 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 Day8<br>ティート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 Day8<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :400mg / mL Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg / mL Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダー用) :400mg / mL Day1<br>(GE-ツカ)ソルデム3 A 輸液 1L :1袋 Day1 Day2<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダー用) :1200mg / mL Day1 Day2<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day8<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :250mg / mL Day8<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1 Day8<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day8 Day2   | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| sLV5FU2+Cmab (入院) (2クール目以降)   | 8        | 6        | 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 Day8<br>ティート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 Day8<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :250mg / mL Day1 Day8<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg / mL Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダー用) :400mg / mL Day1<br>(GE-ツカ)ソルデム3 A 輸液 1L :1袋 Day1 Day2<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダー用) :1200mg / mL Day1 Day2<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day8<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1 Day8<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day8 Day2   | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| sLV5FU2+Cmab (ポンプ) (1クール目)    | 8        | 6        | 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 Day8<br>ティート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 Day8<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :400mg / mL Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg / mL Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダー用) :400mg / mL Day1<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :250mg / mL Day8<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day8 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day8 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダー用) :2400mg / mL Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| sLV5FU2+Cmab (ポンプ) (2クール目以降)  | 8        | 6        | 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 Day8<br>ティート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 Day8<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :250mg / mL Day1 Day8<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg / mL Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダー用) :400mg / mL Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day8 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day8 Day1<br>フルオウラシル注「トロー」 (オーダー用) :2400mg / mL Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| IRI+Cmab (1クール目)              | 8        | 6        | グラネセロン点滴静注パック 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1<br>ティート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ポラミン注 5mg 1mL :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 Day8<br>(リ)メタン塩酸塩点滴静注(オーダー用):150mg / mL Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day8<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :400mg / mL Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day8 Day1<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :250mg / mL Day8<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1 Day8<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1 Day8  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |



| レジメン名                         | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種              |
|-------------------------------|----------|----------|--|----------------------|
| IRI+Cmab (2クール目以降)            | 8        | 6        | グラニセトロン点滴静注パツグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトパツグ 250mL :1袋 Day1 Day8<br>イリリチン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150mg/g/mi Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day8<br>アーピタックス注射液 (オーダー用) :250mg/g/mi Day1 Day8<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day8 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8<br>生食注シリンジ「オツカ」 1.0mL /本:1筒 Day1 Day8   | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| Biweekly Cmab                 | 1        | 13       | 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注ソフトパツグ 250mL :1袋 Day1<br>アーピタックス注射液 (オーダー用) :500mg/g/mi Day1<br>生食注シリンジ「オツカ」 1.0mL /本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| Biweekly FOLFIRI+Cmab (入院)    | 2        | 12       | グラニセトロン点滴静注パツグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>大塚生食注ソフトパツグ 250mL :1袋 Day1<br>アーピタックス注射液 (オーダー用) :500mg/g/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/g/mi Day1<br>イリリチン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150mg/g/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トーワ」 (オーダー用) :400mg/g/mi Day1<br>(GE-ツカ)ソルチム3 A輸液 1L :1袋 Day1 Day2<br>フルオウラル注「トーワ」 (オーダー用) :1200mg/g/mi Day1 Day2<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day1<br>生食注シリンジ「オツカ」 1.0mL /本:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2 | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| Biweekly FOLFIRI+Cmab (ポンプ)   | 1        | 13       | グラニセトロン点滴静注パツグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>大塚生食注ソフトパツグ 250mL :1袋 Day1<br>アーピタックス注射液 (オーダー用) :500mg/g/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/g/mi Day1<br>イリリチン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150mg/g/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トーワ」 (オーダー用) :400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トーワ」 (オーダー用) :2400mg/g/mi Day1<br>生食注シリンジ「オツカ」 1.0mL /本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| Biweekly mFOLFLOX6+Cmab (入院)  | 2        | 12       | グラニセトロン点滴静注パツグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>大塚生食注ソフトパツグ 250mL :1袋 Day1<br>アーピタックス注射液 (オーダー用) :500mg/g/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/g/mi Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用) :85mg/g/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トーワ」 (オーダー用) :400mg/g/mi Day1<br>(GE-ツカ)ソルチム3 A輸液 1L :1袋 Day1 Day2<br>フルオウラル注「トーワ」 (オーダー用) :1200mg/g/mi Day1 Day2<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day1<br>生食注シリンジ「オツカ」 1.0mL /本:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2                      | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| Biweekly mFOLFLOX6+Cmab (ポンプ) | 1        | 13       | グラニセトロン点滴静注パツグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>大塚生食注ソフトパツグ 250mL :1袋 Day1<br>アーピタックス注射液 (オーダー用) :500mg/g/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/g/mi Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用) :85mg/g/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トーワ」 (オーダー用) :400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トーワ」 (オーダー用) :2400mg/g/mi Day1<br>生食注シリンジ「オツカ」 1.0mL /本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1   | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| Pma b                         | 1        | 13       | 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>ティマト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>ベクテビックス点滴静注 (オーダー用) :6mg/kg Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オツカ」 1.0mL /本:1筒 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名              | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種            |
|--------------------|----------|----------|--|--------------------|
| FOLFIRI+Pmab (入院)  | 2        | 12       | (GE-ツカ)ソルデム3 A 輸液 1 L :1袋 Day2 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用) :1200mg/g/m Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/g/m Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用) :400mg/g/m Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ｲﾘﾉﾃﾞｶﾝ塩酸塩点滴静注(オーダー用):150m g/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ベクテビックス点滴静注 (オーダー用) :6m g/kg Day1<br>(ロック用)へリンNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｯ」10mL:1筒 Day2<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1 | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| FOLFIRI+Pmab (ホソ)  | 1        | 13       | ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/g/m Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用) :400mg/g/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用) :2400mg/g/m Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ｲﾘﾉﾃﾞｶﾝ塩酸塩点滴静注(オーダー用):150m g/m Day1<br>ベクテビックス点滴静注 (オーダー用) :6m g/kg Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)へリンNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｯ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| IRI+Pmab           | 1        | 13       | グラニセロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):3A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ｲﾘﾉﾃﾞｶﾝ塩酸塩点滴静注(オーダー用):150m g/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ベクテビックス点滴静注 (オーダー用) :6m g/kg Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)へリンNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｯ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| mFOLFOX6+Pmab (入院) | 2        | 12       | (GE-ツカ)ソルデム3 A 輸液 1 L :1袋 Day2 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用) :1200mg/g/m Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ベクテビックス点滴静注 (オーダー用) :6m g/kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/g/m Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オーダー用) :85m g/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用) :400mg/g/m Day1<br>(ロック用)へリンNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｯ」10mL:1筒 Day2<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1                               | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| mFOLFOX6+Pmab (ホソ) | 1        | 13       | グラニセロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ベクテビックス点滴静注 (オーダー用) :6m g/kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/g/m Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オーダー用) :85m g/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用) :400mg/g/m Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用) :2400mg/g/m Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)へリンNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｯ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| sLV5FU2+Pmab (入院)  | 2        | 12       | (GE-ツカ)ソルデム3 A 輸液 1 L :1袋 Day2 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用) :1200mg/g/m Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2<br>グラニセロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ベクテビックス点滴静注 (オーダー用) :6m g/kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/g/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用) :400mg/g/m Day1<br>(ロック用)へリンNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｯ」10mL:1筒 Day2<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| sLV5FU2+Pmab (ホソ)  | 1        | 13       | ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/g/m Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用) :400mg/g/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用) :2400mg/g/m Day1<br>ベクテビックス点滴静注 (オーダー用) :6m g/kg Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)へリンNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｯ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| BRAF阻害剤 初回         | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ポラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ﾃﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ注注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :400mg/g/m Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)へリンNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰｯ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名  | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種            |
|--|----------|----------|--|--------------------|
| BRAF阻害剤 2回目以降                                  | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>7-チト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :250m g/mi Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| BRAF阻害剤 2回目以降【2週毎】                             | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>7-チト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :500m g/mi Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| HER2陽性大腸癌 Tmab+Per 初回                          | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :840m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調整用) :1瓶 Day1<br>ハーセチン注射液 (オーダー用) :8m g/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| HER2陽性大腸癌 Tmab+Per 2回目以降                       | 1        | 20       | 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調整用) :1瓶 Day1<br>ハーセチン注射液 (オーダー用) :6m g/kg Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| MSI-H ニボルマブ・イビリムマブ併用療法                         | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :5m g Day1<br>オブジーホ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m l :240m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :0.4瓶 Day1<br>ヤーボイ点滴静注液 (オーダー用) *:1mg/kg Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| MSI-H (Nivo+Ipi 5ヶ月以降) ニボルマブ q4w               | 1        | 27       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>オブジーホ点滴静注 (オーダー用) :480mg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| MSI-H (Nivo+Ipi 5ヶ月以降) ニボルマブ q2w               | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>オブジーホ点滴静注 (オーダー用) :240mg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| MSI-H ヘムプロシズマブ (q3W)                           | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| JCOG 1502C CapexOx                             | 1        | 20       | クラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>7-チト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>[JCOG1502C]エルプラト(100mg/20mL):130mg/mi Day1<br>7-チト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2024-0013 Orig AMI-2751「タラ」+mFFX6 (入院)C1D1,8   | 8        | 6        | (GE-カ)ソルチム3 A輸液 1 L :1袋 Day2 Day1<br>フルオウラル注「トーワ」 (オーダー用) :1200m g/mi Day2 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>クラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>7-チト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :3V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g/mi Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オーダー用) :85m g/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トーワ」 (オーダー用) :400m g/mi Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day2<br>治)NJ-61186372(160mg/mL)[20240013]:2240mg Day1 Day8                               | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2024-0013OrigAMI2751「タラ」+mFFX6 (ホッア) C1D15,D22 | 8        | 6        | クラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>7-チト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>7-チト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200m g/mi Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オーダー用) :85m g/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トーワ」 (オーダー用) :400m g/mi Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トーワ」 (オーダー用) :2400m g/mi Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>治)NJ-61186372(160mg/mL)[20240013]:2240mg Day1 Day8<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>(ロック用)生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1 | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名                                      | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種            |
|--|----------|----------|---|--------------------|
| 2024-0013 OrigAMI-2「FOLFIRI」+mFXX6（※） C2以降 | 1        | 13       | グラニセロン点滴静注「フグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>ティート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ティート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボリナート点滴静注用 (オダ用) :200mg/g/mi Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オダ用) :85mg/g/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トール」 (オダ用) :400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トール」 (オダ用) :2400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>治)NJ-61186372(160mg/mL)[20240013]:2240mg Day1<br>(ロク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1<br>(ロク用)生食注シリンジ「オーツカ」10mL/本:1筒 Day1     | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2023-0016標準治療群 (CapeOX) A Z U R -2試験       | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注「フグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>ティート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>治)IL7 点滴静注100mg/20mL[20230016]:130mg/mi Day1<br>ティート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>(ロク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2024-0010-HLX10-015-CRC301試験 8サイクルまで       | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注「フグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>ティート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>アバチン点滴静注用 (オダ用) :7.5mg/kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オダ用) :130mg/g/mi Day1<br>ティート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>(ロク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>治)Serplulimab/「オツカ」 10mL[20240010]:300mg Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2024-0010-HLX10-015-CRC301試験 9サイクル以降       | 1        | 20       | 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>アバチン点滴静注用 (オダ用) :7.5mg/kg Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>(ロク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>治)Serplulimab/「オツカ」 10mL[20240010]:300mg Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2024-0013 OrigAMI-2治)「FOLFIRI」+mFXX6 (入院)  | 2        | 12       | グラニセロン点滴静注「フグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>ティート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>大塚生食注ソフト「フグ」 250mL :1袋 Day1<br>治)Cetuximab(5mg/mL)[20240013]:500mg/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボリナート点滴静注用 (オダ用) :200mg/g/mi Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オダ用) :85mg/g/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トール」 (オダ用) :400mg/g/mi Day1<br>(GE-ツカ)ソルデム3A輸液 1L :1袋 Day1 Day2<br>フルオウラル注「トール」 (オダ用) :1200mg/g/mi Day1 Day2<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>(ロク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2 | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2024-0013 OrigAMI-2「ツキシマ」 (C1D15以降)        | 1        | 13       | グラニセロン点滴静注「フグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>ティート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>大塚生食注ソフト「フグ」 250mL :1袋 Day1<br>治)Cetuximab(5mg/mL)[20240013]:500mg/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボリナート点滴静注用 (オダ用) :200mg/g/mi Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オダ用) :85mg/g/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トール」 (オダ用) :400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トール」 (オダ用) :2400mg/g/mi Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>(ロク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| [2023-0025]B群FOLFIRI+Bmb (※)               | 1        | 13       | ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボリナート点滴静注用 (オダ用) :200mg/g/mi Day1<br>グラニセロン点滴静注「フグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>ティート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トール」 (オダ用) :400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トール」 (オダ用) :2400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注ソフト「フグ」 250mL :1袋 Day1<br>イリリタン塩酸塩点滴静注(オダ用):180mg/g/mi Day1<br>治)「オツカ」 25mg/mL 16mL[20230025]:5mg/kg Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>(ロク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| [2023-0025]A群FOLFIRI+Pmb (※)               | 1        | 13       | ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>レボリナート点滴静注用 (オダ用) :200mg/g/mi Day1<br>グラニセロン点滴静注「フグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>ティート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トール」 (オダ用) :400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>フルオウラル注「トール」 (オダ用) :2400mg/g/mi Day1<br>大塚生食注ソフト「フグ」 250mL :1袋 Day1<br>イリリタン塩酸塩点滴静注(オダ用):180mg/g/mi Day1<br>治)「オツカ」(AMG954)20mg/mL[20230025]:6mg/kg Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>(ロク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名                             | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種            |
|-----------------------------------|----------|----------|---|--------------------|
| MK3475-177                        | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>治験) MK3475(100mg/4mL):200mg Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ドック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CA2098HW A群 1~2サイクル               | 29       | 13       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(ドック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>治)Nivolumab(10mg/mL)[20190013]:240mg Day1 Day15 Day29   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CA2098HW A群 3サイクル以降               | 1        | 27       | (ドック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>治)Nivolumab(10mg/mL)[20190013]:480mg Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CA2098HW B群 1~2サイクル               | 22       | 20       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1 Day22<br>(ドック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 Day22<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day22<br>治)Nivolumab(10mg/mL)[20190013]:240mg Day1 Day22<br>大塚生食注 5 0 m l : 0.4瓶 Day1 Day22<br>治)Ipilimumab(5mg/mL)[20190013]:1mg/kg Day1 Day22<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day22   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CA2098HW B群 3サイクル以降               | 1        | 27       | (ドック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>治)Nivolumab(10mg/mL)[20190013]:480mg Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CA2098HW C群:mFOLFIRI+Bmab 1~2サイクル | 29       | 13       | (ドック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 Day15 Day29<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1 Day15 Day29<br>グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day15 Day29<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>アサチド注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day15 Day29<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>治)Bevacizumab(25mg/mL)[20190013]:5mg/kg Day1 Day15 Day29<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>治)Folic Acid(50mg/mL)[20190013]:400mg/mi Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 Day15 Day29<br>治)Irinotecan HCl (20mg/mL) [20190013]:180mg/mi Day1 Day15 Day29<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>治)5-Fluorouracil(50mg/mL)[20190013]:400mg/mi Day1 Day15 Day29<br>治)5-Fluorouracil(50mg/mL)[20190013]:2400mg/mi Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day29 | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CA2098HW C群:mFOLFIRI+Bmab 3サイクル以降 | 15       | 13       | (ドック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1 Day15<br>グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1瓶 Day1 Day15<br>アサチド注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day15<br>治)Bevacizumab(25mg/mL)[20190013]:5mg/kg Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15<br>治)Folic Acid(50mg/mL)[20190013]:400mg/mi Day1 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 Day15<br>治)Irinotecan HCl (20mg/mL) [20190013]:180mg/mi Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15<br>治)5-Fluorouracil(50mg/mL)[20190013]:400mg/mi Day1 Day15<br>治)5-Fluorouracil(50mg/mL)[20190013]:2400mg/mi Day1 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CA2098HW C群:mFOLFOX6+Bmab 1~2サイクル | 29       | 13       | (ドック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 Day15 Day29<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1 Day15 Day29<br>グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day15 Day29<br>アサチド注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day15 Day29<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day29 Day15<br>治)Bevacizumab(25mg/mL)[20190013]:5mg/kg Day1 Day15 Day29<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>治)Folic Acid(50mg/mL)[20190013]:400mg/mi Day1 Day15 Day29<br>治)Oxaliplatin(5mg/mL)[20190013]:85mg/mi Day1 Day15 Day29<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>治)5-Fluorouracil(50mg/mL)[20190013]:400mg/mi Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day29<br>治)5-Fluorouracil(50mg/mL)[20190013]:2400mg/mi Day1 Day29 Day15  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CA2098HW C群:mFOLFOX6+Bmab 3サイクル以降 | 15       | 13       | (ドック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1 Day15<br>グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day15<br>アサチド注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1A Day1 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day15<br>治)Bevacizumab(25mg/mL)[20190013]:5mg/kg Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15<br>治)Folic Acid(50mg/mL)[20190013]:400mg/mi Day1 Day15<br>治)Oxaliplatin(5mg/mL)[20190013]:85mg/mi Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15<br>治)5-Fluorouracil(50mg/mL)[20190013]:400mg/mi Day1 Day15<br>治)5-Fluorouracil(50mg/mL)[20190013]:2400mg/mi Day1 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CA2098HW 加イリ-群 1~2C ニホ化           | 1        | 13       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>治)Nivolumab(10mg/mL)[20190013]:240mg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 0.4瓶 Day1<br>治)Ipilimumab(5mg/mL)[20190013]:1mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>(ドック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CA2098HW 加イリ-群 1~2C nivo単独        | 1        | 13       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>治)Nivolumab(10mg/mL)[20190013]:240mg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>(ドック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CA2098HW 加イリ-群 3C以降 ニホ化           | 1        | 13       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>治)Nivolumab(10mg/mL)[20190013]:480mg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 0.4瓶 Day1<br>治)Ipilimumab(5mg/mL)[20190013]:1mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>(ドック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名                                  | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種            |
|--|----------|----------|---|--------------------|
| CA2098HW 加メ-ル-群 3C以降 nivo単独            | 1        | 13       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>治)Nivolumab(10mg/mL)[20190013]:480mg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-物」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| CA2098HW 加メ-ル-群 3C以降 ipi単独             | 1        | 13       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 0.4瓶 Day1<br>治)Ipilimumab(5mg/mL)[20190013]:1mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-物」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| ONO-4578-02試験                          | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-物」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>テ-サ-ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 m l : 1A Day1<br>アバチン点滴静注用 (オ-ダ用) :7.5mg / kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー-」 (オ-ダ用) :130m g / m l Day1<br>テ-サ-ト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>治)ONO-4538注(240mg/24mL)[20200022]:360mg Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| [2020-0022]ONO-4578-02試験mFOLFOX6群Day1  | 1        | 13       | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>テ-サ-ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 m l : 1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>アバチン点滴静注用 (オ-ダ用) :5m g / kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オ-ダ用) :200m g / m l Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー-」 (オ-ダ用) :85m g / m l Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「ト-」 (オ-ダ用) :400m g / m l Day1<br>フルオウラシル注「ト-」 (オ-ダ用) :2400m g / m l Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-物」10mL:1筒 Day1<br>治)ONO-4538注(240mg/24mL)[20200022]:480mg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| [2020-0022]ONO-4578-02試験mFOLFOX6群Day15 | 1        | 13       | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1<br>テ-サ-ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 m l : 1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1<br>アバチン点滴静注用 (オ-ダ用) :5m g / kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オ-ダ用) :200m g / m l Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー-」 (オ-ダ用) :85m g / m l Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「ト-」 (オ-ダ用) :400m g / m l Day1<br>フルオウラシル注「ト-」 (オ-ダ用) :2400m g / m l Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-物」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0004 ONO 7913 Bmba 1C             | 22       | 6        | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day1 Day15<br>テ-サ-ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15<br>ボラミン注 5 mg 1 m l : 1A Day1 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day15 Day8 Day22<br>アバチン点滴静注用 (オ-ダ用) :5m g / kg Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15<br>レボホリナート点滴静注用 (オ-ダ用) :200m g / m l Day1 Day15<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー-」 (オ-ダ用) :85m g / m l Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15<br>フルオウラシル注「ト-」 (オ-ダ用) :400m g / m l Day1 Day15<br>フルオウラシル注「ト-」 (オ-ダ用) :2400m g / m l Day1 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-物」10mL:1筒 Day1 Day8 Day22 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l : 1瓶 Day1 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day15 Day22 Day8<br>治)ONO-7913注200mg[20210004]:30mg/kg Day15 Day22 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1<br>治)ONO-7913注200mg[20210004]:1mg/kg Day1<br>治)ONO-4538注240mg/24mL[20210004]:480mg Day1 | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0004 ONO 7913 Bmba 1C②            | 22       | 6        | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 mg / 1 0 0 mL [HK]:1袋 Day2 Day16<br>テ-サ-ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day2 Day16<br>ボラミン注 5 mg 1 m l : 1A Day2 Day16<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1瓶 Day2 Day1 Day16 Day8 Day15 Day22<br>アバチン点滴静注用 (オ-ダ用) :5m g / kg Day2 Day16<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1瓶 Day2 Day16<br>レボホリナート点滴静注用 (オ-ダ用) :200m g / m l Day2 Day16<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピー-」 (オ-ダ用) :85m g / m l Day2 Day16<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l : 1瓶 Day2 Day16<br>フルオウラシル注「ト-」 (オ-ダ用) :400m g / m l Day2 Day16<br>フルオウラシル注「ト-」 (オ-ダ用) :2400m g / m l Day2 Day16<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 mL / 本:1筒 Day2 Day1 Day8 Day15 Day16 Day22<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-物」10mL:1筒 Day2 Day1 Day8 Day15 Day22 Day16<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L : 1袋 Day15 Day22 Day8<br>治)ONO-7913注200mg[20210004]:30mg/kg Day15 Day22 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1<br>治)ONO-7913注200mg[20210004]:1mg/kg Day1<br>治)ONO-4538注240mg/24mL[20210004]:480mg Day1 | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名                         | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種              |
|-------------------------------|----------|----------|---|----------------------|
| 2021-0004 ONO 7913 Bmab 2C以降  | 15       | 13       | グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.0mL [HK]:1袋 Day1 Day15<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 Day15<br>大塚生食注 1.0 0mL :1瓶 Day1 Day15<br>アバスタン点滴静注用 (オーダー用) :5mg/kg Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0mL :1瓶 Day1 Day15<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5% 5.0 m l :1瓶 Day1 Day15<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :400mg/g/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :2400mg/g/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1 Day15<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1 Day15<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day1 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.0 0 m l :1袋 Day1 Day15<br>治)ONO-7913注200mg[20210004]:30mg/kg Day1 Day15<br>治)ONO-4538注240mg/24mL[20210004]:480mg Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0004 ONO 7913 Bmab 2C以降② | 16       | 12       | 大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day2 Day16<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1 Day2 Day15 Day16<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1 Day15 Day2 Day16<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.0 0 m l :1袋 Day1 Day15<br>治)ONO-7913注200mg[20210004]:30mg/kg Day1 Day15<br>治)ONO-4538注240mg/24mL[20210004]:480mg Day1<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.0 m l [HK]:1袋 Day2 Day16<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day2 Day16<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day2 Day16<br>アバスタン点滴静注用 (オーダー用) :5mg/kg Day2 Day16<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 m l :1瓶 Day2 Day16<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day16<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用) :85mg/m <sup>2</sup> Day2 Day16<br>ブドウ糖注射液 5% 5.0 m l :1瓶 Day2 Day16<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :400mg/g/m <sup>2</sup> Day2 Day16<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :2400mg/g/m <sup>2</sup> Day2 Day16   | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0004 ONO 7913 Cmba 1C    | 22       | 6        | グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.0 m l [HK]:1袋 Day1 Day15<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.5 0 m l :1袋 Day1 Day15<br>アーピタックス注射液 (オーダー用) :500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 m l :1瓶 Day1 Day15<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5% 5.0 m l :1瓶 Day1 Day15<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :400mg/g/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :2400mg/g/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day15<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day1 Day15<br>治)ONO-7913注200mg[20210004]:1mg/kg Day1<br>治)ONO-4538注240mg/24mL[20210004]:480mg Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.0 0 m l :1袋 Day8 Day15 Day22<br>治)ONO-7913注200mg[20210004]:30mg/kg Day8 Day15 Day22 | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0004 ONO 7913 Cmba 1C②   | 22       | 6        | 大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day16<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1 Day2 Day8 Day15 Day16 Day22<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day16<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.5 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day16<br>治)ONO-7913注200mg[20210004]:1mg/kg Day1<br>治)ONO-4538注240mg/24mL[20210004]:480mg Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.0 0 m l :1袋 Day8 Day15 Day22<br>治)ONO-7913注200mg[20210004]:30mg/kg Day8 Day15 Day22<br>グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.0 m l [HK]:1袋 Day2 Day16<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day2 Day16<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day2 Day16<br>アーピタックス注射液 (オーダー用) :500mg/m <sup>2</sup> Day2 Day16<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 m l :1瓶 Day2 Day16<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day16<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用) :85mg/m <sup>2</sup> Day2 Day16<br>ブドウ糖注射液 5% 5.0 m l :1瓶 Day2 Day16<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :400mg/g/m <sup>2</sup> Day2 Day16<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :2400mg/g/m <sup>2</sup> Day2 Day16           | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0004 ONO 7913 Cmba 2C以降  | 15       | 13       | グラニセトロン点滴静注/バッグ 3mg / 1.0 m l [HK]:1袋 Day1 Day15<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day15<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.5 0 m l :1袋 Day1 Day15<br>アーピタックス注射液 (オーダー用) :500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 m l :1瓶 Day1 Day15<br>レボホリナート点滴静注用 (オーダー用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5% 5.0 m l :1瓶 Day1 Day15<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :400mg/g/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>大塚生食注 1.0 0 m l :1瓶 Day1 Day15<br>フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用) :2400mg/g/m <sup>2</sup> Day1 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1 Day15<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネツカ」10mL:1筒 Day1 Day15<br>大塚生食注 5.0 m l :1瓶 Day1 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.0 0 m l :1袋 Day1 Day15<br>治)ONO-7913注200mg[20210004]:30mg/kg Day1 Day15<br>治)ONO-4538注240mg/24mL[20210004]:480mg Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名                                       | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種            |
|---|----------|----------|--|--------------------|
| 2021-0004 ONO 7913 Cmbab 2C以降②              | 16       | 12       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day2 Day16<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1 Day2 Day15 Day16<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 Day15 Day2 Day16<br>生理食塩液「ヒカ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day15<br>治)ONO-7913注200mg[20210004]:30mg/kg Day1 Day15<br>治)ONO-4538注240mg/24mL[20210004]:480mg Day1<br>グラニセロン点滴静注「ツグ」3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day2 Day16<br>デキストラン注6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day2 Day16<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day2 Day16<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day16<br>アービタックス注射液 (オーダー用) :500mg/m Day2 Day16<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day2 Day16<br>シボリナート点滴静注 (オーダー用) :200mg/m Day2 Day16<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用) :85mg/m Day2 Day16<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day2 Day16<br>フルオロウラシル注「トール」 (オーダー用) :400mg/m Day2 Day16<br>フルオロウラシル注「トール」 (オーダー用) :2400mg/m Day2 Day16 | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0006 BREAKWATER治療 A群 (Cmbab単剤)         | 1        | 6        | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>デキストラン注6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)Cetuximab(500mg/100mL)[20210006]:500mg/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0006 BREAKWATER B群 : mFOLFOX+Bmab療法)   | 1        | 13       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>グラニセロン点滴静注「ツグ」3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>治)Bevacizumab(400mg/16mL)[20210006]:5mg/kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>治)レキソトキチン注射液100mg [20210006] :200mg/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)Oxaliplatin(100mg/20mL)[20210006]:85mg/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>治)Fluorouracil(1000mg/20mL)[20210006]:400mg/m Day1<br>治)Fluorouracil(1000mg/20mL)[20210006]:2400mg/m Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0006 BREAKWATER B群 : mFOLFOX+Cmbab+療法) | 1        | 13       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>グラニセロン点滴静注「ツグ」3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)Cetuximab(500mg/100mL)[20210006]:500mg/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>治)レキソトキチン注射液100mg [20210006] :200mg/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)Oxaliplatin(100mg/20mL)[20210006]:85mg/m Day1<br>治)Fluorouracil(1000mg/20mL)[20210006]:400mg/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>治)Fluorouracil(1000mg/20mL)[20210006]:2400mg/m Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0006 BREAKWATER 対照群 : FOLFOXIRI+Bev療法) | 1        | 13       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキストラン注6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>プラスコボロミン臭化物注20mg「カタリ」:1管 Day1<br>治)Bevacizumab(400mg/16mL)[20210006]:5mg/kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>治)レキソトキチン注射液100mg [20210006] :200mg/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)Oxaliplatin(100mg/20mL)[20210006]:85mg/m Day1<br>治)Fluorouracil(1000mg/20mL)[20210006]:2400mg/m Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)Irinotecan(300mg/15mL)[20210006]:165mg/m Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0006 BREAKWATER D群 : FOLFIRI+Cmbab療法)  | 1        | 13       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>デキストラン注6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>グラニセロン点滴静注「ツグ」3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)Cetuximab(500mg/100mL)[20210006]:500mg/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>治)レキソトキチン注射液100mg [20210006] :200mg/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>治)Fluorouracil(1000mg/20mL)[20210006]:2400mg/m Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>治)Irinotecan(300mg/15mL)[20210006]:180mg/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>治)Fluorouracil(1000mg/20mL)[20210006]:400mg/m Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0006 BREAKWATER E群 : FOLFIRI+Bev療法)    | 1        | 13       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m l /本:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>グラニセロン点滴静注「ツグ」3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>デキストラン注1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>治)Bevacizumab(400mg/16mL)[20210006]:5mg/kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>治)レキソトキチン注射液100mg [20210006] :200mg/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>治)Fluorouracil(1000mg/20mL)[20210006]:400mg/m Day1<br>治)Fluorouracil(1000mg/20mL)[20210006]:2400mg/m Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)Irinotecan(300mg/15mL)[20210006]:180mg/m Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌 |



| レジメン名  | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種              |
|--|----------|----------|--|----------------------|
| 2021-0006 BREAKWATER 対照群：CAPOX+Bmab療法        | 1        | 20       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1.0 mL : 1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>グラニセロン点滴静注「バツグ」3 mg / 1.0 mL [HK]:1袋 Day1<br>テ「チ」ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 mL :1A Day1<br>治)Bevacizumab(400mg/16mL)[20210006]:7.5mg/kg Day1<br>大塚生食注 5.0 mL :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 mL :1袋 Day1<br>治)Oxaliplatin(100mg/20mL)[20210006]:130mg/mi Day1<br>テ「チ」ト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1   | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0010/ART-123. PN101                     | 1        | 13       | グラニセロン点滴静注「バツグ」3 mg / 1.0 mL [HK]:1袋 Day1<br>テ「チ」ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 mL :1A Day1<br>大塚生食注 1.0 mL :1瓶 Day1<br>ア「スチ」ン点滴静注用 (オ「グ」用) :5mg/kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 mL :1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オ「グ」用) :200mg/mi Day1<br>オキザリプラチン点滴静注「ホスピー」 (オ「グ」用) :85mg/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 5.0 mL :1瓶 Day1<br>フルオロウラシル注「ト「フ」」 (オ「グ」用) :400mg/mi Day1<br>フルオロウラシル注「ト「フ」」 (オ「グ」用) :2400mg/mi Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>治)ART-123(7.2mg)orPlacebo [20210010] :1箱 Day1<br>生食注 2.0 mL :1A Day1<br>生食注 2.0 mL :20mL Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2021-0011 A/B群：P m a b                       | 1        | 13       | 大塚生食注 1.0 mL :1瓶 Day1<br>テ「チ」ト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>治)「ニコル」 (AMG954)20mg/mL[20210011]:6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5.0 mL :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1   | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2022-0003 NEXUS試験 1クール                       | 1        | 6        | 大塚生食注 1.0 mL :1瓶 Day1<br>テ「チ」ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 mL :1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.0 0 mL :1袋 Day1<br>治)「ヒ」ツカ注射液100mg [20220003] :400mg/mi Day1<br>大塚生食注 5.0 mL :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2022-0003 NEXUS試験 2クール以降                     | 1        | 6        | 大塚生食注 1.0 mL :1瓶 Day1<br>テ「チ」ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 mL :1A Day1<br>大塚生食注ソフト「バツグ」 2.5 0 mL :1袋 Day1<br>治)「ヒ」ツカ注射液100mg [20220003] :250mg/mi Day1<br>大塚生食注 5.0 mL :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1   | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| [2022-0022]VOLTAGE-2:EPOC2201                | 1        | 13       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1.0 mL :1瓶 Day1<br>治)ONO-4538注 240mg/24mL[20220022]:240mg Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2022-0023 AZUR1試験                            | 1        | 20       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1.0 mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5.0 mL :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 mL :1A Day1<br>治)Dostarlimab50mg/mL[20220023]:500mg Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2023-0016 術前 Dostarlimab群 AZUR2試験            | 1        | 20       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1.0 mL :1瓶 Day1<br>治)Dostarlimab 50mg/mL[20230016]:500mg Day1<br>大塚生食注 5.0 mL :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| 2023-0016 術後 D o s t a r l i m a b 群 AZUR2試験 | 1        | 41       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注 1.0 mL :1瓶 Day1<br>治)Dostarlimab 50mg/mL[20230016]:1000mg Day1<br>大塚生食注 5.0 mL :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| [2023-0013]C1D1Tucatin+mFFX6+Trastuz (ポンプ)   | 1        | 13       | グラニセロン点滴静注「バツグ」3 mg / 1.0 mL [HK]:1袋 Day1<br>テ「チ」ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 mL :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 mL :1袋 Day1<br>治)OXALIPLATINE 5mg/mL[20230013]:85mg/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 mL :1瓶 Day1<br>治)ELVORINE 50mg/5ml [20230013] :200mg/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 5.0 mL :1瓶 Day1<br>治)FLUOROURACILE 50mg/mL[20230013]:400mg/mi Day1<br>大塚生食注 1.0 mL :1瓶 Day1<br>治)FLUOROURACILE 50mg/mL[20230013]:2400mg/mi Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注ソフト「バツグ」 2.5 0 mL :1袋 Day1<br>治)Trastuzumabum 150 mg[20230013]:8mg/kg Day1<br>大塚蒸留水 1.0 0 mL :1瓶 Day1 | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |
| [2023-0013]C2D1Tucatin+mFFX6+Trastuz (ポンプ)   | 1        | 13       | グラニセロン点滴静注「バツグ」3 mg / 1.0 mL [HK]:1袋 Day1<br>テ「チ」ト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 mL :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 mL :1袋 Day1<br>治)OXALIPLATINE 5mg/mL[20230013]:85mg/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 mL :1瓶 Day1<br>治)ELVORINE 50mg/5ml [20230013] :200mg/mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 5.0 mL :1瓶 Day1<br>治)FLUOROURACILE 50mg/mL[20230013]:400mg/mi Day1<br>大塚生食注 1.0 mL :1瓶 Day1<br>治)FLUOROURACILE 50mg/mL[20230013]:2400mg/mi Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注ソフト「バツグ」 2.5 0 mL :1袋 Day1<br>治)Trastuzumabum 150 mg[20230013]:6mg/kg Day1<br>大塚蒸留水 1.0 0 mL :1瓶 Day1 | 消化器内科 / 消化器外科/3. 大腸癌 |

| レジメン名                                      | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種             |
|--|----------|----------|--|---------------------|
| [2023-0013]D15D29Tuca+mFFX6+Tras (ポンプ)     | 1        | 13       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1袋 Day1<br>治)OXALIPLATINE 5mg/mL[20230013]:85mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>治)ELVORINE 50mg/5ml [20230013] :200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>治)FLUOROURACILE 50mg/mL[20230013]:400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>治)FLUOROURACILE 50mg/mL[20230013]:2400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌  |
| [2023-0013]D22Tucitini+mFFX6+Trastuz (ポンプ) | 1        | 13       | 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1<br>治)Trastuzumabum 150 mg[20230013]:6mg/kg Day1<br>大塚蒸留水 100mL :1瓶 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌  |
| [2023-0013]mFOLFOX6+BV (ポンプ)               | 1        | 13       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1袋 Day1<br>治)OXALIPLATINE 5mg/mL[20230013]:85mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>治)ELVORINE 50mg/5ml [20230013] :200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1<br>治)FLUOROURACILE 50mg/mL[20230013]:400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>治)FLUOROURACILE 50mg/mL[20230013]:2400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>治)Bevacizumabum 100mg/4ml[20230013]:5mg/kg Day1 | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌  |
| CAPOXIRI (アンサンプル試験)[臨床試験]                  | 1        | 20       | 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1<br>(リノチン塩酸塩点滴静注(オーダ用):150mg/g/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :130mg/m <sup>2</sup> Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌  |
| (肝癌) ヘムプロシマブ (q3W)                         | 1        | 20       | 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL * :200mg Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1   | 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌 |
| (肝細胞癌) New FP動注療法 (ポンプ)                    | 1        | 13       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3mg / 100mL [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>7-チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>リヒオドール 480注 10mL:1A Day1<br>動注用アイエーコール 100mg :1瓶 Day1<br>生食注 20mL :1A Day1<br>ヘリンN注 5000U 5mL :1A Day1<br>アルオロワラシル「トロー」(オーダ用) :1250mg Day1   | 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌 |
| (肝細胞癌) RAM単剤療法                             | 1        | 13       | 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1<br>サイラムザ点滴静注液(オーダ用) :8mg/kg Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1  | 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌 |
| (肝細胞癌) アテソリズマブ+ベバシズマブ                      | 1        | 20       | (ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1<br>テセントリク点滴静注 1200mg / 20mL * :1200mg Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>アスチン点滴静注液(オーダ用) :15mg/kg Day1   | 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌 |
| (肝細胞癌) デュル+トレ【>30kg】【11-1目】                | 1        | 27       | (ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1<br>イジド点滴静注液 300mg / 15mL * :300mg Day1<br>イミフンジ点滴静注 500mg / 10mL * :1500mg Day1   | 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌 |
| (肝細胞癌) デュル+トレ【>30kg】【21-1目以降】              | 1        | 27       | 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1<br>イミフンジ点滴静注 500mg / 10mL * :1500mg Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌 |
| (肝細胞癌) デュル+トレ【30kg以下】【11-1目】               | 1        | 27       | (ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 50mL :1瓶 Day1<br>大塚生食注 100mL :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1mL :1A Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 10mL / 本:1筒 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1<br>イジド点滴静注液(オーダ用) * :4mg/kg Day1<br>イミフンジ点滴静注(オーダ用) * :20mg/kg Day1   | 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌 |

| レジメン名                          | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種              |
|--------------------------------|----------|----------|--|----------------------|
| (肝細胞癌) デュル+トレ【30kg以下】【2-3日目以降】 | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1 筒 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>イミフンジ点滴静注 (オーダ用) * : 20mg/kg Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌  |
| (肝細胞癌) デュル単剤【> 30kg】           | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1 筒 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>イミフンジ点滴静注 5 0 0 m g / 1 0 m L * : 1500m g Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌  |
| (肝細胞癌) デュル単剤【30kg以下】           | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1 筒 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>イミフンジ点滴静注 (オーダ用) * : 20mg/kg Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌  |
| (膵・胆道癌) ヘムプロリスマブ (q3W)         | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1 筒 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1   | 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌 |
| (胆道癌) GCS療法                    | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>テラト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>テラト注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当) : 2A Day1<br>グムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 1000mg / ml Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>生理食塩液「フソ」 1 L : 1 袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) : 25m g / ml Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/ml ( 2 0 m L / A ) : 8ml Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1 筒 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌 |
| (胆道癌) GC療法                     | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8<br>テラト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day8<br>グムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 1000mg / ml Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 Day8<br>生理食塩液「フソ」 1 L : 1 袋 Day1 Day8<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) : 25m g / ml Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/ml ( 2 0 m L / A ) : 8ml Day1 Day8<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1 筒 Day1 Day8   | 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌 |
| (胆道癌) GS療法                     | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>テラト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day8<br>グムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 1000mg / ml Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1 筒 Day1 Day8  | 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌 |
| (胆道癌) GEM単剤療法                  | 15       | 13       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>テラト注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当) : 2A Day1 Day8 Day15<br>グムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 1000mg / ml Day1 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1 筒 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15   | 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌 |
| (胆道癌) GC+デュルバルマブ療法【8コースまで】     | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8<br>テラト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day8<br>グムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 1000mg / ml Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>生理食塩液「フソ」 1 L : 1 袋 Day1 Day8<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) : 25m g / ml Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 Day8<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/ml ( 2 0 m L / A ) : 8ml Day1 Day8<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1 筒 Day1 Day8<br>イミフンジ点滴静注 5 0 0 m g / 1 0 m L * : 1500m g Day1 | 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌 |
| (胆道癌) GC+デュルバルマブ療法【9コース目以降】    | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1 筒 Day1<br>イミフンジ点滴静注 5 0 0 m g / 1 0 m L * : 1500m g Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1   | 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌 |
| (胆道癌) GC+ヘムプロリスマブ療法【8コースまで】    | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8<br>テラト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day8<br>グムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 1000mg / ml Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>生理食塩液「フソ」 1 L : 1 袋 Day1 Day8<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) : 25m g / ml Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 Day8<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/ml ( 2 0 m L / A ) : 8ml Day1 Day8<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本 : 1 筒 Day1 Day8<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1   | 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌 |

| レジメン名                       | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種                  |
|-----------------------------|----------|----------|--|--------------------------|
| (胆道癌) GEM+ヘムプロリスマ療法         | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 Day8<br>ｸﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注液「N K」 (ﾓｰﾀﾞ用) : 1000mg / ml Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mlｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｯｶ」10mL:1筒 Day1 Day8<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」 1 0 m l / 本: 1 筒 Day1 Day8<br>ｷﾞｰﾄﾙｰｸ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * : 200m g Day1  | 消化器内科 / 消化器外科 / 5. 膵・胆道癌 |
| (膵癌) mOLFIRINOX療法 (ポートなし)   | 2        | 12       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ﾊﾞﾛ/ｾﾄﾞﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞ」: 1 瓶 Day1<br>ｱﾛｶﾘｽ点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞ酸塩8mg相当) : 1 V Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞ酸塩2mg相当): 2 A Day1<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ｵｷﾞﾌﾞﾗﾌﾞﾗﾁﾝ点滴静注「ﾎｽﾋﾞｰ」 (ﾓｰﾀﾞ用) : 85m g / ml Day1<br>ｼﾞﾎﾞﾛﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (ﾓｰﾀﾞ用) : 200m g / ml Day1<br>ｲﾘﾈﾝｶﾝ塩酸塩点滴静注液(ﾓｰﾀﾞ用): 150m g / ml Day1<br>大塚生食注ﾌﾞﾄﾞ糖 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ﾌﾙｵﾛﾗﾗｼﾞ注「ﾄｰﾂ」 (ﾓｰﾀﾞ用) : 1200m g / ml Day1 Day2<br>生理食塩液「ﾌﾞｯｸﾞ」 1 L : 1 袋 Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」 1 0 m l / 本: 1 筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mlｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｯｶ」10mL: 1 筒 Day2 | 消化器内科 / 消化器外科 / 5. 膵・胆道癌 |
| (膵癌) mOLFIRINOX療法 (ポートあり)   | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ﾊﾞﾛ/ｾﾄﾞﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞ」: 1 瓶 Day1<br>ｱﾛｶﾘｽ点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞ酸塩8mg相当) : 1 V Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞ酸塩2mg相当): 2 A Day1<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ｵｷﾞﾌﾞﾗﾌﾞﾗﾁﾝ点滴静注「ﾎｽﾋﾞｰ」 : 85m g / ml Day1<br>ｼﾞﾎﾞﾛﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (ﾓｰﾀﾞ用) : 200m g / ml Day1<br>ｲﾘﾈﾝｶﾝ塩酸塩点滴静注液(ﾓｰﾀﾞ用): 150m g / ml Day1<br>大塚生食注ﾌﾞﾄﾞ糖 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ﾌﾙｵﾛﾗﾗｼﾞ注「ﾄｰﾂ」 (ﾓｰﾀﾞ用) : 2400m g / ml Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」 1 0 m l / 本: 1 筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mlｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｯｶ」10mL: 1 筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1   | 消化器内科 / 消化器外科 / 5. 膵・胆道癌 |
| (膵癌) GnP療法 (ポートなし)          | 15       | 13       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾊﾞﾛ/ｾﾄﾞﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞ」: 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞ酸塩2mg相当): 2 A Day1 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｷｻﾝ点滴静注用 1 0 0 m g : 125mg / ml Day1 Day8 Day15<br>ｸﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注液「N K」 (ﾓｰﾀﾞ用) : 1000mg / ml Day1 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」 1 0 m l / 本: 1 筒 Day1 Day8 Day15   | 消化器内科 / 消化器外科 / 5. 膵・胆道癌 |
| (膵癌) GnP療法 (ポートあり)          | 15       | 13       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾊﾞﾛ/ｾﾄﾞﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞ」: 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞ酸塩2mg相当): 2 A Day1 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｷｻﾝ点滴静注用 1 0 0 m g : 125mg / ml Day1 Day8 Day15<br>ｸﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注液「N K」 (ﾓｰﾀﾞ用) : 1000mg / ml Day1 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」 1 0 m l / 本: 1 筒 Day1 Day8 Day15<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mlｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｯｶ」10mL: 1 筒 Day1 Day8 Day15   | 消化器内科 / 消化器外科 / 5. 膵・胆道癌 |
| (膵癌) nal-IRI + FF療法 (ポートなし) | 2        | 12       | ﾊﾞﾛ/ｾﾄﾞﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞ」: 1 瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞ酸塩8mg相当) : 1 V Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞ酸塩2mg相当): 2 A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ｼﾞﾎﾞﾛﾘﾅｰﾄ点滴静注用 (ﾓｰﾀﾞ用) : 200m g / ml Day1<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ｵﾈﾞﾊﾞｲﾄ点滴静注43mg: 70m g / ml Day1<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 5 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ﾌﾙｵﾛﾗﾗｼﾞ注「ﾄｰﾂ」 (ﾓｰﾀﾞ用) : 1200m g / ml Day1 Day2<br>生理食塩液「ﾌﾞｯｸﾞ」 1 L : 1 袋 Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day2 Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」 1 0 m l / 本: 1 筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mlｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｯｶ」10mL: 1 筒 Day2  | 消化器内科 / 消化器外科 / 5. 膵・胆道癌 |
| (膵癌) nal-IRI + FF療法 (ポートあり) | 1        | 13       | ﾊﾞﾛ/ｾﾄﾞﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞ」: 1 瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞ酸塩8mg相当) : 1 V Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞ酸塩2mg相当): 2 A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ｵﾈﾞﾊﾞｲﾄ点滴静注43mg: 70m g / ml Day1<br>ﾌﾞﾄﾞ糖注射液 5 % 5 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ﾌﾙｵﾛﾗﾗｼﾞ注「ﾄｰﾂ」 (ﾓｰﾀﾞ用) : 2400m g / ml Day1<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」 1 0 m l / 本: 1 筒 Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mlｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｯｶ」10mL: 1 筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1   | 消化器内科 / 消化器外科 / 5. 膵・胆道癌 |
| (膵癌) GS療法 (ポートなし)           | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 Day8<br>ｸﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注液「N K」 (ﾓｰﾀﾞ用) : 1000mg / ml Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」 1 0 m l / 本: 1 筒 Day1 Day8   | 消化器内科 / 消化器外科 / 5. 膵・胆道癌 |
| (膵癌) GS療法 (ポートあり)           | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 Day8<br>ｸﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注液「N K」 (ﾓｰﾀﾞ用) : 1000mg / ml Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」 1 0 m l / 本: 1 筒 Day1 Day8<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mlｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｯｶ」10mL: 1 筒 Day1 Day8   | 消化器内科 / 消化器外科 / 5. 膵・胆道癌 |
| (膵癌) GEM単剤療法 (ポートなし)        | 15       | 13       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞ酸塩2mg相当): 2 A Day1 Day8 Day15<br>ｸﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注液「N K」 (ﾓｰﾀﾞ用) : 1000mg / ml Day1 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>生食注ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」 1 0 m l / 本: 1 筒 Day1 Day8 Day15  | 消化器内科 / 消化器外科 / 5. 膵・胆道癌 |

| レジメン名                            | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種                   |
|----------------------------------|----------|----------|--|---------------------------|
| (肺癌) GEM単剤療法 (ポートあり)             | 15       | 13       | 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>F7チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オダ用):1000mg/ri Day1 Day8 Day15<br>大塚糖液 5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>生食注シリンジ「オートカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15  | 消化器内科/消化器外科/5. 肺・胆道癌      |
| (肺癌) 【術前】GS療法 (ポートなし)            | 8        | 13       | クラニセトロン点滴静注「ツグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8<br>F7チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8<br>F7チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オダ用):1000mg/ri Day1 Day8<br>大塚糖液 5% 100mL:1瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8<br>生食注シリンジ「オートカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8   | 消化器内科/消化器外科/5. 肺・胆道癌      |
| (肺癌) 【術前】GS療法 (ポートあり)            | 8        | 13       | クラニセトロン点滴静注「ツグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8<br>F7チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8<br>F7チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オダ用):1000mg/ri Day1 Day8<br>大塚糖液 5% 100mL:1瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8<br>生食注シリンジ「オートカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネカ」10mL:1筒 Day1 Day8  | 消化器内科/消化器外科/5. 肺・胆道癌      |
| mFOLFOX6 (ポンブ)                   | 1        | 13       | クラニセトロン点滴静注「ツグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>F7チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>ポラミン注 5mg/mL:1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL:1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オダ用):200mg/g/ri Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オダ用):85mg/g/ri Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL:1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トーワ」 (オダ用):400mg/g/ri Day1<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トーワ」 (オダ用):2400mg/g/ri Day1<br>生食注シリンジ「オートカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1  | 消化器内科/消化器外科/6. 小腸癌        |
| [2021-0012] mFOLFOX6+BV (ポンブ)    | 1        | 13       | クラニセトロン点滴静注「ツグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>F7チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>ポラミン注 5mg/mL:1A Day1<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1<br>治ハバマ点滴静注用400mg[20210012]:5mg/kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250mL:1瓶 Day1<br>レボホリナート点滴静注用 (オダ用):200mg/g/ri Day1<br>オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オダ用):85mg/g/ri Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 50mL:1瓶 Day1<br>フルオウラシル注「トーワ」 (オダ用):400mg/g/ri Day1<br>フルオウラシル注「トーワ」 (オダ用):2400mg/g/ri Day1<br>生食注シリンジ「オートカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/6. 小腸癌        |
| (NEN) STZ療法                      | 5        | 37       | 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2<br>アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1<br>クロニセトロン点滴静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>F7チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>F7チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ザリサー点滴静注用 1g *:500mg/g/ri Day1 Day3 Day4 Day5 Day2<br>生食注シリンジ「オートカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day5 Day3 Day4 Day2<br>(GE-ツカ)ソルデム3 A輸液 1L:1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2<br>生理食塩液「フソ」1L:1袋 Day3 Day4 Day5 Day2 Day1<br>ラックス注 20mg/2mL:1A Day3 Day4 Day5 Day2 Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day3 Day4 Day5 Day2 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  | 消化器内科/消化器外科/9. その他/1. NEN |
| (NEN) シスプラチン・イリテカン併用             | 15       | 13       | クラニセトロン点滴静注「ツグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15<br>F7チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day8 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day8 Day15<br>イリテカン塩酸塩点滴静注液(オダ用):60mg/g/ri Day8 Day15<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1<br>クロニセトロン点滴静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>F7チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1<br>F7チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>(GE-ツカ)ソルデム3 A輸液 500mL:1袋 Day1<br>硫酸Mg 補正液 1mEq/mL:8ml Day1<br>マンニトールS注射液 300mL:300mL Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オダ用):60mg/g/ri Day1<br>ソルデム3 A輸液 200mL:1袋 Day1<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>生食注シリンジ「オートカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 | 消化器内科/消化器外科/9. その他/1. NEN |
| (NEN) シスプラチン・エトポシド (100mg/mi) 併用 | 3        | 18       | 生食注シリンジ「オートカ」 10mL/本:1筒 Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1<br>クロニセトロン点滴静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>F7チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3<br>F7チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3<br>エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/g/ri Day1 Day2 Day3<br>(GE-ツカ)ソルデム3 A輸液 500mL:1袋 Day1<br>硫酸Mg 補正液 1mEq/mL:8ml Day1<br>マンニトールS注射液 300mL:300mL Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オダ用):80mg/g/ri Day1<br>ソルデム3 A輸液 200mL:1袋 Day1<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day3 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3   | 消化器内科/消化器外科/9. その他/1. NEN |

| レジメン名                                       | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種                     |
|---|----------|----------|---|-----------------------------|
| (NEN)シスプラチン・エトポシド (80mg/m <sup>2</sup> ) 併用 | 3        | 18       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL/本:1筒 Day1<br>大塚生食注 5.0 mL:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>アロカリス点滴静注 2.3 5 mg:1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テ*サト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3<br>テ*サト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.0 0 mL:1袋 Day1 Day2 Day3<br>エトポシド点滴静注液 1.0 0 mg「リノ」 5 mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>(GE-ツカ)ソルデム3 A輸液 5.0 0 mL:1袋 Day1<br>硫酸Mg 補正液 1 mEq/mL:8mL Day1<br>マンニトールS注射液 3.0 0 mL:300mL Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ソルデム3 A輸液 2.0 0 mL:1袋 Day1<br>大塚生食注 1.0 0 mL:1瓶 Day2 Day3 Day1  | 消化器内科/消化器外科/9. その他/1. NEN   |
| CBDCA (AUC=5) /CPT (day1,8,15)              | 15       | 13       | クラニセトロン点滴静注「ツグ」3 mg/1.0 0 mL「HK」:1袋 Day1 Day15 Day8<br>アロカリス点滴静注 2.3 5 mg:1瓶 Day1<br>テ*サト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):3A Day1<br>大塚生食注ソフト「ツグ」 2.5 0 mL:1袋 Day1 Day15 Day8<br>イリノデカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):50mg/g/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day8<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 mL:1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/g/A Day1<br>大塚生食注 5.0 mL:1瓶 Day1 Day15 Day8<br>テ*サト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day15 Day8<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 1.0 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15   | 消化器内科/消化器外科/9. その他/1. NEN   |
| CBDCA (AUC5)/ETOP (80mg)                    | 3        | 18       | クラニセトロン点滴静注「ツグ」3 mg/1.0 0 mL「HK」:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2.3 5 mg:1瓶 Day1<br>テ*サト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):3A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5.0 0 mL:1袋 Day1 Day2 Day3<br>エトポシド点滴静注液 1.0 0 mg「リノ」 5 mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 mL:1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/g/A Day1<br>大塚生食注 5.0 mL:1瓶 Day1 Day3 Day2<br>大塚生食注 1.0 0 mL:1瓶 Day2 Day3 Day1  | 消化器内科/消化器外科/9. その他/1. NEN   |
| 原発不明癌 ddTC療法【初回】                            | 15       | 6        | 大塚生食注 1.0 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2.3 5 mg:1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テ*サト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):2V Day1<br>テ*サト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注液20mg「ザワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 mg 1 mL:1A Day1 Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パワリタキセル注 1.0 0 mg/1.6. 7 mL「FNK」:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/g/A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 5.0 mL:1瓶 Day1<br>クラニセトロン点滴静注「ツグ」3 mg/1.0 0 mL「HK」:1袋 Day8 Day15<br>テ*サト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day8 Day15<br>テ*サト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):1A Day8<br>大塚生食注 5.0 mL:1瓶 Day8 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15                                  | 消化器内科/消化器外科/9. その他/2. 原発不明癌 |
| 原発不明癌 二次治療：ニボルマブ療法                          | 1        | 13       | 大塚生食注 5.0 mL:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 mg 1 mL:1A Day1<br>大塚生食注 1.0 0 mL:1瓶 Day1<br>オプジーブ点滴静注用 2.4 0 mg/2.4 mL *:240mg Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL/本:1筒 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/9. その他/2. 原発不明癌 |
| 原発不明癌 ddTC療法【2回目以降】                         | 15       | 6        | 大塚生食注 1.0 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2.3 5 mg:1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テ*サト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15<br>ファモチジン静注液20mg「ザワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 mg 1 mL:1A Day1 Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パワリタキセル注 1.0 0 mg/1.6. 7 mL「FNK」:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/g/A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 5.0 mL:1瓶 Day1<br>クラニセトロン点滴静注「ツグ」3 mg/1.0 0 mL「HK」:1袋 Day8 Day15<br>大塚生食注 5.0 mL:1瓶 Day8 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15   | 消化器内科/消化器外科/9. その他/2. 原発不明癌 |
| 原発不明癌 ddTC+BV療法【初回】                         | 15       | 6        | 大塚生食注 1.0 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2.3 5 mg:1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テ*サト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):2V Day1<br>テ*サト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注液20mg「ザワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 mg 1 mL:1A Day1 Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5% 2.5 0 mL:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パワリタキセル注 1.0 0 mg/1.6. 7 mL「FNK」:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/g/A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 5.0 mL:1瓶 Day1<br>クラニセトロン点滴静注「ツグ」3 mg/1.0 0 mL「HK」:1袋 Day8 Day15<br>テ*サト注射液6.6mg (リノ酸塩8mg相当):1V Day8 Day15<br>テ*サト注射液1.65mg(リノ酸塩2mg相当):1A Day8<br>大塚生食注 5.0 mL:1瓶 Day8 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1.0 mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15<br>アスチン点滴静注用(オーダ用):7.5mg/kg Day1 | 消化器内科/消化器外科/9. その他/2. 原発不明癌 |

| レジメン名                      | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種                     |
|----------------------------|----------|----------|--|-----------------------------|
| 原発不明癌 ddTC+BV療法【2回目以降】     | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>プドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80mg/m Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g/A Day1<br>プドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>グラニセトロン点滴静注「バグ」3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15<br>アスピリン点滴静注用 (オーダ用) :7.5m g/kg Day1  | 消化器内科/消化器外科/9. その他/2. 原発不明癌 |
| 肛門管癌 TC療法【1回目】             | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>プドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80mg/m Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g/A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15  | 消化器内科/消化器外科/9. その他/3. 肛門がん  |
| 肛門管癌 TC療法【2コース目以降】         | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):3A Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>プドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80mg/m Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g/A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1 Day8 Day15  | 消化器内科/消化器外科/9. その他/3. 肛門がん  |
| 肛門管癌 S-1+MMC+RT            | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>マイトマイシン注用 2 m g :10m g / m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1  | 消化器内科/消化器外科/9. その他/3. 肛門がん  |
| 肛門扁平上皮癌 FP療法               | 5        | 23       | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>硫酸Mg補正液 1 mEq/m l ( 2 0 m L / A ) :0.4A Day1<br>生理食塩液「バグ」フソール 1 L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>フルオロウラル注「トーフ」 (オーダ用) :1000m g / m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :60m g / m Day1<br>フラックス注 2 0 m g 2 m l :0.5A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day5<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day5<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1  | 消化器内科/消化器外科/9. その他/3. 肛門がん  |
| VDC (ユーイング肉腫)【緊急】ト*初*30min | 2        | 19       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>オコピン (VCR)注 1 m g :1.5m g / m Day1<br>(GE-ツカ)ソルデム3 A輸液 1 L :1袋 Day1<br>メイロン静注 7 % 2 0 m l :2A Day1<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) :1200m g / m Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>トキソルビリン塩酸塩注用 (オーダ用) :37.5m g / m Day1 Day2<br>ウロミキサン注 4 0 0 m g 4 m l :240m g / m Day1   | 消化器内科/消化器外科/9. その他/9. その他   |
| IE (ユーイング肉腫)【緊急】           | 5        | 16       | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L / 本:1筒 Day1<br>(GE-ツカ)ソルデム3 A輸液 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>メイロン静注 7 % 2 0 m l :1A Day1<br>グラニセトロン点滴静注「バグ」3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>デキストラン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>イボマド (IFX)注射用 1 g :1800m g / m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ウロミキサン注 4 0 0 m g 4 m l :360m g / m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>(GE-ツカ)ソルデム3 A輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>メイロン静注 7 % 2 0 m l :2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>トキソルビリン点滴静注液 1 0 0 m g / 5 m l :100m g / m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 | 消化器内科/消化器外科/9. その他/9. その他   |

| レジメン名                       | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種                   |
|-----------------------------|----------|----------|---|---------------------------|
| IE【緊急】IFM：day1のみ、ETP：day1-3 | 3        | 18       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day3 Day2<br>F7チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day3 Day1 Day2<br>F7チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day3 Day1 Day2<br>生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L /本:1筒 Day1<br>(GE-リカ)ソルテム1輸液 5 0 0 m L :1瓶 Day1<br>メロン静注 7 % 2 0 m L :1A Day1<br>グラニセトロン点滴静注(ツグ) 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>イホマイド ( I F X ) 注射用 1 g :1800m g / m l Day1<br>ウロミキサン注 4 0 0 m g 4 m l :360m g / m l Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3<br>(GE-リカ)ソルテム3 A輸液 1 L :1袋 Day1<br>メロン静注 7 % 2 0 m L :2A Day1<br>トホシド点滴静注液 1 0 0 m g [リカ] 5 m l :100m g / m l Day1 Day2 Day3 | 消化器内科/消化器外科/9. その他/9. その他 |
| リツキサン (ネフローゼ症候群)            | 1        | 6        | リツキサン注 (オーダ用) :375m g / m l Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ソルコテフ注射用 1 0 0 m g (溶解液付) :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1   | 腎臓内科                      |
| ADM 末梢                      | 2        | 19       | ドキシルビン塩酸塩注射用 (オーダ用) :37.5m g / m l Day1 Day2<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day2   | 整形外科                      |
| ADM 中枢                      | 2        | 19       | ドキシルビン塩酸塩注射用 (オーダ用) :37.5m g / m l Day1 Day2<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :2.4A Day1 Day2  | 整形外科                      |
| DOX+CBDC A 末梢               | 2        | 18       | ドキシルビン塩酸塩注射用 (オーダ用) :37.5m g / m l Day1 Day2<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day2<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1   | 整形外科                      |
| DOX+CBDC A : 中枢             | 2        | 19       | ドキシルビン塩酸塩注射用 (オーダ用) :37.5m g / m l Day1 Day2<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :2.4A Day1 Day2<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1  | 整形外科                      |
| ハラヴェン：整形                    | 1        | 6        | ハラヴェン静注 1 m g :1.4m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 整形外科                      |
| Gem+Doce                    | 8        | 13       | (GE-リカ)ソルテム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day8<br>グラニセトロン点滴静注(ツグ) 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :900m g / m l Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day8<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :100m g / m l Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day8<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8   | 整形外科                      |
| CBDC A/Pacici【リカシ不要】        | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>F7チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>F7チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1<br>グラニセトロン点滴静注(ツグ) 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パクリタキセル注 (オーダ用) :175m g / m l Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1   | 整形外科                      |
| Weekly pacici【リカシ不要】        | 1        | 6        | 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パクリタキセル注 (オーダ用) :100m g / m l Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>F7チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>F7チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1<br>グラニセトロン点滴静注(ツグ) 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1   | 整形外科                      |
| 新_ヨンデルス                     | 2        | 19       | エンデルリス点滴静注用 0.25m g * :1.2m g / m l Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2<br>グラニセトロン点滴静注(ツグ) 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day2<br>F7チート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day2<br>F7チート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1 Day2<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1  | 整形外科                      |
| A+I 中枢 4days                | 4        | 17       | ドキシルビン塩酸塩注射用 (オーダ用) :35m g / m l Day1 Day2<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :2.4A Day1 Day2<br>イホマイド ( I F X ) 注射用 1 g :2500m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :480m l Day1 Day2 Day3 Day4  | 整形外科                      |
| A+I 中枢 5days                | 5        | 16       | ドキシルビン塩酸塩注射用 (オーダ用) :35m g / m l Day1 Day2<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :2.4A Day1 Day2<br>イホマイド ( I F X ) 注射用 1 g :2000m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :480m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  | 整形外科                      |
| A+I 末梢 4days                | 4        | 17       | ドキシルビン塩酸塩注射用 (オーダ用) :35m g / m l Day1 Day2<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day2<br>イホマイド ( I F X ) 注射用 1 g :2500m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :0.96袋 Day1 Day2 Day3 Day4  | 整形外科                      |
| A+I 末梢 5days                | 5        | 16       | ドキシルビン塩酸塩注射用 (オーダ用) :35m g / m l Day1 Day2<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day2<br>イホマイド ( I F X ) 注射用 1 g :2000m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :480m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5   | 整形外科                      |
| A+C 中枢                      | 2        | 18       | ドキシルビン塩酸塩注射用 (オーダ用) :45m g / m l Day1 Day2<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :2.4A Day1 Day2<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :60m g / m l Day1 Day2<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :0.6袋 Day1 Day2   | 整形外科                      |
| A+C 末梢                      | 2        | 18       | ドキシルビン塩酸塩注射用 (オーダ用) :45m g / m l Day1 Day2<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L :1瓶 Day1 Day2<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :60m g / m l Day1 Day2<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :0.6袋 Day1 Day2  | 整形外科                      |
| DAV-I                       | 5        | 16       | (GE-リカ)ソルテム1輸液 2 0 0 m L :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>オコピン ( V C R ) 注 1 m g :1.5m g / m l Day1<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :0.5A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ニドラン ( A C N U ) 注射用 5 0 m g * :80m g / m l Day1<br>ガルバジン注 1 0 0 m g :140m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>フエロン注射用 3 0 0 万国際単位 (溶解液付) :2瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5   | 整形外科                      |
| Irinotecan                  | 5        | 2        | イリリテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):20m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>グラニセトロン点滴静注(ツグ) 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>リル・メドロール静注用 1 2 5 m g :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5   | 整形外科                      |



| レジメン名            | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種 |
|------------------|----------|----------|--|---------|
| ICE              | 3        | 18       | カルボプラチン点滴静注液（オーダ用）:0mg/A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1<br>イホマイト（IFX）注射用 1g:3000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>生理食塩液「ヒカリ」 500ml:480ml Day1 Day2 Day3<br>エトポシド点滴静注液 100mg「フクト」5ml:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>ブドウ糖注射液 5%500ml:1瓶 Day1 Day2 Day3  | 整形外科    |
| IE               | 5        | 9        | エトポシド点滴静注液 100mg「フクト」5ml:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ブドウ糖注射液 5%500ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>イホマイト（IFX）注射用 1g:2000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  | 整形外科    |
| HD-IFO 4days     | 4        | 17       | イホマイト（IFX）注射用 1g:3500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4<br>生理食塩液「ヒカリ」 500ml:480ml Day1 Day2 Day3 Day4   | 整形外科    |
| HD-IFO 5days     | 5        | 16       | イホマイト（IFX）注射用 1g:3000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液「ヒカリ」 500ml:480ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5   | 整形外科    |
| HD-IFO 6days     | 6        | 15       | イホマイト（IFX）注射用 1g:2500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>生理食塩液「ヒカリ」 500ml:480ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6   | 整形外科    |
| IFM 4days bolus  | 4        | 10       | イホマイト（IFX）注射用 1g:3000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4   | 整形外科    |
| MTX 6H           | 1        | 6        | 注射用メトトレキサート（オーダ用）:1200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>メロン静注7%20ml:3A Day1<br>ソルデム3A輸液200ml:1袋 Day1   | 整形外科    |
| MTX+VLB          | 1        | 6        | (GE-リソ)ソルデム1輸液500ml:1瓶 Day1<br>メロン静注7%20ml:1A Day1<br>クラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml「HK」:1袋 Day1<br>大塚蒸留水（注射用水） 20ml:0.5A Day1<br>エクザール（VBL） 10mg:5mg/m <sup>2</sup> Day1<br>注射用メトトレキサート 50mg:30mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1   | 整形外科    |
| VDC 中枢           | 2        | 12       | オンコピン（VCR）注 1mg:1.5mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚蒸留水（注射用水） 20ml:0.5A Day1<br>エンドキサン注（オーダ用）:1200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1<br>ドキシソリン塩酸塩注射用（オーダ用）:37.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2<br>大塚蒸留水（注射用水） 20ml:2.4A Day1 Day2  | 整形外科    |
| VDC 末梢           | 2        | 12       | オンコピン（VCR）注 1mg:1.5mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚蒸留水（注射用水） 20ml:0.5A Day1<br>エンドキサン注（オーダ用）:1200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1<br>ドキシソリン塩酸塩注射用（オーダ用）:37.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2<br>大塚蒸留水 100ml:1瓶 Day1 Day2   | 整形外科    |
| 2020-0005 ALBERT | 1        | 17       | 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1<br>治)アパ)以)マ)注(1200mg/20ml)[20200005]:1200mg Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1   | 整形外科    |
| CBDCA/Pacil      | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>テート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>テート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):2V Day1<br>クラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml「HK」:1袋 Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1<br>パクリタセル注 100mg/16.7ml「NK」:175mg/m <sup>2</sup> Day1<br>カルボプラチン点滴静注液（オーダ用）:0mg/A Day1  | 整形外科    |
| Weekly paci      | 1        | 6        | 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1<br>パクリタセル注 100mg/16.7ml「NK」:100mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>テート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>テート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):2V Day1<br>クラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml「HK」:1袋 Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1   | 整形外科    |
| FEC100           | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5ml「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>大塚糖液 5% 100ml:10ml Day1<br>エビルジン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1<br>テート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>エンドキサン注（オーダ用）:500mg/m <sup>2</sup> Day1<br>フルオロウラル注「トーウ」（オーダ用）:500mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 | 乳癌外科    |
| FEC100 (E≦120mg) | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5ml「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>テート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>大塚糖液 5% 100ml:10ml Day1<br>エビルジン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1<br>エンドキサン注（オーダ用）:500mg/m <sup>2</sup> Day1<br>フルオロウラル注「トーウ」（オーダ用）:500mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 | 乳癌外科    |
| EC90             | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5ml「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>大塚糖液 5% 100ml:10ml Day1<br>エビルジン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):90mg/m <sup>2</sup> Day1<br>テート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>エンドキサン注（オーダ用）:600mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳癌外科    |
| EC90 (E≦120mg)   | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5ml「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>テート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>大塚糖液 5% 100ml:10ml Day1<br>エビルジン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):90mg/m <sup>2</sup> Day1<br>エンドキサン注（オーダ用）:600mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳癌外科    |

| レジメン名                | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種 |
|----------------------|----------|----------|---|---------|
| EC75                 | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキソメトリン注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :1V Day1<br>デキソメトリン注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 0 m l Day1<br>エドキシタン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):75m g / m l Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) :600m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| ddFEC100             | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキソメトリン注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 0 m l Day1<br>エドキシタン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):100m g / m l Day1<br>デキソメトリン注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):1A Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) :500m g / m l Day1<br>フルオロウラシル注「トーウ」 (オーダ用) :500m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| ddEC90               | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキソメトリン注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 0 m l Day1<br>エドキシタン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):90m g / m l Day1<br>デキソメトリン注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):1A Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) :600m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| ddPTX                | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>デキソメトリン注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>フアモチジン静注20mg「サイウ」 (20mL/A) :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:175m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1  | 乳腺外科    |
| AC                   | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキソメトリン注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :1V Day1<br>デキソメトリン注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ドキシリジン塩酸塩注射液 (オーダ用) :60m g / m l Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) :600m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| ddAC                 | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキソメトリン注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :1V Day1<br>デキソメトリン注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ドキシリジン塩酸塩注射液 (オーダ用) :60m g / m l Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) :600m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| Epirubicin単独         | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキソメトリン注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :1V Day1<br>デキソメトリン注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):1A Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 0 m l Day1<br>エドキシタン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):60m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| wPTX 初回              | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>デキソメトリン注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :1V Day1<br>デキソメトリン注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):1A Day1<br>フアモチジン静注20mg「サイウ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| wPTX 2回目～            | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>フアモチジン静注20mg「サイウ」 (20mL/A) :1A Day1<br>デキソメトリン注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):2A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| wPTX+Carbo (5AUC) 初回 | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキソメトリン注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :1V Day1<br>デキソメトリン注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):1A Day1<br>フアモチジン静注20mg「サイウ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l 「NK」:80m g / m l Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>デキソメトリン注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):2A Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day15 | 乳腺外科    |

| レジメン名                      | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種 |
|----------------------------|----------|----------|--|---------|
| wPTX+Carbo (5AUC) 2回目～     | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>フォモチン静注20mg「サイウ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1 Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80mg/m Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g/A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day15 | 乳腺外科    |
| DTX                        | 1        | 20       | クラセトロン点滴静注/ユグ 3 m g / 1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :75mg/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1   | 乳腺外科    |
| TC (DTX+CPA)               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :75mg/m Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) :600m g / m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| TCb (DTX+Cb)               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :75mg/m Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g/A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| TAC                        | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :75mg/m Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) :500m g / m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ドキシルビリン硫酸塩注射液 (オーダ用) :50m g / m Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| nabPTX q3w                 | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>アプライン点滴静注用 1 0 0 m g : 260mg/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| w-nabPTX+前投薬               | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>アプライン点滴静注用 1 0 0 m g : 100mg/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| w-nabPTX (前投薬なし)           | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アプライン点滴静注用 1 0 0 m g : 100mg/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| w-nabPTX+前投薬 (28日レジメン)     | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15<br>アプライン点滴静注用 1 0 0 m g : 100mg/m Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day15  | 乳腺外科    |
| w-nabPTX (前投薬なし) (28日レジメン) | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>アプライン点滴静注用 1 0 0 m g : 100mg/m Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day15  | 乳腺外科    |
| Eribulin+前投薬 (7日レジメン)      | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>エリブリン点滴静注液 1 m g 「日医工」:1.4mg/m Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| Eribulin [前投薬なし] (7日レジメン)  | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>エリブリン点滴静注液 1 m g 「日医工」:1.4mg/m Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| Eribulin+前投薬 (21日レジメン)     | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>デキサメタゾン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>エリブリン点滴静注液 1 m g 「日医工」:1.4mg/m Day1 Day8<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1   | 乳腺外科    |
| Eribulin [前投薬なし] (21日レジメン) | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>エリブリン点滴静注液 1 m g 「日医工」:1.4mg/m Day1 Day8<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1  | 乳腺外科    |
| Vinorelbine+前投薬            | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L : 25mg/m Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| Vinorelbine (前投薬なし)        | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L : 25mg/m Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |

| レジメン名                         | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種 |
|-------------------------------|----------|----------|--|---------|
| Vinorelbine+前投薬 (21日レジメン)     | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>F7チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L : 25mg/m Day1 Day8<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1   | 乳腺外科    |
| Vinorelbine (前投薬なし) (21日レジメン) | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m L : 25mg/m Day1 Day8<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1  | 乳腺外科    |
| Carboplatin 6AUC              | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>F7チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダー用):0m g/A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| Carboplatin 2AUC              | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>F7チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダー用):0m g/A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| Gemcitabine                   | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>F7チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用):1250m g/m Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| Gemcitabine (21日レジメン)         | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1 Day8<br>F7チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用):1250m g/m Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1                                      | 乳腺外科    |
| Gemcitabine+Carb 2AUC         | 1        | 6        | 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダー用):0m g/A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>F7チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用):1000m g/m Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 | 乳腺外科    |
| Gemcitabine+Carb 5AUC         | 1        | 4        | 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダー用):0m g/A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>F7チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用):1000m g/m Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1   | 乳腺外科    |
| CPT-11                        | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>F7チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>リナデカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):100m g/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| CMFオリジナル                      | 1        | 5        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>F7チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>F7チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>注射用ミノレキセート 5 0 mg:40m g/m Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用):500m g/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1   | 乳腺外科    |
| CMF点滴                         | 1        | 17       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>F7チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>F7チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>注射用ミノレキセート 5 0 mg:80m g/m Day1<br>エンドキサン注 (オーダー用):500m g/m Day1<br>フルオウラル注「トロー」 (オーダー用):500m g/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1                  | 乳腺外科    |
| H (ハーセプチン) 初回                 | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>F7チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダー用):8m g/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H (ハーセプチン) 2回目~               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダー用):6m g/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン) 初回              | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>F7チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当):1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」 (オーダー用):8m g/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |

| レジメン名                            | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種 |
|----------------------------------|----------|----------|---|---------|
| H (BS セルトリオン) 2回目～               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) *: 6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H+DTX 初回                         | 1        | 20       | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) : 8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) : 75mg/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H+DTX 2回目～                       | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) : 6m g / k g Day1<br>クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) : 75mg/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H(BS セルトリオン)+DTX 初回              | 1        | 20       | クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) *: 8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) : 75mg/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H(BS セルトリオン)+DTX 2回目～            | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) *: 6mg/kg Day1<br>クラニセトロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) : 75mg/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H+TCb (DTX+Cb) 初回                | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) : 8m g / k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) : 75mg/m Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) : 0m q / A Day1         | 乳腺外科    |
| H+TCb (DTX+Cb) 2回目以降             | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) : 6m g / k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) : 75mg/m Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) : 0m q / A Day1         | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+TCb (DTX+Cb) 初回    | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) *: 8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) : 75mg/m Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) : 0m q / A Day1 | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+TCb (DTX+Cb) 2回目以降 | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) *: 6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) : 75mg/m Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) : 0m q / A Day1 | 乳腺外科    |

| レジメン名                            | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種 |
|----------------------------------|----------|----------|--|---------|
| H+TC (DTX+CPA) 初回                | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液6.6mg (ﾘﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾛｯｸ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注[ニプロ] (オーダ用) :75mg/mi Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ]10mL:1筒 Day1<br>ｴﾝﾄﾞｷｬﾝ注 (オーダ用) :600m g /m Day1   | 乳腺外科    |
| H+TC (DTX+CPA) 2回目以降             | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液6.6mg (ﾘﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾛｯｸ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注[ニプロ] (オーダ用) :75mg/mi Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ]10mL:1筒 Day1<br>ｴﾝﾄﾞｷｬﾝ注 (オーダ用) :600m g /m Day1   | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+TC (DTX+CPA) 初回    | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液6.6mg (ﾘﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾄﾗｽﾞｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用[ C T H ] (オーダ用) *:8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾛｯｸ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注[ニプロ] (オーダ用) :75mg/mi Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ]10mL:1筒 Day1<br>ｴﾝﾄﾞｷｬﾝ注 (オーダ用) :600m g /m Day1  | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+TC (DTX+CPA) 2回目以降 | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液6.6mg (ﾘﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾄﾗｽﾞｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用[ C T H ] (オーダ用) *:6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾛｯｸ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注[ニプロ] (オーダ用) :75mg/mi Day1<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ]10mL:1筒 Day1<br>ｴﾝﾄﾞｷｬﾝ注 (オーダ用) :600m g /m Day1  | 乳腺外科    |
| H+wPTX 初回                        | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液6.6mg (ﾘﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液1.65mg(ﾘﾝｸﾞ酸塩2mg相当):1A Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液20mg g [ ﾏﾞｲ ] (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g /m Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液1.65mg(ﾘﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day8 Day15<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ]10mL:1筒 Day8 Day15                  | 乳腺外科    |
| H+wPTX 2回目以降                     | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液1.65mg(ﾘﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液20mg g [ ﾏﾞｲ ] (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g /m Day1 Day8 Day15<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ]10mL:1筒 Day8 Day15  | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+wPTX 初回            | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液6.6mg (ﾘﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液1.65mg(ﾘﾝｸﾞ酸塩2mg相当):1A Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液20mg g [ ﾏﾞｲ ] (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾄﾗｽﾞｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用[ C T H ] (オーダ用) *:8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g /m Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液1.65mg(ﾘﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day8 Day15<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ]10mL:1筒 Day8 Day15 | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+wPTX 2回目以降         | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液1.65mg(ﾘﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注注射液20mg g [ ﾏﾞｲ ] (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾄﾗｽﾞｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用[ C T H ] (オーダ用) *:6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g /m Day1 Day8 Day15<br>(ﾛｯｸ用)へﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ]10mL:1筒 Day8 Day15   | 乳腺外科    |

| レジメン名                        | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種 |
|------------------------------|----------|----------|---|---------|
| H+Eribulin 初回                | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊｰｾﾞﾌﾟﾁﾝ注射液 (ｵｰｸﾞ用) :8m g /k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ｴﾘﾌﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩静注液 1 m g「日医工」:1.4mg/㎡ Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day8<br>(ﾂｯｸﾞ用)ﾍﾞﾘﾝｼﾞﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰﾙ」10mL:1筒 Day8 Day1  | 乳腺外科    |
| H+Eribulin 2回目以降             | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊｰｾﾞﾌﾟﾁﾝ注射液 (ｵｰｸﾞ用) :6m g /k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ｴﾘﾌﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩静注液 1 m g「日医工」:1.4mg/㎡ Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day8<br>(ﾂｯｸﾞ用)ﾍﾞﾘﾝｼﾞﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰﾙ」10mL:1筒 Day8 Day1  | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+Eribulin 初回    | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾄﾞﾗｽﾞｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用「C T H」 (ｵｰｸﾞ用) *:8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ｴﾘﾌﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩静注液 1 m g「日医工」:1.4mg/㎡ Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day8<br>(ﾂｯｸﾞ用)ﾍﾞﾘﾝｼﾞﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰﾙ」10mL:1筒 Day8 Day1                                     | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+Eribulin 2回目以降 | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾄﾞﾗｽﾞｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用「C T H」 (ｵｰｸﾞ用) *:6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ｴﾘﾌﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩静注液 1 m g「日医工」:1.4mg/㎡ Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day8<br>(ﾂｯｸﾞ用)ﾍﾞﾘﾝｼﾞﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰﾙ」10mL:1筒 Day8 Day1   | 乳腺外科    |
| H+VNR 初回                     | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊｰｾﾞﾌﾟﾁﾝ注射液 (ｵｰｸﾞ用) :8m g /k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ｾﾞﾙﾍﾞｽ静注液 1 0 m g / 1 m l :25mg/㎡ Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day8<br>(ﾂｯｸﾞ用)ﾍﾞﾘﾝｼﾞﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰﾙ」10mL:1筒 Day8 Day1  | 乳腺外科    |
| H+VNR 2回目以降                  | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊｰｾﾞﾌﾟﾁﾝ注射液 (ｵｰｸﾞ用) :6m g /k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ｾﾞﾙﾍﾞｽ静注液 1 0 m g / 1 m l :25mg/㎡ Day1 Day8<br>(ﾂｯｸﾞ用)ﾍﾞﾘﾝｼﾞﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰﾙ」10mL:1筒 Day8 Day1   | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+VNR 初回         | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾄﾞﾗｽﾞｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用「C T H」 (ｵｰｸﾞ用) *:8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ｾﾞﾙﾍﾞｽ静注液 1 0 m g / 1 m l :25mg/㎡ Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day8<br>(ﾂｯｸﾞ用)ﾍﾞﾘﾝｼﾞﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰﾙ」10mL:1筒 Day8 Day1                                     | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+VNR 2回目以降      | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾄﾞﾗｽﾞｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用「C T H」 (ｵｰｸﾞ用) *:6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ｾﾞﾙﾍﾞｽ静注液 1 0 m g / 1 m l :25mg/㎡ Day1 Day8<br>(ﾂｯｸﾞ用)ﾍﾞﾘﾝｼﾞﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰﾙ」10mL:1筒 Day8 Day1  | 乳腺外科    |
| H+GEM 初回                     | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ｲﾛﾉｾﾄﾞ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞﾘ」:1瓶 Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊｰｾﾞﾌﾟﾁﾝ注射液 (ｵｰｸﾞ用) :8m g /k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1<br>ｸﾞﾑｼﾝﾀﾞﾍﾞﾝ点滴静注液「N K」 (ｵｰｸﾞ用) :1250m g /㎡ Day8 Day1<br>(ﾂｯｸﾞ用)ﾍﾞﾘﾝｼﾞﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰﾙ」10mL:1筒 Day8 Day1 | 乳腺外科    |
| H+GEM 2回目以降                  | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ｲﾛﾉｾﾄﾞ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾞﾘ」:1瓶 Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊｰｾﾞﾌﾟﾁﾝ注射液 (ｵｰｸﾞ用) :6m g /k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1<br>ｸﾞﾑｼﾝﾀﾞﾍﾞﾝ点滴静注液「N K」 (ｵｰｸﾞ用) :1250m g /㎡ Day8 Day1<br>(ﾂｯｸﾞ用)ﾍﾞﾘﾝｼﾞﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾈｰﾙ」10mL:1筒 Day8 Day1                                 | 乳腺外科    |

| レジメン名                           | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種 |
|---------------------------------|----------|----------|--|---------|
| H (BS セルトリオン)+GEM 初回            | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1 Day8<br>テノリト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) *:8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1<br>グムシタピン点滴静注液「N K」(オーダ用) :1250mg/ml Day8 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1 | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+GEM 2回目以降         | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1 Day8<br>テノリト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) *:6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1<br>グムシタピン点滴静注液「N K」(オーダ用) :1250mg/ml Day8 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1                               | 乳腺外科    |
| H+nabPCTX q3w 初回                | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>テノリト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>アラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260mg/ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8m g /k g Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H+nabPCTX q3w 2回目以降             | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>テノリト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>アラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260mg/ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6m g /k g Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+nabPCTX q3w 初回    | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>テノリト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>アラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260mg/ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) *:8mg/kg Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+nabPCTX q3w 2回目以降 | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>テノリト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>アラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260mg/ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) *:6mg/kg Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| H (ハーセプチン)+PER 初回               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>テノリト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :840m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8m g /k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| H (ハーセプチン)+PER 2回目～             | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6m g /k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン) +PER 初回           | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>テノリト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :840m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) *:8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン) +PER 2回目～         | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420m g Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) *:6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H (ハーセプチン)+PER(混合)              | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6m g /k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |



| レジメン名                       | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種 |
|-----------------------------|----------|----------|---|---------|
| H (BS セルトリオン) +PER【混合】      | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) * :6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H+PER+DTX 初回                | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :840mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/ml Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H+PER+DTX 2回目～              | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6mg/kg Day1<br>グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H(BS セルトリオン)+PER+DTX 初回     | 1        | 20       | グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :840mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) * :8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/ml Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| H(BS セルトリオン)+PER+DTX 2回目～   | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) * :6mg/kg Day1<br>グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| H+PER【混合】 + DTX             | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6mg/kg Day1<br>グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER【混合】 + DTX | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) * :6mg/kg Day1<br>グラニセロン点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| H+PER+TCb (DTX+Cb) 初回       | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイボウ」:1瓶 Day1<br>テチト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :840mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/ml Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1 | 乳腺外科    |

| レジメン名                                | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種 |
|--------------------------------------|----------|----------|--|---------|
| H+PER+TCb (DTX+Cb) 2回目以降             | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液 6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L : 420m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オード用) : 6m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オード用) : 75mg / m l Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオカ」10mL: 1 筒 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オード用) : 0m g / A Day1              | 乳腺外科    |
| H+PER【混合】+TCb (DTX+Cb)               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液 6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L : 420m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オード用) : 6m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オード用) : 75mg / m l Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオカ」10mL: 1 筒 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オード用) : 0m g / A Day1              | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER+TCb (DTX+Cb) 初回    | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液 6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L : 840m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>トラスツスマブBS点滴静注用「C T H」 (オード用) * : 8mg / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オード用) : 75mg / m l Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオカ」10mL: 1 筒 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オード用) : 0m g / A Day1 | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER+TCb (DTX+Cb) 2回目以降 | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液 6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L : 420m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>トラスツスマブBS点滴静注用「C T H」 (オード用) * : 6mg / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オード用) : 75mg / m l Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオカ」10mL: 1 筒 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オード用) : 0m g / A Day1 | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER【混合】+TCb (DTX+Cb)   | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液 6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L : 420m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>トラスツスマブBS点滴静注用「C T H」 (オード用) * : 6mg / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オード用) : 75mg / m l Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオカ」10mL: 1 筒 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オード用) : 0m g / A Day1 | 乳腺外科    |
| H+PER+TC (DTX+CPA) 初回                | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液 6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L : 840m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オード用) : 8m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オード用) : 75mg / m l Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオカ」10mL: 1 筒 Day1<br>エンドキサン注 (オード用) : 600m g / m l Day1               | 乳腺外科    |
| H+PER+TC (DTX+CPA) 2回目以降             | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」: 1 瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液 6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L : 420m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 0 m L : 1 瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オード用) : 6m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オード用) : 75mg / m l Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオカ」10mL: 1 筒 Day1<br>エンドキサン注 (オード用) : 600m g / m l Day1               | 乳腺外科    |

| レジメン名                                | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種 |
|--------------------------------------|----------|----------|--|---------|
| H+PER【混合】+TC (DTX+CPA)               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リブリン8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトパック 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6m g/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :75mg/ml Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m l Day1   | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER+TC (DTX+CPA) 初回    | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リブリン8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトパック 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :840m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」 (オーダ用) *:8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :75mg/ml Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m l Day1   | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER+TC (DTX+CPA) 2回目以降 | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リブリン8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトパック 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」 (オーダ用) *:6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :75mg/ml Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m l Day1   | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER【混合】+TC (DTX+CPA)   | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リブリン8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトパック 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「C T H」 (オーダ用) *:6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :75mg/ml Day1<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>エンドキサン注 (オーダ用) :600m g /m l Day1   | 乳腺外科    |
| H+PER+wPTX 初回                        | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リブリン8mg相当) :1V Day1<br>デキサメタゾン注射液1.65mg(リブリン2mg相当):1A Day1<br>フアモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトパック 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :840m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8m g/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g/ml Day1 Day8 Day15<br>デキサメタゾン注射液1.65mg(リブリン2mg相当):2A Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day15 | 乳腺外科    |
| H+PER+wPTX 2回目以降                     | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>デキサメタゾン注射液1.65mg(リブリン2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>フアモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトパック 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6m g/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g/ml Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day15   | 乳腺外科    |
| H+PER【混合】+wPTX                       | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>デキサメタゾン注射液1.65mg(リブリン2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>フアモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトパック 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420m g Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6m g/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g/ml Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリウムNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day15   | 乳腺外科    |

| レジメン名                        | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種 |
|------------------------------|----------|----------|---|---------|
| H (BS セルトリオン)+PER+wPTX 初回    | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) : 1A Day1 Day8 Day15<br>ポラミン注 5 mg 1 m l : 1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 Day8 Day15<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l : 840mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」(オーダ用) *: 8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]: 80m g / m l Day1 Day8 Day15<br>デキストラン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当): 2A Day8 Day15<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL: 1筒 Day8 Day15 | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER+wPTX 2回目以降 | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>デキストラン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当): 2A Day1 Day8 Day15<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) : 1A Day1 Day8 Day15<br>ポラミン注 5 mg 1 m l : 1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 Day8 Day15<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l : 420mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」(オーダ用) *: 6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]: 80m g / m l Day1 Day8 Day15<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL: 1筒 Day8 Day15  | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER【混合】+wPTX   | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>デキストラン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当): 2A Day1 Day8 Day15<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) : 1A Day1 Day8 Day15<br>ポラミン注 5 mg 1 m l : 1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1 Day8 Day15<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l : 420mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」(オーダ用) *: 6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]: 80m g / m l Day1 Day8 Day15<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL: 1筒 Day8 Day15  | 乳腺外科    |
| H+PER+GEM 初回                 | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1 Day8<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day8<br>ポラミン注 5 mg 1 m l : 1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l : 840mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ハーセブチン注射液 (オーダ用) : 8m g / k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day8 Day1<br>グムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 1250m g / m l Day8 Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL: 1筒 Day8 Day1   | 乳腺外科    |
| H+PER+GEM 2回目以降              | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1 Day8<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l : 420mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ハーセブチン注射液 (オーダ用) : 6m g / k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day8 Day1<br>グムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 1250m g / m l Day8 Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL: 1筒 Day8 Day1   | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER+GEM 初回     | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1 Day8<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day8<br>ポラミン注 5 mg 1 m l : 1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l : 840mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」(オーダ用) *: 8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day8 Day1<br>グムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 1250m g / m l Day8 Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL: 1筒 Day8 Day1   | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER+GEM 2回目以降  | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1 Day8<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l : 420mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」(オーダ用) *: 6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day8 Day1<br>グムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) : 1250m g / m l Day8 Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL: 1筒 Day8 Day1   | 乳腺外科    |
| H+PER+nabPTX(q3w) 初回         | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>ポラミン注 5 mg 1 m l : 1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l : 840mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ハーセブチン注射液 (オーダ用) : 8m g / k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アプライン点滴静注用 1 0 0 m g : 260mg/m l Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL: 1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H+PER+nabPTX(q3w)+前投薬 2回目以降  | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」: 1瓶 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l : 420mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ハーセブチン注射液 (オーダ用) : 6m g / k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アプライン点滴静注用 1 0 0 m g : 260mg/m l Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mL注射液「ネオ」10mL: 1筒 Day1   | 乳腺外科    |

| レジメン名                               | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種 |
|-------------------------------------|----------|----------|--|---------|
| H+PER+nabPTX(q3w) 2回目以降 (前投薬無し)     | 1        | 20       | 大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4.20mg / 1.4mL:420mg Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL:1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1<br>大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>アプラキサン点滴静注用 1.00mg :260mg/ml Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H(BS)+PER+nabPTX(q3w) 初回            | 1        | 20       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1mL:1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4.20mg / 1.4mL:840mg Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL:1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」 (オーダ用) *:8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1<br>アプラキサン点滴静注用 1.00mg :260mg/ml Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1                      | 乳腺外科    |
| H(BS)+PER+nabPTX(q3w)+前投薬 2回目以降     | 1        | 20       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4.20mg / 1.4mL:420mg Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL:1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」 (オーダ用) *:6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1<br>アプラキサン点滴静注用 1.00mg :260mg/ml Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| H(BS)+PER+nabPTX(q3w) 2回目以降 (前投薬無し) | 1        | 20       | 大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4.20mg / 1.4mL:420mg Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL:1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」 (オーダ用) *:6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1<br>大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1<br>アプラキサン点滴静注用 1.00mg :260mg/ml Day1<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| H+PER+Eribulin 初回                   | 8        | 13       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day8<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1mL:1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4.20mg / 1.4mL:840mg Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL:1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day9<br>エリブリンメシル酸塩静注液 1mg「日医工」:1.4mg/ml Day1 Day8<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day8<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1            | 乳腺外科    |
| H+PER+Eribulin 2回目以降                | 8        | 13       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day8<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4.20mg / 1.4mL:420mg Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL:1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day8<br>エリブリンメシル酸塩静注液 1mg「日医工」:1.4mg/ml Day1 Day8<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1  | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER+Eribulin 初回       | 8        | 13       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day8<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1mL:1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4.20mg / 1.4mL:840mg Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL:1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」 (オーダ用) *:8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day8<br>エリブリンメシル酸塩静注液 1mg「日医工」:1.4mg/ml Day1 Day8<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day8<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1 | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER+Eribulin 2回目以降    | 8        | 13       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day8<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4.20mg / 1.4mL:420mg Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL:1瓶 Day1<br>トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」 (オーダ用) *:6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day8<br>エリブリンメシル酸塩静注液 1mg「日医工」:1.4mg/ml Day1 Day8<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1   | 乳腺外科    |
| H+PER+VNR 初回                        | 8        | 13       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day8<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ポラミン注 5mg 1mL:1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4.20mg / 1.4mL:840mg Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL:1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day9<br>ロゼウス静注液 1.00mg / 1mL :25mg/ml Day1 Day8<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day8<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1              | 乳腺外科    |
| H+PER+VNR 2回目以降                     | 8        | 13       | 大塚生食注 1.00mL:1瓶 Day1 Day8<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2.50mL:1袋 Day1<br>パージェタ点滴静注 4.20mg / 1.4mL:420mg Day1<br>大塚蒸留水 1.00mL:1瓶 Day1<br>ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5.0mL:1瓶 Day1 Day8<br>ロゼウス静注液 1.00mg / 1mL :25mg/ml Day1 Day8<br>(ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1  | 乳腺外科    |

| レジメン名                              | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種 |
|------------------------------------|----------|----------|---|---------|
| H (BS セルトリオン)+PER+VNR 初回           | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>テート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :840mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツスマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) *:8mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m l :25mg/ml Day1 Day8<br>テート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day8<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1  | 乳腺外科    |
| H (BS セルトリオン)+PER+VNR 2回目以降        | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>テート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パーゼタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l :420mg Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラスツスマブBS点滴静注用「C T H」(オーダ用) *:6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ロゼウス静注液 1 0 m g / 1 m l :25mg/ml Day1 Day8<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day1  | 乳腺外科    |
| フェスゴ【初回】                           | 1        | 20       | フェスゴ配合皮下注IN (15mL/瓶) *:1瓶 Day1<br>生食注 2 0 m l :1A Day1  | 乳腺外科    |
| フェスゴ【2回目以降】                        | 1        | 20       | フェスゴ配合皮下注MA (10mL/瓶) *:1瓶 Day1<br>生食注 2 0 m l :1A Day1  | 乳腺外科    |
| カドサイラ+前投薬                          | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>テート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>カドサイラ点滴静注用(オーダ用) *:3.6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| カドサイラ(前投薬なし)                       | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>カドサイラ点滴静注用(オーダ用) *:3.6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| Enhertu【抗Her2初回】[パロ/セトロン+DEX]      | 1        | 20       | ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1   | 乳腺外科    |
| Enhertu【抗Her2初回】[アロカリス+Gla3mg+DEX] | 1        | 20       | ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>クラニセトロン静注液 3 m g シリンジ「サウイ」:1筒 Day1<br>テート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1  | 乳腺外科    |
| Enhertu【パロ/セトロン+DEX】               | 1        | 20       | ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>テート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1   | 乳腺外科    |
| Enhertu【アロカリス+Gla3mg+DEX】          | 1        | 20       | ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>クラニセトロン静注液 3 m g シリンジ「サウイ」:1筒 Day1<br>テート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1<br>エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1  | 乳腺外科    |
| Bevacizumab (BS)                   | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ベシズマブBS点滴静注(オーダ用) :10m g /kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| Bev+wPTX 初回【Bev BS】                | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ベシズマブBS点滴静注(オーダ用) :10m g /kg Day1 Day15<br>テート注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>テート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>ファミチジン静注液20mg「サウイ」(20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:90m g /ml Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15<br>テート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day8 Day15 | 乳腺外科    |
| Bev+wPTX 2回目以降【Bev BS】             | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ベシズマブBS点滴静注(オーダ用) :10m g /kg Day1 Day15<br>テート注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>ファミチジン静注液20mg「サウイ」(20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:90m g /ml Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15   | 乳腺外科    |
| 転移・再発 Pembrolizumab                | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l *:200m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |

| レジメン名                           | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種 |
|---------------------------------|----------|----------|--|---------|
| 転移再発：Pembro+PTX (2剤投与日) (初回)    | 1        | 6        | (ドック用)ヘリオンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>デキサメタゾン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当) : 1A Day1<br>フアモジジン静注20mg「ザワイ」 (20mL/A) : 1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>バクリタキセル注 (オーダ用) : 80mg / ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1  | 乳腺外科    |
| 転移再発：Pembro+PTX (2剤投与日) (2回目以降) | 1        | 6        | (ドック用)ヘリオンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1<br>デキサメタゾン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当) : 2A Day1<br>フアモジジン静注20mg「ザワイ」 (20mL/A) : 1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>バクリタキセル注 (オーダ用) : 80mg / ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1  | 乳腺外科    |
| 転移再発：Pembro+PTX (PTXのみ)         | 1        | 6        | (ドック用)ヘリオンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当) : 2A Day1<br>フアモジジン静注20mg「ザワイ」 (20mL/A) : 1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>バクリタキセル注 (オーダ用) : 80mg / ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1  | 乳腺外科    |
| 転移再発：Pembro+PTX (Pembroのみ)      | 1        | 6        | (ドック用)ヘリオンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1   | 乳腺外科    |
| 転移再発：Pembro+w-nabPTX (2剤投与日)    | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1<br>アラキサン点滴静注用 1 0 0 m g : 100mg/ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ドック用)ヘリオンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| 転移再発：Pembro+w-nabPTX (nabPTXのみ) | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>アラキサン点滴静注用 1 0 0 m g : 100mg/ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1   | 乳腺外科    |
| 転移再発：Pembro+nabPTX (Pembroのみ)   | 1        | 6        | (ドック用)ヘリオンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1   | 乳腺外科    |
| 転移再発：Pembro+GEM+Carbo           | 8        | 13       | 大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8<br>(ドック用)ヘリオンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1 Day8<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day8 Day1<br>バクリタキセル注0.75mg/5mL「タイホリ」: 1瓶 Day8 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day8 Day1<br>デキサメタゾン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当) : 1A Day8 Day1<br>グルココルチゾン点滴静注「NK」 (オーダ用) : 1000mg / ml Day8 Day1<br>大塚生食注 5 % 1 0 0 m l : 1 瓶 Day8 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day8 Day1<br>カルボプラチン点滴静注 (オーダ用) : 0mg / A Day8 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1  | 乳腺外科    |
| 周期期 Pembro+PTX+Cb1.5            | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day8 Day15<br>グラネセロン点滴静注バッグ3mg / 1 0 0 m l [HK] : 1袋 Day8 Day15<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day8 Day15<br>フアモジジン静注20mg「ザワイ」 (20mL/A) : 1A Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day8 Day15<br>バクリタキセル注 (オーダ用) : 80mg / ml Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注 (オーダ用) : 0mg / A Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l : 1 袋 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day8 Day15<br>(ドック用)ヘリオンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day15<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1 | 乳腺外科    |
| 周期期 Pembro+EC [アロカス]            | 1        | 20       | (ドック用)ヘリオンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1<br>アロカス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>バクリタキセル注0.75mg/5mL「タイホリ」: 1瓶 Day1<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1<br>エビリン酸塩注射液「NK」(オーダ用) : 90mg / ml Day1<br>大塚生食注 5 % 1 0 0 m l : 1 0 m l Day1<br>デキサメタゾン注射液1.65mg (リ酸塩2mg相当) : 1A Day1<br>エンドキサン (C P A) 注 5 0 0 m g : 600m g / ml Day1   | 乳腺外科    |
| 周期期 Pembro200mg                 | 1        | 20       | (ドック用)ヘリオンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * : 200m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1   | 乳腺外科    |
| Atezolizumab                    | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1<br>テセントリク点滴静注 8 4 0 m g / 1 4 m L * : 840m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>(ドック用)ヘリオンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| Atezo+w-nabPTX+前投薬              | 15       | 13       | 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 Day15<br>テセントリク点滴静注 8 4 0 m g / 1 4 m L * : 840m g Day1 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>バクリタキセル注0.75mg/5mL「タイホリ」: 1瓶 Day1 Day8 Day15<br>デキサメタゾン注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1V Day1 Day8 Day15<br>アラキサン点滴静注用 1 0 0 m g : 100mg/ml Day1 Day15 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>(ドック用)ヘリオンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day15   | 乳腺外科    |
| Atezo+w-nabPTX (前投薬なし)          | 15       | 13       | 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l : 1 袋 Day1 Day15<br>テセントリク点滴静注 8 4 0 m g / 1 4 m L * : 840m g Day1 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>アラキサン点滴静注用 1 0 0 m g : 100mg/ml Day1 Day15 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1 Day8 Day15<br>(ドック用)ヘリオンNa100単位/mLシリンジ「ネオ」10mL:1筒 Day8 Day15  | 乳腺外科    |

| レジメン名                        | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種 |
|------------------------------|----------|----------|---|---------|
| サシズマブ コビテカン (トロデルビ) 療法       | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>アロカシ点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 Day8<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8<br>フチチ注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>フアモチジン静注液20mg「サウイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8<br>トロデルビ点滴静注用200mg* :10m g /kg Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>(ロク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1 Day8 | 乳腺外科    |
| Zoladex 3M毎                  | 1        | 77       | ゾラデックスL A 1 0 . 8 m gデボ:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| Zoladex 1M毎                  | 1        | 20       | ゾラデックス 3 . 6 m gデボ:1A Day1  | 乳腺外科    |
| Leuprorelin 6M毎              | 1        | 161      | リュープリンP R O注射用キット 2 2 . 5 m g :1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| Leuprorelin 3M毎              | 1        | 77       | リュープリンS Rキット 1 1 . 2 5 m g :1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| Fasolodex                    | 1        | 20       | フェノロデックス筋注 2 5 0 m g / 5 m l :2筒 Day1   | 乳腺外科    |
| Fasolodex+Zol 1M             | 1        | 20       | フェノロデックス筋注 2 5 0 m g / 5 m l :2筒 Day1<br>ゾラデックス 3 . 6 m gデボ:1A Day1   | 乳腺外科    |
| Fasolodex+Zol 3M             | 1        | 20       | フェノロデックス筋注 2 5 0 m g / 5 m l :2筒 Day1<br>ゾラデックスL A 1 0 . 8 m gデボ:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| Fasolodex+Leup 3M            | 1        | 20       | フェノロデックス筋注 2 5 0 m g / 5 m l :2筒 Day1<br>リュープリンS Rキット 1 1 . 2 5 m g :1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| Zometa                       | 1        | 17       | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「ツグ」KCCJ:1袋 Day1   | 乳腺外科    |
| Zometa(高Ca血症)                | 1        | 9        | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「ツグ」KCCJ:1袋 Day1   | 乳腺外科    |
| Ranmark                      | 1        | 17       | ランマーク皮下注 1 2 0 m g :1瓶 Day1   | 乳腺外科    |
| ペグフィルグラスチム (ジ-ラスタブS)         | 1        | 11       | ペグフィルグラスチムB S皮下注 3 . 6 m g「モチダ」:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| ジ-ラスタブbody pod               | 1        | 11       | ジ-ラスタブ皮下注3.6mgポニーポッド * :1サト Day1  | 乳腺外科    |
| フィルグラスチム                     | 1        | 0        | フィルグラスチムB S注 7 5 μ g シリンジ「F」:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| ポートフラッシュ                     | 1        | 0        | (ロク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| E7389 リボソム製剤                 | 1        | 18       | 大塚生食注ソフトバグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)E7389製剤1mg/5mL:2.3mg/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>フアモチジン静注液20mg「サウイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>フチチ注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 乳腺外科    |
| KL009 MK3475+Gem+Carbo       | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>治)MK3475(100mg/4mL)[20190015]:200mg Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>フチチ注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>治)Gemcitabine(1000mg/V)[20190015]:1000mg/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>治)加味ア-リン(450mg/45mL)[20190015]:0mg/A Day1  | 乳腺外科    |
| KL009 MK3475                 | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>治)MK3475(100mg/4mL)[20190015]:200mg Day1  | 乳腺外科    |
| KL009 Gem+Carbo              | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>フチチ注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>治)Gemcitabine(1000mg/V)[20190015]:1000mg/m Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>治)加味ア-リン(450mg/45mL)[20190015]:0mg/A Day1  | 乳腺外科    |
| 加味ア-リン「ア-リン」+フルベストラント        | 1        | 9        | 治)Fulvestrant(5mL)[20200002]:2筒 Day1  | 乳腺外科    |
| U305 加チチ前投薬                  | 1        | 17       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>フチチ注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :1A Day1<br>治)トリスチマ- 100mg[20200018]:3.6mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 乳腺外科    |
| U305 加チチ                     | 1        | 17       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :1A Day1<br>治)トリスチマ- 100mg[20200018]:3.6mg/kg Day1  | 乳腺外科    |
| U305 DS8201 初回               | 1        | 17       | 大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>フチチ注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>治)DS-8201a 100mg[20200018]:5.4mg/kg Day1<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :1A Day1   | 乳腺外科    |
| U305 D S 8201 2回目以降          | 1        | 17       | 大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :1A Day1<br>治)DS-8201a 100mg[20200018]:5.4mg/kg Day1  | 乳腺外科    |
| U305 D S 8201+前投薬 (制吐剤)      | 1        | 17       | 大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>グラニセトロン静注液 3 m g シリンジ「サウイ」:1筒 Day1<br>フチチ注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l :1A Day1<br>治)DS-8201a 100mg[20200018]:5.4mg/kg Day1   | 乳腺外科    |
| A群 : PTX+BEV 初回 : JCOG1919   | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>フチチ注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>フチチ注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>フアモチジン静注液20mg「サウイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パロ/タキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」:90m g / m l Day1<br>アスチン点滴静注用 (オ-ダ用) :10m g /kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1                            | 乳腺外科    |
| A群 : PTX+BEV 2回目~ : JCOG1919 | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>フチチ注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>フアモチジン静注液20mg「サウイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>パロ/タキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l「NK」:90m g / m l Day1<br>アスチン点滴静注用 (オ-ダ用) :10m g /kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロク用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |



| レジメン名                           | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種 |
|---------------------------------|----------|----------|--|---------|
| B群：PTX+BEV+Atezo 初回：JCOG1919    | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)アパ)リア)マ)注(840mg/14mL)[20200021]:840mg Day1<br>ア)チ)ト)注)射)液)6.6mg (リ)酸)塩)8mg)相当):1V Day1<br>ア)チ)ト)注)射)液)1.65mg(リ)酸)塩)2mg)相当):1A Day1<br>ア)モ)チ)ン)静)注)液)20m g「サ)ワ)イ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボ)ラ)ミ)ン)注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>バ)ク)リ)タ)キ)セ)ル)注)1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:90m g/m Day1<br>ア)バ)ス)チ)ン)点)滴)静)注)用 (オ)ー)ダ)用) :10m g /kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロ)ク)用)ヘ)リ)ン)Na100単位/mLシ)リ)ン)「オ)キ)」10mL:1筒 Day1  | 乳腺外科    |
| B群：PTX+BEV+Atezo 2回目～：JCOG1919  | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>治)ア)パ)リア)マ)注(840mg/14mL)[20200021]:840mg Day1<br>ア)チ)ト)注)射)液)1.65mg(リ)酸)塩)2mg)相当):1A Day1<br>ア)モ)チ)ン)静)注)液)20m g「サ)ワ)イ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボ)ラ)ミ)ン)注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>バ)ク)リ)タ)キ)セ)ル)注)1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:90m g/m Day1<br>ア)バ)ス)チ)ン)点)滴)静)注)用 (オ)ー)ダ)用) :10m g /kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロ)ク)用)ヘ)リ)ン)Na100単位/mLシ)リ)ン)「オ)キ)」10mL:1筒 Day1   | 乳腺外科    |
| FourLight フルベストラント              | 1        | 9        | 治)Fulvestrant 250 mg/5 mL[20230026]:2筒 Day1  | 乳腺外科    |
| Gemcitabine+Carb 2AUC (21日レジメン) | 8        | 13       | 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8<br>カルボプラチン点滴静注液 (オ)ー)ダ)用) :0m g /A Day1 Day8<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>バ)ロ)セ)ト)ロ)ン)静)注)0.75mg/5mL「タ)イ)ホ)リ」:1瓶 Day1 Day8<br>ア)チ)ト)注)射)液)6.6mg (リ)酸)塩)8mg)相当):1V Day1 Day8<br>ゲ)ム)シ)タ)ビ)ン)点)滴)静)注)液「N)K)」 (オ)ー)ダ)用) :1000m g/m Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>(ロ)ク)用)ヘ)リ)ン)Na100単位/mLシ)リ)ン)「オ)キ)」10mL:1筒 Day1 Day8  | 乳腺外科    |
| Gemcitabine+Carb 5AUC (21日レジメン) | 8        | 13       | 大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オ)ー)ダ)用) :0m g /A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>バ)ロ)セ)ト)ロ)ン)静)注)0.75mg/5mL「タ)イ)ホ)リ」:1瓶 Day1<br>ア)チ)ト)注)射)液)6.6mg (リ)酸)塩)8mg)相当):1V Day1 Day8<br>ゲ)ム)シ)タ)ビ)ン)点)滴)静)注)液「N)K)」 (オ)ー)ダ)用) :1000m g/m Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>(ロ)ク)用)ヘ)リ)ン)Na100単位/mLシ)リ)ン)「オ)キ)」10mL:1筒 Day1 Day8   | 乳腺外科    |
| 周期期 Pembro+PTX+Cb1.5            | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day15<br>グラ)ニ)セ)ト)ロ)ン)点)滴)静)注)バ)ツ)ク)3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day8 Day15<br>ア)チ)ト)注)射)液)6.6mg (リ)酸)塩)8mg)相当):1V Day8 Day15<br>ア)モ)チ)ン)静)注)液)20m g「サ)ワ)イ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15<br>ボ)ラ)ミ)ン)注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day15<br>バ)ク)リ)タ)キ)セ)ル)注)1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g/m Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液 (オ)ー)ダ)用) :0m g /A Day8 Day15<br>ブ)ド)ウ)糖)注)射)液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15<br>(ロ)ク)用)ヘ)リ)ン)Na100単位/mLシ)リ)ン)「オ)キ)」10mL:1筒 Day8 Day15<br>キ)イ)ト)ル)ー)ダ)点)滴)静)注)1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1  | 乳腺外科    |
| 転移再発：Pembro+PTX (2剤投与日) (初回)    | 1        | 6        | (ロ)ク)用)ヘ)リ)ン)Na100単位/mLシ)リ)ン)「オ)キ)」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>キ)イ)ト)ル)ー)ダ)点)滴)静)注)1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1<br>ア)チ)ト)注)射)液)6.6mg (リ)酸)塩)8mg)相当):1V Day1<br>ア)チ)ト)注)射)液)1.65mg(リ)酸)塩)2mg)相当):1A Day1<br>ア)モ)チ)ン)静)注)液)20m g「サ)ワ)イ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボ)ラ)ミ)ン)注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>バ)ク)リ)タ)キ)セ)ル)注)1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 乳腺外科    |
| 転移再発：Pembro+PTX (2剤投与日) (2回目以降) | 1        | 6        | (ロ)ク)用)ヘ)リ)ン)Na100単位/mLシ)リ)ン)「オ)キ)」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>キ)イ)ト)ル)ー)ダ)点)滴)静)注)1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1<br>ア)チ)ト)注)射)液)1.65mg(リ)酸)塩)2mg)相当):2A Day1<br>ア)モ)チ)ン)静)注)液)20m g「サ)ワ)イ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボ)ラ)ミ)ン)注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>バ)ク)リ)タ)キ)セ)ル)注)1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 乳腺外科    |
| 転移再発：Pembro+PTX (PTXのみ)         | 1        | 6        | (ロ)ク)用)ヘ)リ)ン)Na100単位/mLシ)リ)ン)「オ)キ)」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ア)チ)ト)注)射)液)1.65mg(リ)酸)塩)2mg)相当):2A Day1<br>ア)モ)チ)ン)静)注)液)20m g「サ)ワ)イ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボ)ラ)ミ)ン)注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>バ)ク)リ)タ)キ)セ)ル)注)1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 乳腺外科    |
| HD-MTX                          | 1        | 13       | 生)理)食)塩)液「ヒ)カ)リ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>注)射)用)メ)ソ)ト)レ)キ)セ)ト (オ)ー)ダ)用) :5000m g/m Day1   | 脳神経外科   |
| ア)バ)ス)チ)ン)10mg/kg               | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ア)バ)ス)チ)ン)点)滴)静)注)用 (オ)ー)ダ)用) :10m g /kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 脳神経外科   |
| ア)バ)ス)チ)ン)15mg/kg               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ア)バ)ス)チ)ン)点)滴)静)注)用 (オ)ー)ダ)用) :15m g /kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 脳神経外科   |
| テ)モ)ソ)ロ)ミ)ド)75mg/mi+RT併用療法      | 42       | 28       | バ)ロ)セ)ト)ロ)ン)静)注)0.75mg/5mL「タ)イ)ホ)リ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day4 Day5 Day6 Day7 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day4 Day5 Day6 Day7 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42<br>テ)モ)ソ)ロ)ミ)ド)点)滴)静)注)用 1 0 0 m g * :75mg/m Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day4 Day5 Day6 Day7 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day4 Day5 Day6 Day7 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 | 脳神経外科   |

| レジメン名                    | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種         |
|--------------------------|----------|----------|--|-----------------|
| Docetaxel,estramustine療法 | 1        | 20       | グラニセトロン点滴静注「バグ」3mg/100mL「HK」:1袋 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>7-チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :50mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1   | 泌尿器科/1. 前立腺がん   |
| カバジタキセル (入院用)            | 1        | 20       | 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>7-チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5mg1mL:1A Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1<br>シュブタン点滴静注60mg/1.5mL * :25mg/m <sup>2</sup> Day1   | 泌尿器科/1. 前立腺がん   |
| カバジタキセル (外来用)            | 1        | 20       | 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>7-チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5mg1mL:1A Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1<br>シュブタン点滴静注60mg/1.5mL * :25mg/m <sup>2</sup> Day1   | 泌尿器科/1. 前立腺がん   |
| ドセタキセル                   | 1        | 20       | 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :70mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1   | 泌尿器科/1. 前立腺がん   |
| ゲロルタミド+ドセタキセル併用療法        | 1        | 20       | 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用) :75mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1<br>7-チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1   | 泌尿器科/1. 前立腺がん   |
| ECb (イトキッド+カキルアラフ) 併用療法  | 3        | 18       | 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>グラニセトロン点滴静注「バグ」3mg/100mL「HK」:100mL Day1 Day2 Day3<br>7-チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3<br>生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3<br>イトキッド点滴静注液100mg「カド」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>ブドウ糖注射液 5%250mL:1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day1<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3   | 泌尿器科/2. 前立腺小細胞癌 |
| EP (イトキッド+カキルアラフ) 併用療法   | 3        | 18       | 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>7-チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3<br>7-チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホリ」:1瓶 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3<br>イトキッド点滴静注液100mg「カド」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>(GE-リカ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1<br>硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A) :0.4A Day1<br>マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1<br>ソルデム3A輸液200mL:1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :80mg/m <sup>2</sup> Day1   | 泌尿器科/2. 前立腺小細胞癌 |
| GC(3週 short hydration)   | 8        | 13       | 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day8<br>7-チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8<br>大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホリ」:1瓶 Day2<br>7-チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day2<br>生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2<br>硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A) :8ml Day2<br>マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day2<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :70mg/m <sup>2</sup> Day2<br>(GE-リカ)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day2<br>ランククス注 20mg2mL:1A Day2   | 泌尿器科/3. 尿路上皮癌   |
| GC(3週毎)                  | 8        | 13       | 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day8<br>7-チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8<br>大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8<br>(GE-リカ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1<br>ソリアセトF輸液1L:1袋 Day2<br>(GE-リカ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day2<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホリ」:1瓶 Day2<br>7-チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day2<br>生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2<br>硫酸Mg 補正液 1mEq/mL (20mL/A) :8ml Day2<br>マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day2<br>生理食塩液「バグ」フソ-1 1L:1袋 Day2<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :70mg/m <sup>2</sup> Day2<br>(GE-リカ)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day2<br>ランククス注 20mg2mL:1A Day2<br>(GE-リカ)ソルデム1輸液200mL:1瓶 Day8  | 泌尿器科/3. 尿路上皮癌   |
| M-VAC療法                  | 22       | 6        | 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day15 Day22<br>ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day2 Day15 Day22<br>大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day15 Day22<br>7-チート注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day15 Day22<br>注射用メトトレキサート 50mg:30mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day22<br>(GE-リカ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1<br>生理食塩液「バグ」フソ-1 1L:1袋 Day2<br>バロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホリ」:1瓶 Day2<br>7-チート注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day2<br>大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day15 Day22<br>トキソリン酸塩注射液 (オーダ用) :30mg/m <sup>2</sup> Day2<br>エカザール (VB L) 10mg:3mg/m <sup>2</sup> Day2 Day15 Day22<br>(GE-リカ)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day2<br>マンニトールS注射液300mL:300mL Day2<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :70mg/m <sup>2</sup> Day2<br>(GE-リカ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day2 Day15 Day22<br>ランククス注 20mg2mL:1A Day2 | 泌尿器科/3. 尿路上皮癌   |

| レジメン名                           | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種       |
|---------------------------------|----------|----------|--|---------------|
| アベルマブ維持療法                       | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>パベンチオ点滴静注200m g * :10m g/kg Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1   | 泌尿器科/3. 尿路上皮癌 |
| パドセブ療法                          | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾍﾞｰｼﾞｰ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パドセブ点滴静注用 (ﾛｰﾄﾞ用) :1.25m g/kg Day1 Day8 Day15  | 泌尿器科/3. 尿路上皮癌 |
| ヘムブロシズマブ+エンホルツマブパドチン療法          | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ﾍﾞｰｼﾞｰ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>大塚蒸留水 1 0 0 m l (抗がん剤調製用) :1瓶 Day8 Day1<br>パドセブ点滴静注用 (ﾛｰﾄﾞ用) :1.25m g/kg Day8 Day1   | 泌尿器科/3. 尿路上皮癌 |
| ヘムブロシズマブ療法 [q3w]                | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1  | 泌尿器科/3. 尿路上皮癌 |
| ヘムブロシズマブ療法 [q6W]                | 1        | 41       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :400m g Day1  | 泌尿器科/3. 尿路上皮癌 |
| 術後ニボルマブ療法 [q2W]                 | 1        | 13       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>オブジーホ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m l * :240m g Day1  | 泌尿器科/3. 尿路上皮癌 |
| 術後ニボルマブ療法 [q4W]                 | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>オブジーホ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m l * :480m g Day1  | 泌尿器科/3. 尿路上皮癌 |
| ｶﾞﾓｼﾞﾝ/ｶﾙﾌﾟﾗﾝﾁﾝ療法               | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ﾍﾞｰｼﾞｰ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ8mg相当) :1V Day8<br>ｸﾞﾓｼﾞﾝ点滴静注液「NK」 (ﾛｰﾄﾞ用) :1000m g/ml Day8 Day1<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1<br>ｸﾞﾗﾈﾄﾞﾛﾝ点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1<br>ﾍﾞｰｼﾞｰ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ2mg相当):2A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ｶﾙﾌﾟﾗﾝﾁﾝ点滴静注液 (ﾛｰﾄﾞ用) :0m g/A Day1   | 泌尿器科/3. 尿路上皮癌 |
| ｸﾞﾓｼﾞﾝ/ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ併用療法             | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾍﾞｰｼﾞｰ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ8mg相当) :3V Day1<br>ﾌﾞﾗﾓｼﾞﾝ点滴静注液20m g「ｻｲﾄﾞ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>生理食塩液「ﾋﾞｶﾘ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:200m g/ml Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ｸﾞﾓｼﾞﾝ点滴静注液「NK」 (ﾛｰﾄﾞ用) :1000m g/ml Day1 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾍﾞｰｼﾞｰ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ8mg相当) :1V Day8 Day15          | 泌尿器科/3. 尿路上皮癌 |
| ｸﾞﾓｼﾞﾝ/ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ併用療法 [透析症例]      | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15<br>ﾍﾞｰｼﾞｰ注射液6.6mg (ｼﾞﾝｸﾞ8mg相当) :1V Day1 Day15<br>ﾍﾞｰｼﾞｰ注射液1.65mg(ｼﾞﾝｸﾞ2mg相当):1A Day1 Day15<br>ﾌﾞﾗﾓｼﾞﾝ点滴静注液20m g「ｻｲﾄﾞ」 (20mL/A) :1A Day1 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day15<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day15<br>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:110m g/ml Day1 Day15<br>ｸﾞﾓｼﾞﾝ点滴静注液「NK」 (ﾛｰﾄﾞ用) :1000m g/ml Day1 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 | 泌尿器科/3. 尿路上皮癌 |
| ｶﾎﾞｻﾞﾝﾁﾆﾌﾞ・ﾆﾎﾙﾏﾌﾞ併用療法 (q2W)     | 1        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>オブジーホ点滴静注 2 4 0 m g / 2 4 m l :240m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |
| ｶﾎﾞｻﾞﾝﾁﾆﾌﾞ・ﾆﾎﾙﾏﾌﾞ併用療法 [q4W]     | 1        | 27       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>オブジーホ点滴静注 2 4 0 m g / 2 4 m l :480m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |
| ﾃﾞﾑｼﾞﾝ単剤療法                      | 1        | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ﾄｰﾘｾﾙ点滴静注液 2 5 m g * :25m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |
| ニボルマブ療法(腎癌)[q2W]                | 1        | 13       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>オブジーホ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m l * :240m g Day1  | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |
| ニボルマブ療法(腎癌)[q4W]                | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>オブジーホ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m l * :480m g Day1  | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |
| ヘムブロシズマブ・ｱｷｼﾆﾁﾌﾞ併用療法 (q3W)      | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1  | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |
| ヘムブロシズマブ・ｱｷｼﾆﾁﾌﾞ併用療法 [q6W]      | 1        | 41       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :400m g Day1  | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |
| ヘムブロシズマブ・ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ療法 (q3W)       | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1  | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |
| ヘムブロシズマブ・ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ療法 [q6W]       | 1        | 41       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :400m g Day1  | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |
| (ﾐﾈﾗﾙ)併用療法 53-1目以降) ニボルマブ [q4w] | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>オブジーホ点滴静注用 2 4 0 m g / 2 4 m l * :480m g Day1  | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |

| レジメン名  | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種       |
|--|----------|----------|---|---------------|
| (C <sup>16</sup> -化 <sup>16</sup> 併用療法 53-1目以降) ニボルマブ【q2w】 | 1        | 13       | 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>オプジーボ点滴静注用 2.40mg/2.4mL *:240mg Day1  | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |
| ニボルマブ・イピリムマ併用療法  | 1        | 20       | 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>オプジーボ点滴静注用 2.40mg/2.4mL *:240mg Day1<br>大塚生食注 50ml:0.4瓶 Day1<br>ヤーポイ点滴静注液(オード用) *:1mg/kg Day1   | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |
| (術後補助)ヘムプロシズマブ療法【q3W】                                      | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1.00mg/4mL *:200mg Day1  | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |
| (術後補助)ヘムプロシズマブ療法【q6W】                                      | 1        | 41       | 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1.00mg/4mL *:400mg Day1  | 泌尿器科/4. 腎細胞癌  |
| CBDCA併用放射線療法   | 1        | 6        | グラニセトロン点滴静注(バッグ) 3mg/100mL【HKJ】:1袋 Day1<br>テ <sup>18</sup> チト注射液6.6mg (リ <sup>18</sup> 酸塩8mg相当):1V Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250ml:1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液(オード用):0mg/A Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1   | 泌尿器科/5. 膀胱癌   |
| CDDP併用放射線療法  | 5        | 16       | ソリアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>グラニセトロン点滴静注(バッグ) 3mg/100mL【HKJ】:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>テ <sup>18</sup> チト注射液1.65mg(リ <sup>18</sup> 酸塩2mg相当):1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>(GE-リ <sup>18</sup> カ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>(GE-リ <sup>18</sup> カ)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4<br>生理食塩液【ヒカリ】 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>シスプラチン点滴静注【マルコ】(オード用):20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5   | 泌尿器科/5. 膀胱癌   |
| Docetaxel,Gemcitabine併用療法                                  | 8        | 13       | グラニセトロン点滴静注(バッグ) 3mg/100mL【HKJ】:1袋 Day1 Day8<br>テ <sup>18</sup> チト注射液6.6mg (リ <sup>18</sup> 酸塩8mg相当):1V Day1<br>グムシタピン点滴静注【NKJ】(オード用):800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8<br>大塚生食注 500mL:1瓶 Day1 Day8<br>テ <sup>18</sup> チト注射液6.6mg (リ <sup>18</sup> 酸塩8mg相当):3V Day8<br>ブドウ糖注射液 5% 250ml:1瓶 Day8<br>ドセタキセル点滴静注【ニプロ】(オード用):60mg/m <sup>2</sup> Day8<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8   | 泌尿器科/5. 膀胱癌   |
| BEP療法(必)   | 16       | 5        | ソリアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day16 Day9<br>生理食塩液【ヒカリ】 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>イトボシ点滴静注液 100mg【カト】5ml:100mg/g/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>(GE-リ <sup>18</sup> カ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day16 Day9<br>シスプラチン点滴静注【マルコ】(オード用):20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day16 Day9<br>ラシックス注 20mg 2ml:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>(GE-リ <sup>18</sup> カ)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>フレオ(Bleo)注 15mg *:30mg Day2 Day16 Day9<br>グラニセトロン点滴静注 3mg シリンジ【サウイ】:1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>フアモチジン点滴静注20mg【サウイ】(20mL/A):1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>テ <sup>18</sup> チト注射液6.6mg (リ <sup>18</sup> 酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day9 Day16  | 泌尿器科/6. 精巣腫瘍  |
| TIN療法  | 7        | 21       | (GE-リ <sup>18</sup> カ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day7 Day3 Day4 Day5 Day6 Day1<br>ソリアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day7 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>(GE-リ <sup>18</sup> カ)ソルデム1輸液 500mL:1瓶 Day7 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>生理食塩液【ヒカリ】 500mL:1袋 Day2 Day1<br>アウフラ注(オード用):100mg/m <sup>2</sup> Day2<br>大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 Day2<br>イホマイド(IFX)注射用 1g:1200mg/m <sup>2</sup> Day3 Day4 Day5 Day6 Day2<br>グラニセトロン点滴静注(バッグ) 3mg/100mL【HKJ】:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>フアモチジン点滴静注20mg【サウイ】(20mL/A):1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>テ <sup>18</sup> チト注射液6.6mg (リ <sup>18</sup> 酸塩8mg相当):3V Day1<br>バクリタキセル注 100mg/16.7ml【NKJ】:210mg/m <sup>2</sup> Day1<br>(GE-リ <sup>18</sup> カ)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1<br>テ <sup>18</sup> チト注射液6.6mg (リ <sup>18</sup> 酸塩8mg相当):1V Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day1<br>ラシックス注 20mg 2ml:0.5A Day2<br>ウミシキサン注 400mg 4ml:1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 | 泌尿器科/6. 精巣腫瘍  |
| カルボプラチン療法  | 1        | 1        | グラニセトロン点滴静注(バッグ) 3mg/100mL【HKJ】:1袋 Day1<br>テ <sup>18</sup> チト注射液1.65mg(リ <sup>18</sup> 酸塩2mg相当):3A Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250ml:1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液(オード用):0mg/A Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1   | 泌尿器科/6. 精巣腫瘍  |
| TIP療法【泌尿器】   | 4        | 17       | ソリアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>パロセトロン点滴静注0.75mg/5mL【タイホウ】:1瓶 Day1<br>テ <sup>18</sup> チト注射液6.6mg (リ <sup>18</sup> 酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3<br>フアモチジン点滴静注20mg【サウイ】(20mL/A):1A Day1<br>ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1<br>生理食塩液【ヒカリ】 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3<br>バクリタキセル注 100mg/16.7ml【NKJ】:175mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day2 Day3<br>シスプラチン点滴静注【マルコ】(オード用):25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>マンニトールS注射用 300ml:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>イホマイド(IFX)注射用 1g:1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>ウミシキサン注 400mg 4ml:1A Day1 Day2 Day3<br>(GE-リ <sup>18</sup> カ)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 Day2 Day3<br>(GE-リ <sup>18</sup> カ)ソルデム1輸液 500mL:1瓶 Day4   | 泌尿器科/7. 陰茎癌   |
| CVD療法  | 2        | 19       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2<br>テ <sup>18</sup> チト注射液6.6mg (リ <sup>18</sup> 酸塩8mg相当):1V Day1<br>テ <sup>18</sup> チト注射液1.65mg(リ <sup>18</sup> 酸塩2mg相当):2A Day1<br>パロセトロン点滴静注0.75mg/5mL【タイホウ】:1瓶 Day1<br>ボノコピン(VCR)注 1mg:1.4mg/g/m <sup>2</sup> Day1<br>ソルデム3A輸液 200ml:1袋 Day1<br>エンドキサン注(オード用):750mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注射液 5% 250ml:1瓶 Day1 Day2<br>ダカルバジン注 100mg:600mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2<br>大塚生食注 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 Day2   | 泌尿器科/8. 褐色細胞腫 |

| レジメン名                                  | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種         |
|--|----------|----------|--|-----------------|
| トキソリン単剤療法                              | 1        | 20       | 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾙｶﾞﾝ2mg相当):2A Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾙｶﾞﾝ8mg相当):1V Day1<br>ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1<br>トキソリン塩酸塩注射液 (オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1  | 泌尿器科/9. 軟部肉腫    |
| EP (ﾄｷﾞﾄﾞ+ｼﾞﾙｶﾞﾝ併用)療法                  | 3        | 18       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾙｶﾞﾝ8mg相当):1V Day1 Day2 Day3<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾙｶﾞﾝ2mg相当):2A Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>生理食塩液[ヒカリ] 500ml:1袋 Day1 Day2 Day3<br>エトホシ点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>(GE-ｼﾞﾙｶﾞﾝ)ｼﾙﾃﾞﾑ3 A輸液 500ml:1袋 Day1<br>硫酸Mg 補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1<br>マンニトールS注射液 300ml:1瓶 Day1<br>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注[マルｺ] (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ｼﾙﾃﾞﾑ3 A輸液 200ml:1袋 Day1   | 泌尿器科/A.尿路原発小細胞癌 |
| ECb (ﾄｷﾞﾄﾞ+ｶﾙﾌﾟﾗﾁﾝ併用)療法                | 3        | 18       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>ｸﾗﾈﾄﾞ点滴静注[ﾊｯｸ]3mg/100ml [HK]:100ml Day1 Day2 Day3<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾙｶﾞﾝ2mg相当):2A Day1 Day2 Day3<br>生理食塩液[ヒカリ] 500ml:1袋 Day1 Day2 Day3<br>エトホシ点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>ブドウ糖注射液 5%250ml:1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3  | 泌尿器科/A.尿路原発小細胞癌 |
| ｱﾑﾙﾋﾞﾝ (ｶﾙセﾄ) 単剤治療                     | 3        | 18       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day1 Day3<br>ｶﾙセﾄ注射用 (オーダ用) *:45mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 Day3<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾙｶﾞﾝ8mg相当):1V Day1 Day2 Day3<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1  | 泌尿器科/A.尿路原発小細胞癌 |
| DAV Feron療法                            | 5        | 23       | ｸﾗﾈﾄﾞ点滴静注[ﾊｯｸ]3mg/100ml [HK]:1袋 Day1<br>ｼﾙｱセﾄF輸液 500ml/袋:1袋 Day1<br>大塚生食注 100ml:100ml Day1 Day4 Day2 Day3 Day5<br>ﾀｶﾙﾊﾞｼﾝ注 100mg:600mg/m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day2 Day3 Day5<br>生食注 20ml:20ml Day1<br>ﾈﾄﾗﾝ (ACNU) 注射用 50mg *:60mg Day1<br>ｵﾝｺﾋﾞﾝ (VCR) 注 1mg:0.6mg Day1<br>ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ点滴静注(溶解液付):5ml/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5   | 皮膚科/1. 悪性黒色腫    |
| DAC-Tam療法 (皮膚科)                        | 6        | 23       | (GE-ｼﾞﾙｶﾞﾝ)ｼﾙﾃﾞﾑ3 A輸液 500ml:2袋 Day1 Day5 Day6<br>ｸﾗﾈﾄﾞ点滴静注[ﾊｯｸ]3mg/100ml [HK]:100ml Day2 Day3 Day4<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day1<br>ﾀｶﾙﾊﾞｼﾝ注 100mg:220mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4<br>大塚蒸留水 (注射用水) 20ml:20ml Day2<br>ﾈﾄﾗﾝ (ACNU) 注射用 50mg *:60mg/m <sup>2</sup> Day2<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾙｶﾞﾝ8mg相当):1V Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾙｶﾞﾝ2mg相当):2A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>生理食塩液[ヒカリ] 500ml:1袋 Day2 Day3 Day4<br>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注[マルｺ] (オーダ用):25mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4<br>(GE-ｼﾞﾙｶﾞﾝ)ｼﾙﾃﾞﾑ3 A輸液 500ml:1袋 Day2 Day3 Day4<br>ｱﾀﾞｸﾞｽ- P注 25mg 1ml:2A Day2 Day3 Day4<br>(ﾛｯｸ用)ﾍﾞﾘﾝ/Na100単位/mLｼﾞﾙｶﾞﾝ[ﾌﾟﾗﾄﾞ]10mL:1筒 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ﾗｼﾞｯｸｽ注 20mg 2ml:1A Day5 Day6 | 皮膚科/1. 悪性黒色腫    |
| ﾀｶﾙﾊﾞｼﾝ                                | 1        | 20       | 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>ｱﾀﾞｸﾞｽ- P注 25mg 1ml:1A Day1<br>ｸﾗﾈﾄﾞ点滴静注[ﾊｯｸ]3mg/100ml [HK]:1袋 Day1<br>ｱﾛｶﾘｽ点滴静注 235mg:1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｼﾞﾙｶﾞﾝ8mg相当):1V Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｼﾞﾙｶﾞﾝ2mg相当):2A Day1<br>ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1<br>ﾀｶﾙﾊﾞｼﾝ注 100mg:1000mg/m <sup>2</sup> Day1<br>(GE-強ｼﾞﾙｶﾞﾝ)ﾈｵﾌﾟﾗﾌﾞﾞｰｼﾞﾝ静注 20ml:1A Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1  | 皮膚科/1. 悪性黒色腫    |
| ｺﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+ｲﾋﾞﾘﾑﾏﾌﾞ (第1~4ｼﾞｰｽ目)           | 1        | 20       | 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ﾎﾞﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1ml:1A Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾟ点滴静注 (オーダ用):80mg Day1<br>ﾔｰﾎﾟｲ点滴静注液 (オーダ用) *:3mg/kg Day1   | 皮膚科/1. 悪性黒色腫    |
| ｺﾎﾞﾙﾏﾌﾞ (ｺﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+ｲﾋﾞﾘﾑﾏﾌﾞ (第5ｼﾞｰｽ目以降)) | 1        | 13       | 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ﾎﾞﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1ml:1A Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾟ点滴静注 (オーダ用):240mg Day1   | 皮膚科/1. 悪性黒色腫    |
| ｲﾋﾞﾘﾑﾏﾌﾞ                               | 1        | 20       | 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ﾎﾞﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1ml:1A Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>ﾔｰﾎﾟｲ点滴静注液 (オーダ用) *:3mg/kg Day1  | 皮膚科/1. 悪性黒色腫    |
| ｺﾎﾞﾙﾏﾌﾞ[q2w]                           | 1        | 13       | 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ﾎﾞﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1ml:1A Day1<br>ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾟ点滴静注 (オーダ用):240mg Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1   | 皮膚科/1. 悪性黒色腫    |
| ｺﾎﾞﾙﾏﾌﾞ[q4w]                           | 1        | 27       | 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ﾎﾞﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1ml:1A Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾟ点滴静注 (オーダ用):480mg Day1   | 皮膚科/1. 悪性黒色腫    |
| ﾍﾞﾑﾌﾞﾛｼﾞﾝ (q3w)                        | 1        | 20       | 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ﾎﾞﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1ml:1A Day1<br>ｷｲﾄﾙ-ｸﾞ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1   | 皮膚科/1. 悪性黒色腫    |
| ﾍﾞﾑﾌﾞﾛｼﾞﾝ (q6w)                        | 1        | 41       | 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ﾎﾞﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1ml:1A Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>ｷｲﾄﾙ-ｸﾞ点滴静注 100mg/4mL *:400mg Day1   | 皮膚科/1. 悪性黒色腫    |
| [治験]2023-0009 HBI-8000-303試験           | 1        | 0        | 生食注ｼﾞﾘﾝｼﾞ[ｼﾞｰﾀﾞ] 10mL/本:1筒 Day1<br>大塚生食注 100ml:1瓶 Day1<br>大塚生食注 50ml:1瓶 Day1<br>ﾎﾞﾗﾗﾐﾝ注 5mg 1ml:1A Day1<br>治二ﾎﾞﾙﾏﾌﾞ 100mg/10mL[20230009]:480mg Day1<br>(ﾛｯｸ用)ﾍﾞﾘﾝ/Na100単位/mLｼﾞﾙｶﾞﾝ[ﾌﾟﾗﾄﾞ]10mL:1筒 Day1  | 皮膚科/1. 悪性黒色腫    |

| レジメン名                      | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種     |
|----------------------------|----------|----------|---|-------------|
| FP療法 (皮膚科)                 | 5        | 23       | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :5mg Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>(GE-ｼﾞﾌﾞ)ｼﾙﾃﾞﾑ3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ﾌﾟﾙｵﾛﾗﾗﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダ用) :600mg/m Day1<br>(GE-ｼﾞﾌﾞ)ｼﾙﾃﾞﾑ3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ﾌﾗｯｸｽ注 2 0 m g 2 m l :0.5A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ﾌﾟﾙｵﾛﾗﾗﾙ注「ﾄｰﾌﾞ」 (オーダ用) :700mg/m Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day5  | 皮膚科/2. その他  |
| CA療法 (皮膚科)                 | 6        | 16       | (GE-ｼﾞﾌﾞ)ｼﾙﾃﾞﾑ1 輸液 5 0 0 m L :1瓶 Day1<br>(GE-ｼﾞﾌﾞ)ｼﾙﾃﾞﾑ3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/1 0 0 m L [HK]:1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 Day2<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day3 Day4 Day5 Day6 Day2<br>(ﾛｯｸ用)ﾍﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾌﾞｰﾙ」10mL:1筒 Day3 Day2 Day4 Day5<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :20mg/m Day2 Day3 Day4<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :500m l Day2 Day3 Day4<br>(GE-ｼﾞﾌﾞ)ｼﾙﾃﾞﾑ3 A 輸液 1 L :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>ﾄｷﾞﾙｼﾞﾝ塩酸塩注射用 (オーダ用) :20mg/m Day2<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day2 Day3 Day4<br>ﾌﾞﾗｯｸｽ- P 注 2 5 m g 1 m l :1A Day2 Day3 Day4<br>ﾌﾗｯｸｽ注 2 0 m g 2 m l :1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4   | 皮膚科/2. その他  |
| Tri-weeklyﾄﾞﾚﾀﾞｷｾﾙ療法 (皮膚科) | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ﾄﾞﾚﾀﾞｷｾﾙ点滴静注「ﾆﾌﾞﾛ」(オーダ用) :60mg/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 皮膚科/2. その他  |
| VP-16療法 (皮膚科)              | 5        | 21       | 大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :500m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>ｲﾄﾞﾎﾝﾄﾞ点滴静注液 1 0 0 m g 「ｶﾞﾄﾞ」5 m l :125mg Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day1  | 皮膚科/2. その他  |
| ｲﾘﾉﾃﾞｶﾝ単剤療法 (皮膚科)          | 15       | 13       | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/1 0 0 m L [HK]:1袋 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day8 Day15<br>ｲﾘﾉﾃﾞｶﾝ塩酸塩点滴静注液(オーダ用):100mg/m Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15   | 皮膚科/2. その他  |
| 低用量ﾄﾞﾚﾀﾞｷｾﾙ療法              | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>ﾄﾞﾚﾀﾞｷｾﾙ点滴静注「ﾆﾌﾞﾛ」(オーダ用) :30mg/m Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15  | 皮膚科/2. その他  |
| ｱﾍﾞﾙﾏﾌ療法 (皮膚科)             | 1        | 13       | 大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ﾊﾞﾍﾞﾈﾅｵ点滴静注200mg * :10mg/kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾎﾞﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1   | 皮膚科/2. その他  |
| 上皮皮膚癌悪性腫瘍 二ﾎﾞﾙﾏﾌ[q2W]      | 1        | 13       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾎﾞﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾟ点滴静注 (オーダ用) :240mg Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1  | 皮膚科/2. その他  |
| 上皮皮膚癌悪性腫瘍 二ﾎﾞﾙﾏﾌ[q4W]      | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾎﾞﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1<br>ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾟ点滴静注 (オーダ用) :480mg Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1  | 皮膚科/2. その他  |
| WeeklyPTX (血管肉腫・乳房外Paget)  | 15       | 13       | 大塚生食注ソフトﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>ﾊﾟｸﾞﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g /1 6 . 7 m l [NK]:80mg/m Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day15<br>ﾎﾞﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day15<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗﾓﾃﾞｼﾞﾝ静注20mg 「ｻﾌﾞｲ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15  | 皮膚科/2. その他  |
| ｴﾌﾟﾘﾝ (血管肉腫)               | 8        | 13       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ﾊﾞｲﾌﾞｴﾝ静注 1 m g :1.4mg/m Day1 Day8<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8   | 皮膚科/2. その他  |
| ﾘｯｷｼﾏﾌ (天疱瘡)【初回】           | 1        | 13       | ﾘｯｷｼﾞﾝ点滴静注 5 0 0 m g /5 0 m L :1000m g Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :500m l Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾎﾞﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 皮膚科/2. その他  |
| ﾘｯｷｼﾏﾌ (天疱瘡)【2回目以降】        | 1        | 13       | ﾘｯｷｼﾞﾝ点滴静注 5 0 0 m g /5 0 m L :1000m g Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :500m l Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾎﾞﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 皮膚科/2. その他  |
| PLD単剤療法                    | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾌﾞﾄﾞﾘ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾄﾞｷｼﾙ注 2 0 m g /1 0 m L * :50mg/m Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/1. 卵巣がん |
| BEP療法                      | 16       | 5        | ｼﾙﾌﾞﾌﾟﾗﾄﾞ点滴静注 5 0 0 m L /袋:1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day7 Day8 Day9 Day16<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2<br>ｲﾄﾞﾎﾝﾄﾞ点滴静注液 1 0 0 m g 「ｶﾞﾄﾞ」5 m l :100mg/m Day1 Day3 Day4 Day5 Day2<br>(GE-ｼﾞﾌﾞ)ｼﾙﾃﾞﾑ3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day7 Day8 Day9 Day16<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :20mg/m Day1 Day3 Day4 Day5 Day2<br>(GE-ｼﾞﾌﾞ)ｼﾙﾃﾞﾑ3 A 輸液 1 L :1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day9 Day16<br>ﾌﾟﾙｶﾞﾙ点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾛﾝ点滴静注 3 m g 「ｼﾘﾝｼﾞ」(ｻﾌﾞｲ) :1筒 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2<br>ﾌﾞﾗﾓﾃﾞｼﾞﾝ静注20mg 「ｻﾌﾞｲ」 (20mL/A) :1A Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6<br>ﾌﾟﾗﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6<br>ﾌﾗｯｸｽ注 2 0 m g 2 m l :1A Day1 Day3 Day4 Day5 Day2<br>ﾌﾟﾚｵ ( B l e o ) 注 1 5 m g * :20mg/m Day2 Day9 Day16<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day9 Day16 | 婦人科/1. 卵巣がん |

| レジメン名              | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種     |
|--------------------|----------|----------|---|-------------|
| CPT-11+BEV療法       | 1        | 20       | パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞｰﾙ8mg相当) :1V Day1<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞｰﾙ2mg相当):2A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>ｲﾝﾄﾞｰﾙかん塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150m g /m i Day1<br>ｱｽﾁﾝ点滴静注用 (オーダ用) :15m g /k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/1. 卵巣がん |
| CPT-11+CDGP(NDP)療法 | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞｰﾙ8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞｰﾙ2mg相当):1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8<br>ｲﾝﾄﾞｰﾙかん塩酸塩点滴静注液(オーダ用):60m g /m i Day1 Day8<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>ｱｸﾌﾞﾗ注 (オーダ用) :80m g /m i Day1<br>生理食塩液バッグ「フソー」1 L :1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8   | 婦人科/1. 卵巣がん |
| CPT-11単剤療法         | 15       | 6        | ｸﾗｼﾞﾝ点滴静注/バッグ 3 m g / 1 0 0 m l 「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞｰﾙ8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15<br>ｲﾝﾄﾞｰﾙかん塩酸塩点滴静注液(オーダ用):100m g /m i Day1 Day8 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15  | 婦人科/1. 卵巣がん |
| DC療法               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞｰﾙ8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ﾄﾞｰｷﾞｰﾄﾞ点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :70mg/m i Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>ｶﾙﾌﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液 (オーダ用) :0m g /A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/1. 卵巣がん |
| DP療法               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞｰﾙ8mg相当) :1V Day1<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞｰﾙ2mg相当):2A Day1<br>ﾌﾞﾙｰｲﾝｼﾞﾝ点滴静注20m g 「ザウイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :250m l Day1<br>ﾄﾞｰｷﾞｰﾄﾞ点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :70mg/m i Day1<br>ｼﾞｮﾙﾌﾞﾗﾝﾁﾝ点滴静注 5 0 0 m l /袋:1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l :8ml Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :500m l Day1<br>ｼｽﾌﾟﾗﾝﾁﾝ点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :60m g /m i Day1<br>生理食塩液バッグ「フソー」1 L :1袋 Day1<br>ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 3 0 0 m l :300m l Day1 | 婦人科/1. 卵巣がん |
| DTX療法              | 1        | 20       | パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞｰﾙ8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ﾄﾞｰｷﾞｰﾄﾞ点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :70mg/m i Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/1. 卵巣がん |
| GC+BEV療法           | 8        | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞｰﾙ8mg相当) :2V Day1<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞｰﾙ2mg相当):2A Day1<br>ｸﾞﾙﾏｼﾞﾝ点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1000m g /m i Day1 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｶﾙﾌﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液 (オーダ用) :0m g /A Day1<br>ｱｽﾁﾝ点滴静注用 (オーダ用) :15m g /k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8  | 婦人科/1. 卵巣がん |
| GEM+BEV療法          | 15       | 13       | ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞｰﾙ8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ｸﾞﾙﾏｼﾞﾝ点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1000m g /m i Day1 Day8 Day15<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ｱｽﾁﾝ点滴静注用 (オーダ用) :15m g /k g Day1  | 婦人科/1. 卵巣がん |
| GEM単剤療法            | 15       | 13       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day8<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞｰﾙ8mg相当) :1V Day1 Day15 Day8<br>ｸﾞﾙﾏｼﾞﾝ点滴静注液「NK」 (オーダ用) :1000m g /m i Day1 Day15 Day8<br>大塚糖液 5 % 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day8<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15   | 婦人科/1. 卵巣がん |
| PLD+Bev療法          | 1        | 27       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝﾄﾞｰﾙ8mg相当) :1V Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾄﾞｰｷﾞｰﾄﾞ点滴静注 2 0 m g / 1 0 m l * :40m g /m i Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ｱｽﾁﾝ点滴静注用 (オーダ用) :15m g /k g Day1   | 婦人科/1. 卵巣がん |
| PLD+CBDCA+Bev療法    | 1        | 27       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰｷﾞｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝﾄﾞｰﾙ2mg相当):2A Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :250m l Day1<br>ﾄﾞｰｷﾞｰﾄﾞ点滴静注 2 0 m g / 1 0 m l * :30m g /m i Day1<br>ｶﾙﾌﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液 (オーダ用) :0m g /A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1<br>ｱｽﾁﾝ点滴静注用 (オーダ用) :10m g /k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/1. 卵巣がん |

| レジメ名             | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種     |
|------------------|----------|----------|---|-------------|
| PLD+CBDCA療法      | 1        | 27       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティマト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>プドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>トキシル注 2 0 m g / 1 0 m L * :30m g / m l Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>プドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1   | 婦人科/1. 卵巣がん |
| TC+BEV療法         | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ティマト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>プドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>プドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>アスチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>プドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/1. 卵巣がん |
| TC+Bev療法CBDCA脱感作 | 1        | 20       | (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注ソフトウツ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :1m g Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :10m g Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ティマト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>プドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1<br>アスチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1   | 婦人科/1. 卵巣がん |
| TC療法             | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ティマト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>プドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>プドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>プドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1   | 婦人科/1. 卵巣がん |
| TN (NDP/CDGP)療法  | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティマト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>アブラ注 (オーダ用) :80m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 婦人科/1. 卵巣がん |
| TP+BEV療法         | 2        | 26       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アスチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / kg Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネカ」10mL:1筒 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ティマト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>プドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>ソルアセト F 輸液 5 0 0 m l / 袋 :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 m Eq / m l :0.4A Day1<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトウツ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :50m g / m l Day1<br>生理食塩液「フソ」 1 L :1袋 Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 | 婦人科/1. 卵巣がん |
| TPT 単剤療法         | 5        | 16       | グラニセトロン点滴静注「ツグ」 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ハバカムチン注射用 1 . 1 m g * :1.5m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  | 婦人科/1. 卵巣がん |
| TPT+BEV療法        | 5        | 16       | ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ハバカムチン注射用 1 . 1 m g * :1.5m g / m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>アスチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / kg Day1   | 婦人科/1. 卵巣がん |



| レジメン名              | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種     |
|--------------------|----------|----------|---|-------------|
| TPT+PTX+Bev療法      | 3        | 25       | (ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1 Day2<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ティマト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1 Day2 Day3<br>ハイカムチン注射用 1 . 1 m g * :0.75m g / m l Day1 Day2 Day3<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :250m l Day1<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>アピスチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / k g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1 Day2 Day3<br>ティマト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day2 Day3<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3                         | 婦人科/1. 卵巣がん |
| TP療法               | 2        | 19       | (ドック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ティマト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>ソリアセト F 輸液 5 0 0 m L / 袋 :1袋 Day1<br>硫酸Mg 補正液 1 mEq/m l :20ml Day1<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m L :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :50m g / m l Day1<br>生理食塩液「バッグフソー」 1 L :1袋 Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/1. 卵巣がん |
| ddTC+BEV療法【初回用】    | 15       | 6        | グラニセトロン点滴静注「バッグ」 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day8 Day15<br>ティマト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day1 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 Day15<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g / m l Day8 Day1 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティマト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>アピスチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / k g Day1<br>ティマト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1 | 婦人科/1. 卵巣がん |
| ddTC+BEV療法【2回目以降】  | 15       | 6        | グラニセトロン点滴静注「バッグ」 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day8 Day15<br>ティマト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day8 Day1 Day15<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day1 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 Day15<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g / m l Day8 Day1 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>アピスチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / k g Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/1. 卵巣がん |
| ddTC療法【初回用】        | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティマト注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ティマト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g / m l Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>グラニセトロン点滴静注「バッグ」 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15<br>ティマト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day15  | 婦人科/1. 卵巣がん |
| ddTC療法【2回目以降】      | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティマト注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g / m l Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1<br>グラニセトロン点滴静注「バッグ」 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15  | 婦人科/1. 卵巣がん |
| べシズマブ (アピスチン) 維持療法 | 1        | 20       | アピスチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / k g Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/1. 卵巣がん |

| レジメン名               | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種      |
|---------------------|----------|----------|---|--------------|
| TPT+PTX+Bev療法(子宮頸癌) | 3        | 18       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当):2V Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ﾌｧﾓﾅｼﾞﾝ静注液20m g「ｻｳｲ」 (20mL/A) :1A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1 Day2 Day3<br>ﾊｲｶﾞﾑﾁﾝ注射用 1 . 1 m g * :0.75m g / m l Day1 Day2 Day3<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>ｱｽﾁﾅﾝ点滴静注用 (ﾕｰｸﾞ用) :15m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1 Day2 Day3<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day2 Day3<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2 Day3  | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| CDDP (CCRT) 療法      | 1        | 6        | 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l :0.4A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ｱﾛｶﾘｽ点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」 (ﾕｰｸﾞ用) :40m g / m l Day1<br>ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1<br>生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌﾝｰ」1 L :1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| CPT-11+CDGP(NDP)療法  | 8        | 13       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ｱﾛｶﾘｽ点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):1A Day1 Day8<br>大塚生食注ソﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8<br>ｲﾘﾈﾄﾞｷﾝ塩酸塩点滴静注液(ﾕｰｸﾞ用):60m g / m l Day1 Day8<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>ｱｸﾌﾟﾗ注 (ﾕｰｸﾞ用) :80m g / m l Day1<br>生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌﾝｰ」1 L :1袋 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8   | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| CPT-11単剤療法          | 15       | 6        | ｸﾞﾗｾﾄﾞﾝ点滴静注/ﾊﾞｯｸﾞ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day1 Day8 Day15<br>ｱﾛｶﾘｽ点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15<br>ｲﾘﾈﾄﾞｷﾝ塩酸塩点滴静注液(ﾕｰｸﾞ用):100m g / m l Day1 Day8 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15  | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| DC療法                | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ｱﾛｶﾘｽ点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注ソﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ﾆﾌﾞﾛ」 (ﾕｰｸﾞ用) :70m g / m l Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液 (ﾕｰｸﾞ用) :0m g / A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| DTX+BEV療法           | 8        | 13       | ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注ソﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8<br>ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ﾆﾌﾞﾛ」 (ﾕｰｸﾞ用) :40m g / m l Day1 Day8<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8<br>ｱｽﾁﾅﾝ点滴静注用 (ﾕｰｸﾞ用) :15m g / kg Day1  | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| TC+BEV療法            | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ｱﾛｶﾘｽ点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ﾌｧﾓﾅｼﾞﾝ静注液20m g「ｻｳｲ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液 (ﾕｰｸﾞ用) :0m g / A Day1<br>ｱｽﾁﾅﾝ点滴静注用 (ﾕｰｸﾞ用) :15m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1   | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| TC+Bev療法CBDCA脱感作    | 2        | 19       | (ﾄﾞｯｸﾞ用) ﾍﾞﾘﾝNa100単位/mLｼﾝｼﾞ ﾏｰｸﾞ10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>ｱﾛｶﾘｽ点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day2<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当):2A Day2 Day1<br>ﾃﾞｰﾁｰﾄﾞ注射液6.6mg (ｲﾝ酸塩8mg相当) :2V Day2 Day1<br>ﾌｧﾓﾅｼﾞﾝ静注液20m g「ｻｳｲ」 (20mL/A) :1A Day2 Day1<br>ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5 m g 1 m l :1A Day2 Day1<br>大塚生食注ソﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 2 5 0 m l :1袋 Day2<br>ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液 (ﾕｰｸﾞ用) :0m g / A Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2<br>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞｸﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1<br>ｱｽﾁﾅﾝ点滴静注用 (ﾕｰｸﾞ用) :15m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1<br>ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1 | 婦人科/2. 子宮頸がん |

| レジメ名            | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名: 数量 投与日  | 診療科/がん種      |
|-----------------|----------|----------|--|--------------|
| TC+Bev+Pem療法    | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ハロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティート注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ティート注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>バリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>アピスチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1   | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| Bev+Pem療法       | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アピスチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / kg Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1  | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| TC療法            | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ハロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティート注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ティート注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>バリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| TIP療法           | 3        | 25       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ハロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ティート注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):2A Day1<br>ティート注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>バリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day3<br>イホマイド (I F X) 注射用 1 g :1500m g / m l Day2 Day3<br>生理食塩液「フソ」1 L :1袋 Day2 Day3<br>ユニミキセル注 4 0 0 m g 4 m l :1.5A Day2 Day3   | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| TN (NDP/CDGP)療法 | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ハロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティート注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):2A Day1<br>ティート注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>バリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>アクラ注 (オーダ用) :80m g / m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| TP+BEV療法        | 2        | 26       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アピスチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / kg Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オカ」10mL:1筒 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ハロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティート注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ティート注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>バリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>ソリアセトF輸液 5 0 0 m l / 袋 :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq / m l :0.4A Day1<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :50m g / m l Day1<br>生理食塩液「フソ」1 L :1袋 Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| TP+Bev+Pem療法    | 2        | 19       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アピスチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / kg Day1<br>(ロック用)ヘリンNa100単位/mLシリンジ「オカ」10mL:1筒 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ハロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ティート注射液6.6mg (リド酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ティート注射液1.65mg(リド酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :500m l Day1<br>バリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>ソリアセトF輸液 5 0 0 m l / 袋 :1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq / m l :0.4A Day1<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :250m l Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :50m g / m l Day1<br>生理食塩液「フソ」1 L :1袋 Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L * :200m g Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1 | 婦人科/2. 子宮頸がん |

| レジメン名                                    | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種      |
|--|----------|----------|--|--------------|
| TP療法                                     | 2        | 19       | (ドク用)ヘパリンNa100単位/mLリクソ「オキ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :2V Day1<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>パロ/タキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>ソリアセトF輸液 5 0 0 m l /袋:1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq / m l :20ml Day1<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1<br>生理食塩液「カリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :50m g / m l Day1<br>生理食塩液「フソ」1 L :1袋 Day1 Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| ddTC+BEV療法【初回用】                          | 15       | 6        | グラニセトロン点滴静注「バグ」3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day8 Day15<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day1 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 Day15<br>パロ/タキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g / m l Day8 Day1 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>アバチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / kg Day1<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1 | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| ddTC+BEV療法【2回目以降】                        | 15       | 6        | グラニセトロン点滴静注「バグ」3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day8 Day15<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day8 Day1 Day15<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day1 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day8 Day1 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 Day15<br>パロ/タキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g / m l Day8 Day1 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day1 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>アバチン点滴静注用 (オーダ用) :15m g / kg Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1   | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| ddTC療法【初回用】                              | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):1A Day1<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パロ/タキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g / m l Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>グラニセトロン点滴静注「バグ」3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day15   | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| ddTC療法【2回目以降】                            | 15       | 6        | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15<br>ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>パロ/タキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:80m g / m l Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0m g / A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>グラニセトロン点滴静注「バグ」3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15   | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| セミアブ350mg                                | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>リブア点静注 3 5 0 m g / 7 m l * :350m g Day1  | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| CCRT+Pemb療法(21日間Pemb①+②=day42まで)         | 15       | 6        | ソリアセトF輸液 5 0 0 m l /袋:1袋 Day8 Day15<br>硫酸M g 補正液 1 mEq / m l ( 2 0 m l / A ) :0.4A Day8 Day15<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day8 Day15<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 Day1 Day15<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day8 Day15<br>デキスト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15<br>デキスト注射液1.65mg(リ酸塩2mg相当):2A Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day8 Day15<br>大塚生食注ソト「バグ」2 5 0 m l :1袋 Day8 Day15<br>シスプラチン点滴静注 (オーダ用) :40m g / m l Day8 Day15<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1mL Day8 Day15<br>生理食塩液「フソ」1 L :1袋 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1   | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| CCRT+Pemb療法 (Pemb200 Q3wks) ③-⑤kurまで     | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1   | 婦人科/2. 子宮頸がん |
| CCRT+Pemb療法 (Pemb400 Q6wks) ⑥-⑧kur/24Mまで | 1        | 41       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :400m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1   | 婦人科/2. 子宮頸がん |

| レジメン名      | 投与<br>日数 | 休薬<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日   | 診療科/がん種              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| AP療法       | 2        | 19       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):1A Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>トキソリン酸塩注射用 (オード用) :60mg/mi Day1<br>ソルアセトF輸液 5 0 0 m l /袋:1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l :0.4A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オード用) :50mg/mi Day1<br>生理食塩液「フッソ」1 L :1袋 Day1 Day2<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオカ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1   | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| DC療法       | 1        | 20       | 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>トセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オード用) :70mg/mi Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オード用) :0mg /A Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1   | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| DP療法       | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>アモキシシリン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :250m l Day1<br>トセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オード用) :70mg/mi Day1<br>ソルアセトF輸液 5 0 0 m l /袋:1袋 Day1<br>硫酸M g 補正液 1 mEq/m l :8ml Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :500m l Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オード用) :60mg /mi Day1<br>生理食塩液「フッソ」1 L :1袋 Day1<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :300mL Day1  | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| DTX療法      | 1        | 20       | パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>トセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オード用) :70mg/mi Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| GD療法 (肉腫系) | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :2V Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>アモキシシリン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オード用) :900mg /mi Day1<br>大塚生食注 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オード用) :75mg/mi Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1  | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| IAP療法      | 5        | 16       | ソルアセトF輸液 5 0 0 m l /袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day1<br>イボマイド ( I F X ) 注射用 1 g :1200mg /mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>クロミキサン注 4 0 0 m g 4 m l :300mg /mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>トキソリン酸塩注射用 (オード用) :50mg /mi Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オード用) :50mg /mi Day1<br>生理食塩液「フッソ」1 L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| IP療法       | 4        | 17       | (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネオカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day2 Day3 Day4 Day1<br>グラセトロン点滴静注「バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]」:1袋 Day2 Day3 Day4 Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day2 Day3 Day4 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :1V Day2 Day3 Day4 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2 Day3 Day4 Day1<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オード用) :20mg /mi Day2 Day3 Day4 Day1<br>(GE-リカ)ソルヂム3 A輸液 5 0 0 m l :1袋 Day2 Day3 Day4 Day1<br>メロン静注7 % 2 0 m l :2A Day2 Day3 Day4 Day1<br>イボマイド ( I F X ) 注射用 1 g :1500mg /mi Day2 Day3 Day4 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day2 Day3 Day4 Day1<br>クロミキサン注 4 0 0 m g 4 m l :1.5A Day2 Day3 Day4 Day1<br>(GE-リカ)ソルヂム3 A輸液 1 L :1袋 Day2 Day3 Day4 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| TC療法       | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>デキストラン注射液6.6mg (乳酸塩8mg相当) :2V Day1<br>デキストラン注射液1.65mg(乳酸塩2mg相当):2A Day1<br>アモキシシリン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>トラクタセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175mg /mi Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オード用) :0mg /A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 m l :1瓶 Day1   | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |

| レジメン名                              | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種              |
|------------------------------------|----------|----------|---|----------------------|
| TC療法CBDOA脱感作                       | 2        | 19       | (ドック用)ヘパリンNa100単位/mLリソゾ「オーツ」10mL:1筒 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day2 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day2<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注1.65mg(ｼﾞﾙｺﾝ2mg相当):2A Day2 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注6.6mg (ｼﾞﾙｺﾝ8mg相当):2V Day2 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day2 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day2 Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day2<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day2<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day2<br>ﾊﾞﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾝ注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1   | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| TN (NDP/CDGP)療法                    | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ﾊﾞﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾝ注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注1.65mg(ｼﾞﾙｺﾝ2mg相当):2A Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注6.6mg (ｼﾞﾙｺﾝ8mg相当):2V Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>ﾊﾞﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>アクト注 (オーダ用):80mg/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| weekly TN療法                        | 15       | 13       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ﾊﾞﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾝ注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注1.65mg(ｼﾞﾙｺﾝ2mg相当):2A Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注6.6mg (ｼﾞﾙｺﾝ8mg相当):2V Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 Day8 Day15<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1 Day8 Day15<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾊﾞﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:60m g / m l Day1 Day8 Day15<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :1袋 Day1<br>アクト注 (オーダ用):80mg/m Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注1.65mg(ｼﾞﾙｺﾝ2mg相当):1A Day8 Day15<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注6.6mg (ｼﾞﾙｺﾝ8mg相当):1V Day8 Day15             | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| ﾊﾞﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾝ+ﾚﾝﾊﾞﾆﾝ療法                 | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1  | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| TC+Pemb療法①～⑥                       | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ﾊﾞﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾝ注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注6.6mg (ｼﾞﾙｺﾝ8mg相当):2V Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注1.65mg(ｼﾞﾙｺﾝ2mg相当):2A Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞﾘﾀｷｾﾙ注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m l [NK]:175m g / m l Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1瓶 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1  | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| 推奨 Pemb維持 (400Q6wks) ⑦～⑨開始から最大24ヶ月 | 1        | 41       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1<br>ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :400m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1   | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| Pemb維持 (200 Q3wks) ⑦～⑨開始から最大24ヶ月   | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l :100m l Day1<br>ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * :200m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1   | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| TC+Durv±Ola (1-6kur)               | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ点滴静注 (オーダ用) * :1120mg Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1<br>ﾊﾞﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾝ注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注6.6mg (ｼﾞﾙｺﾝ8mg相当):2V Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注1.65mg(ｼﾞﾙｺﾝ2mg相当):2A Day1<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注20mg「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l :1A Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 5 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ﾊﾞﾘﾀｷｾﾙ注 (オーダ用):175m g / m l Day1<br>ブドウ糖注射液 5 % 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用) :0mg/A Day1   | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| Durv±Ola (維持)                      | 1        | 27       | 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1<br>ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ点滴静注 (オーダ用) * :1500mg Day1<br>大塚生食注ソフトバッグ 2 5 0 m l :1袋 Day1<br>大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1   | 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫) |
| EMA/CO療法                           | 8        | 6        | (GE-ｼ)ｼﾙﾌﾞﾐﾝ3 A輸液 5 0 0 m l :500m l Day1 Day2 Day8<br>ﾌﾞﾗｰﾄﾞ注6.6mg (ｼﾞﾙｺﾝ8mg相当):1V Day1 Day8<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g :1瓶 Day1 Day8<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾝ点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:0.5m g / k g Day1 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l :50m l Day1 Day2 Day8<br>ｺｽﾒﾞﾝ静注用 0 . 5 m g * :0.5m g / k g Day1 Day2<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l :500m l Day1 Day2 Day8<br>ﾄﾞﾌﾞﾈｰﾙ点滴静注液 1 0 0 m g 「サド」 5 m l :100m g / m l Day1 Day2<br>注射用ﾄﾞﾌﾞﾈｰﾙ 5 0 m g :300m g / m l Day1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾞﾝ点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m l [HK]:1袋 Day2<br>ｵﾝｺﾋﾞﾝ (VCR)注 1 m g :1m g / m l Day8<br>ｴﾝﾄﾞｷﾝ注 (オーダ用):600m g / m l Day8<br>大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 | 婦人科/4. 絨毛性疾患         |

| レジメン名           | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日  | 診療科/がん種      |
|-----------------|----------|----------|---|--------------|
| EMA/EP療法        | 9        | 5        | (GE-ツツ)ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m l : 1 袋 Day1 Day2 Day3 Day8<br>ティマト注射液6.6mg (リ酸塩8mg相当) : 1 V Day1 Day2 Day3 Day8<br>パロセトロン静注0.75mg/5mL[タイホウ]:1瓶 Day1<br>アロカリス点滴静注 2 3 5 m g : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1 Day2 Day3 Day8<br>生理食塩液バグ「フソー」1 L : 1 袋 Day1<br>エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サト」 5 m l : 100m g / m l Day1 Day8<br>生理食塩液「ヒカリ」 5 0 0 m l : 1 袋 Day1 Day8<br>シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) : 75m g / m l Day1<br>シルアセトF 輸液 5 0 0 m l / 袋 : 1 袋 Day1 Day2 Day3<br>ラシックス注 1 0 0 m g 1 0 m l : 1 A Day1 Day2 Day3<br>プリンペラン注射液 1 0 m g 2 m l : 20m g Day2 Day3<br>(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「ネーカ」10mL:1筒 Day2 Day3 Day9<br>グラセトロン静注液 3 m g シリンジ「サワイ」:1筒 Day8<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day8 Day9<br>コスメゲン静注用0. 5 m g * : 0.5m g / m l Day8<br>注射用メトトレキセート 5 0 m g : 300m g / m l Day8 | 婦人科/4. 絨毛性疾患 |
| MTX単剤筋注療法       | 1        | 0        | 注射用メトトレキセート 5 0 m g : 50m g / m l Day1  | 婦人科/4. 絨毛性疾患 |
| MTX療法(5日間)      | 5        | 9        | 注射用メトトレキセート 5 0 m g : 0.4m g / k g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l : 1 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  | 婦人科/4. 絨毛性疾患 |
| 異所性妊娠 MTX単剤筋注療法 | 1        | 0        | 注射用メトトレキセート 5 0 m g : 50m g / m l Day1<br>大塚蒸留水 (注射用水) 2 0 m l : 1 A Day1   | 婦人科/A. 異所性妊娠 |
| ヘムブリスズ療法        | 1        | 20       | 大塚生食注 1 0 0 m l : 1 瓶 Day1<br>大塚生食注 1 0 0 m l : 100m l Day1<br>キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m l * : 200m g Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 50m l Day1<br>大塚生食注 5 0 m l : 1 瓶 Day1<br>ボラミン注 5 m g 1 m l : 1 A Day1   | 婦人科/Z. その他   |