



# 頻用される抗HIV薬一覧




核酸系逆転写酵素阻害薬 (NRTI)				
商品名・略名	一般名 (含有量)	用法・用量 (30日分薬価)	食事の影響	主な副作用と注意事項
<b>アバカビル/ラミブジン配合錠</b> (先発品: エブジコム (EZC)) (後発品: ラバミコム (LAC))  ABC/3TCの配合剤	アバカビル ラミブジン (600mg+300mg)	1回1錠 1日1回 (先発品: ¥58,797) (後発品: ¥23,871)	なし	発疹、過敏症 過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者への再投与不可 中止によるB型肝炎の悪化*
<b>ツルバダ (TVD)</b>  TDF/FTCの配合剤	テノホビル ラミブジン エムトリシジン (300mg+200mg)	1回1錠 1日1回 (¥73,272)	なし	腎機能障害、腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型肝炎の悪化*
<b>デスコビHT (DVM)</b>  <b>デスコビLT</b>  TAF/FTCの配合剤	テノホビル ラミブジン エムトリシジン 【HT】 (25mg+200mg) 【LT】 (10mg+200mg)	1回1錠 1日1回 HT (¥119,745) (ノビア、ジェノビアと併用する場合は、【LT】) LT (¥83,433)	なし	腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型肝炎の悪化*

非核酸系逆転写酵素阻害薬 (NNRTI)				
<b>エシュラント (RPV)</b> 	リルビビル (25mg)	1回1錠 1日1回 (¥60,576)	食後	頭痛、嘔気、眠気、不眠症、浮動性めまい 頭痛、嘔気、発疹、浮動性めまい
<b>ピフェルトロ (DOR)</b> 	ドレビル (100mg)	1回1錠 1日1回 (¥62,064)	なし	頭痛、嘔気、眠気、不眠症、浮動性めまい 頭痛、嘔気、発疹、浮動性めまい

非核酸系逆転写酵素阻害薬＋核酸系逆転写酵素阻害薬★				
<b>オデフシ (ODF)</b>  RPV/TAF/FTCの配合剤	リルビビル テノホビル ラミブジン エムトリシジン (25mg+25mg+200mg)	1回1錠 1日1回 (¥169,629)	食後	腹部膨満感、皮膚変色、頭痛、嘔気、不眠症、浮動性めまい 中止によるB型肝炎の悪化*

プロテアーゼ阻害薬＋核酸系逆転写酵素阻害薬★				
<b>シムツェザ (SMT)</b>  DRV/COBI/TAF/FTCの配合剤	ダルナビル シムツェザ ラミブジン エムトリシジン (800mg+150mg+10mg+200mg)	1回1錠 1日1回 (¥132,264)	食後	腹部膨満感、皮膚変色、頭痛、下痢、発疹、嘔気、リポジストロフィー 中止によるB型肝炎の悪化*

インテグラーゼ阻害薬 (INSTI)				
<b>アイセントレス600mg (RAL)</b>  アイセントレス400mg (RAL)  ラルゲビル (600mg, 400mg)		【600mg】 1回2錠 1日1回 (¥83,172) 【400mg】 1回1錠 1日2回 (¥53,520)	なし	頭痛、掻痒感
<b>デビケイ (DTG)</b>  ドルゲビル (50mg)		1回1錠 1日1回 (¥96,423) (インテグラーゼ阻害薬に対する耐性を有する場合は1回1錠1日2回)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠
<b>ボカブリア (CAB)</b> 	カボテビル (30mg)	1回1錠 1日1回 (¥106,248)	なし	悪心、下痢、頭痛 筋注製剤の経口導入として用いる (RPV/経口剤と併用して1か月間 (少なくとも28日間) 服用する)

インテグラーゼ阻害薬＋核酸系逆転写酵素阻害薬★				
<b>トリームク (TRN)</b>  DTG/ABC/3TCの配合剤	ドルゲビル アバカビル ラミブジン (50mg+600mg+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥199,170)	なし	発疹、過敏症、悪心、下痢、頭痛、不眠 過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者への再投与不可 中止によるB型肝炎の悪化*
<b>ビクタルビ (BVV)</b>  BIC/FTC/TAFの配合剤	ビクタビル エムトリシジン テノホビル ラミブジン (50mg+200mg+25mg)	1回1錠 1日1回 (¥212,823)	なし	腹部膨満感、皮膚変色、悪心、下痢、頭痛 中止によるB型肝炎の悪化*
<b>ドウバイト (DVT)</b>  DTG/3TCの配合剤	ドルゲビル ラミブジン (50mg+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥143,760)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠 中止によるB型肝炎の悪化*


【筋注】非核酸系逆転写酵素阻害薬＋インテグラーゼ阻害薬				
<b>リカムビス (RPV i.m.)</b> 	リルビビル (600mg/2mL, 900mg/3mL)	<1か月間隔投与> 初回900mg 以降1か月毎600mg (¥90,582) <2か月間隔投与> 初回900mg 以降2か月毎900mg (¥130,310)	なし	注射部位反応 (疼痛、結節、硬結)
<b>ボカブリア (CAB i.m.)</b> 	カボテビル (400mg/2mL, 600mg/3mL)	<1か月間隔投与> 初回600mg 以降1か月毎400mg (¥176,456) <2か月間隔投与> 初回600mg 以降2か月毎600mg (¥253,850)	なし	注射部位反応 (疼痛、結節、硬結)

錠剤はほぼ原寸大

\*: HBVに対する効果が認められている ★ 1日1回1錠でよい配合剤

～ 初回治療として選択すべき抗HIV薬の組み合わせ ～

大部分のHIV感染者に推奨される組み合わせ

	商品名・略名・服薬イメージ	一般名 (含有量)	用法・用量 (30日分薬価)	食事の 影響	主な副作用と注意事項
INST1+NRT1	ビクタルビ (BVV)  BIC/FTC/TAFの配合剤	ビクテグ ラビル 50mg + イムトリクタビ 300mg + テナホビルアラフェキサト 25mg	1回1錠 1日1回 (¥212,823)	なし	悪心、下痢、頭痛 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
	テビケイ (DTG)+デシコピHT (DVY) 	ドルゲグ ラビル 50mg + イムトリクタビ 200mg + テナホビルアラフェキサト 25mg	1回1錠 1日1回 (¥96,423) + 1回1錠 1日1回 (¥119,745)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
	ドウベイト (DVT)  DTG/3TCの配合剤	ドルゲグ ラビル 50mg + ラミアジン 300mg	1回1錠 1日1回 (¥143,760)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠 中止によるB型慢性肝炎の悪化* 注：B型肝炎の合併がなく、血中HIV-RNA量が50万コピー/ml未満、薬剤耐性検査で3TC耐性のない患者にのみ推奨

\*：HBVに対する効果が認められている

状況によって推奨される組み合わせ

INST+NRT1	トリーメク (TRI)  DTG/ABC/3TCの配合剤	ドルゲグ ラビル 50mg + アバカビル 600mg + ラミアジン 300mg	1回1錠 1日1回 (¥199,170)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠 発疹、過敏症 過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者への再投与不可 中止によるB型慢性肝炎の悪化* 注：B型肝炎の合併がない患者にのみ推奨
	アイセントレス600mg (RAL) +デシコピHT (DVY) 	ラルゲグ ラビル 600mg 2錠 + イムトリクタビ 200mg + テナホビルアラフェキサト 25mg	【600mg】 1回2錠 1日1回 (¥83,172) 【400mg】 1回1錠 1日2回 (¥53,520) + 1回1錠 1日1回 (¥119,745)	なし	頭痛、掻痒感 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
PI+NRT1	シムツーズ (SMT)  DRV/COBI/TAF/FTCの配合剤	ダルゲグ ラビル 800mg + コビシタット 150mg + テナホビルアラフェキサト 10mg + イムトリクタビ 200mg	1回1錠 1日1回 (¥132,264)	食後	頭痛、下痢、発疹、嘔気、 リボシストロフィー 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
	NNRTI+NRT1	ピフェルトロ (DOR)+デシコピHT (DVY) 	ドラビリン 100mg + テナホビルアラフェキサト 25mg + イムトリクタビ 200mg	1回1錠 1日1回 (¥62,064) + 1回1錠 1日1回 (¥119,745)	なし
オデフシ (ODF)  RPV/TAF/FTCの配合剤		リルビリン 25mg + テナホビルアラフェキサト 25mg + イムトリクタビ 200mg	1回1錠 1日1回 (¥169,629)	食後	頭痛、嘔気、眠気、不眠症、浮動性めまい 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化* 注：血中HIV-RNA量が10万コピー/ml未満の患者にのみ推奨 注：PPI内服患者には使用しない

錠剤はほぼ原寸大

\*：HBVに対する効果が認められている