




# 頻用される抗HIV薬一覧

核酸系逆転写酵素阻害薬 (NRTI)				
商品名・略名	一般名 (含有量)	用法・用量 (30日分薬価)	食事の影響	主な副作用と注意事項
<b>エブゾコム (EZC)</b> (ジエリツク：ラバミコム配合錠)  ABC/3TCの配合剤	アバカビル +ラミブジン (600mg+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥89,217) (ジエリツク¥36,516)	なし	発疹、過敏症  過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者への再投与不可 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
<b>ツルバダ (TVD)</b>  TDF/FTCの配合剤	テノホビル +エムトリシジン (300mg+200mg)	1回1錠 1日1回 (¥115,938)	なし	腎機能障害、腹部膨満感、皮膚変色  中止によるB型慢性肝炎の悪化*
<b>デシコビHT (DVY)</b>  <b>デシコビLT</b>  TAF/FTCの配合剤	テノホビルアラフェミド +エムトリシジン 【HT】 (25mg+200mg) 【LT】 (10mg+200mg)	1回1錠 1日1回 HT (¥119,745) (ノビア、ジェシットと併用する場合は【LT】) LT (¥83,615)	なし	腹部膨満感、皮膚変色  中止によるB型慢性肝炎の悪化*


非核酸系逆転写酵素阻害薬 (NNRTI)				
<b>エジュラント (RPV)</b> 	リルビビル (25mg)	1回1錠 1日1回 (¥64,434)	食後	頭痛、嘔気、眠気、不眠症、浮動性めまい
<b>ピフェルトロ (DOR)</b> 	ドラビリン (100mg)	1回1錠 1日1回 (¥64,434)	なし	頭痛、嘔気、浮動性めまい

非核酸系逆転写酵素阻害薬 + 核酸系逆転写酵素阻害薬*				
<b>オデフシ (ODF)</b>  RPV/TAF/FTCの配合剤	リルビビル +テノホビルアラフェミド +エムトリシジン (25mg+25mg+200mg)	1回1錠 1日1回 (¥184,647)	食後	腹部膨満感、皮膚変色、頭痛、嘔気、不眠症、浮動性めまい  中止によるB型慢性肝炎の悪化*

プロテアーゼ阻害薬 (PI)				
<b>プレシコピックス (PCX)</b>  DRV/COBIの配合剤	ダルガビル +コピシタット (800mg+150mg)	1回1錠 1日1回 (¥61,197)	食後	頭痛、下痢、発疹、嘔気、リボシストロフィー

インテグラーゼ阻害薬 (INSTI)				
<b>アイセントレス600mg (RAL)</b> 	242	【600mg】 1回2錠 1日1回 (¥94,944)	なし	頭痛、掻痒感
<b>アイセントレス400mg</b> 	227	【400mg】 1回1錠 1日2回 (¥94,944)		
<b>デビケイ (DTG)</b> 	50mg	1回1錠 1日1回 (¥98,469) (イナグラーゼ阻害薬に対する耐性を有する場合は1回1錠1日2回)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠

インテグラーゼ阻害薬 + 核酸系逆転写酵素阻害薬*				
<b>ゲンボイヤ (GEN)</b> 	510	1回1錠 1日1回 (¥211,215)	食後	腹部膨満感、皮膚変色、悪心、下痢、異夢、頭痛  中止によるB型慢性肝炎の悪化*
<b>トリーメク (TRI)</b> 	572 Tri	1回1錠 1日1回 (¥211,305)	なし	発疹、過敏症、悪心、下痢、頭痛、不眠  過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者への再投与不可 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
<b>ビクタリビ (BVV)</b> 	9883	1回1錠 1日1回 (¥212,823)	なし	腹部膨満感、皮膚変色、悪心、下痢、頭痛  中止によるB型慢性肝炎の悪化*
<b>ドウバイト (DVT)</b> 	5137	1回1錠 1日1回 (¥144,249)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠  中止によるB型慢性肝炎の悪化*






プロテアーゼ阻害薬 + 核酸系逆転写酵素阻害薬*				
<b>シムツァ (SMT)</b> 	8121	1回1錠 1日1回 (¥145,170)	食後	腹部膨満感、皮膚変色、頭痛、下痢、発疹、嘔気、リボシストロフィー  中止によるB型慢性肝炎の悪化*

\*HBVに対する効果が認められている

錠剤はほぼ原寸大 ★1日1回1錠でよい配合剤





～ 初回治療として選択すべき抗HIV薬の組み合わせ ～

大部分のHIV感染者に推奨される組み合わせ

	商品名・略名・服薬イメージ	一般名 (含有量)	用法・用量 (30日分薬価)	食事の 影響	主な副作用と注意事項	
INSTI + NRTI	ABC/3TC	トリメク (TRI)  DTG/ABC/3TCの配合剤	ドルテグラービル50mg+ラビダブリン600mg+ラミブジン300mg	1回1錠 1日1回 (¥211,215)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠 発疹、過敏症 過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者への再投与不可 中止によるB型慢性肝炎の悪化* 注：B型肝炎の合併がない患者にのみ推奨
		ビクトルピ (BVY)  BIC/FTC/TAFの配合剤	ビクトグラービル50mg+イムトリクタビリン300mg+テノホビルアラフィナド 25mg	1回1錠 1日1回 (¥212,823)	なし	悪心、下痢、頭痛 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
	TAF/FTC	アイセントレス600mg (RAL) +デシコピHT (DVY) 	ラルテグラービル600mg × 2 + イムトリクタビリン200mg + テノホビルアラフィナド 25mg	【600mg】1回2錠 1日1回 (¥94,944) 【400mg】1回1錠 1日2回 (¥94,944)	なし	頭痛、掻痒感 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
		アイセントレス400mg +デシコピHT (DVY) 	ラルテグラービル400mg × 2 + イムトリクタビリン200mg + テノホビルアラフィナド 25mg	1回1錠1日1回 HT (¥119,745)		
		テビケイ (DTG) + デシコピHT (DVY) 	ドルテグラービル50mg+イムトリクタビリン200mg+テノホビルアラフィナド 25mg	1回1錠1日1回 (¥98,469) + 1回1錠1日1回 HT (¥119,745)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*

\*：HBVに対する効果が認められている

状況によって推奨される組み合わせ

NNRTI + NRTI	TAF/FTC	オデフシ (ODF)  RPV/TAF/FTCの配合剤	リルビリン25mg+テノホビルアラフィナド 25mg+イムトリクタビリン200mg	1回1錠1日1回 (¥184,647)	食後	頭痛、嘔気、眠気、不眠症、浮動性めまい 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化* 注：血中HIV-RNA量が10万コピー/ml未満の患者にのみ推奨 注：PPI内服患者には使用しない
		ビフェルトロ (DOR) + デシコピHT 	ドレブリン100mg+テノホビルアラフィナド 25mg+イムトリクタビリン200mg	1回1錠1日1回 (¥64,434) + 1回1錠1日1回 HT (¥119,745)	なし	頭痛、嘔気、浮動性めまい 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
PI + NRTI		シムツォザ (SMT)  DRV/COBI/TAF/FTCの配合剤	ダルナビル800mg+コビシタット150mg+テノホビルアラフィナド 10mg+イムトリクタビリン200mg	1回1錠 (¥145,170)	食後	頭痛、下痢、発疹、嘔気、 リボジストロフィー 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
NNRTI + NRTI	3TC	ドウバイト  DTG/3TCの配合剤	ドルテグラービル50mg+ラミブジン300mg	1回1錠 1日1回 (¥144,249)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠 中止によるB型慢性肝炎の悪化* 注：B型肝炎の合併がなく、血中HIV-RNA量が50万コピー/ml未満、薬剤耐性検査で3TC耐性のない患者にのみ推奨

\*：HBVに対する効果が認められている

錠剤はほぼ原寸大