

核酸系逆転写酵素阻害薬 (NRTI)				
商品名・略名	一般名 (含有量)	用法・用量 (30日分薬価)	食事の影響	主な副作用と注意事項
エプジコム (EZC) (ジエリツカ:ラバミコム配合錠)  ABC/3TCの配合剤	アバビル +ラミブジン (600mg+300mg)	1回1錠 1日1回 (¥89,217) (ジエリツカ¥36,516)	なし	発疹、過敏症 過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者への再投与不可 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
ツルバダ (TVD)  TDF/FTCの配合剤	テノビル +エムトリシジン (300mg+200mg)	錠 1日1回 (¥115,938)	なし	腎機能障害、腹部膨満感、 皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
デシコピHT (DVY)  デシコピLT  TAF/FTCの配合剤	テノビル +アラブイナミド +エムトリシジン 【HT】 (25mg+200mg) 【LT】 (10mg+200mg)	1回1錠 1日1回 HT (¥119,745) (ノビラ、エムトリシジンと併用する場合は【LT】) LT (¥83,615)	なし	腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*


*HBVに対する効果が認められている


非核酸系逆転写酵素阻害薬 (NNRTI)				
エジュラント (RPV) 	リルビビル (25mg)	1回1錠 1日1回 (¥64,434)	食後	頭痛、嘔気、眠気、不眠症、浮動性めまい
ピフェルトロ (DOR) 	ドレビル (100mg)	1回1錠 1日1回 (¥64,434)	なし	頭痛、嘔気、浮動性めまい

非核酸系逆転写酵素阻害薬+核酸系逆転写酵素阻害薬*				
オデフシ (ODF)  RPV/TAF/FTCの配合剤	リルビビル +テノビル +アラブイナミド +エムトリシジン (25mg+25mg+ 200mg)	1回1錠 1日1回 (¥184,647)	食後	腹部膨満感、皮膚変色、 頭痛、嘔気、不眠症、 浮動性めまい 中止によるB型慢性肝炎の悪化*

CCR5阻害剤				
シーエルセントリ (MVC) 	マレビル 150mg	1回2錠 1日2回 (¥283,452) 強力なCYP3A4阻害剤を 併用する場合 1回1錠 1日2回 強力なCYP3A4誘導剤を 併用する場合 1回4錠 1日2回	なし	疲労、発疹、浮動性めまい

インテグラーゼ阻害薬 (INSTI)				
アイセントレス600mg (RAL)  アイセントレス400mg 	ラテグザビル (600mg, 400mg)	【600mg】 1回2錠 1日1回 (¥94,944) 【400mg】 1回1錠 1日2回 (¥94,944)	なし	頭痛、掻痒感
デビケイ (DTG) 	ドルガザビル (50mg)	1回1錠 1日1回 (¥98,469) (インテグラーゼ阻害薬に 対する耐性を有する場合 1回1錠 1日2回)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠

インテグラーゼ阻害薬+核酸系逆転写酵素阻害薬*				
ガンボイヤ (GEN)  EVG/COBI/FTC/TAFの配合剤	エルビテグザビル +コビシタット +エムトリシジン +テノビル +アラブイナミド (150mg+150mg+ 200mg+10mg)	1回1錠 1日1回 (¥211,215)	食後	腹部膨満感、皮膚変色、 悪心、下痢、異夢、頭痛 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
トリメク (TRI)  DTG/ABC/3TCの配合剤	ドルガザビル+アバ ビル+ラミブジン (50mg+600mg+ 300mg)	1回1錠 1日1回 (¥211,305)	なし	発疹、過敏症、 悪心、下痢、頭痛、不眠 過敏症の発現により本剤の投与を中止 した患者への再投与不可 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
ビクトルビ (BVY)  BIC/FTC/TAFの配合剤	ビクテグザビル +エムトリシジン +テノビル +アラブイナミド (50mg+ 200mg+25mg)	1回1錠 1日1回 (¥212,823)	なし	腹部膨満感、皮膚変色、 悪心、下痢、頭痛 中止によるB型慢性肝炎の悪化*

プロテアーゼ阻害薬 (PI)				
プレジコピックス (PCX)  DRV/COBIの配合剤	ダルガザビル +コビシタット (800mg+150mg)	1回1錠 1日1回 (¥61,197)	食後	頭痛、下痢、発疹、嘔気、 リボジストロフィー

プロテアーゼ阻害+核酸系逆転写酵素阻害薬*				
シムツェザ (SMT)  DRV/COBI/TAF/FTCの配合剤	ダルガザビル +コビシタット +テノビル +アラブイナミド +エムトリシジン (800mg+150mg+ 10mg+200mg)	1回1錠 1日1回 (¥145,170)	食後	腹部膨満感、皮膚変色、 頭痛、下痢、発疹、嘔気、 リボジストロフィー 中止によるB型慢性肝炎の悪化*

錠剤はほぼ原寸大 ★ 1日1回1錠でよい配合剤

初回治療として最も推奨される組み合わせ		商品名・略名・服薬イメージ	一般名 (含有量)	用法・用量 (30日分薬価)	食事の影響	主な副作用と注意事項
INSTI+NRTI	ABC/3TC	トリメク (TRI)  DTG/ABC/3TCの配合剤	ドルゲラビル50mg+アバカビル600mg+ラミブジン300mg	1回1錠 1日1回 (¥211,215)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠 発疹、過敏症 過敏症の発現により本剤の投与を中止した患者への再投与不可 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
		ビクタリビ (BVV)  BIC/FTC/TAFの配合剤	ビクタリビ50mg+イマトリキサド300mg+テノホビルアラファミド25mg	1回1錠 1日1回 (¥212,823)	なし	悪心、下痢、頭痛 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
	TAF/FTC	アイセントレス600mg (RAL) +デシコピHT (DVY)   	ラテグラービル600mg × 2 + イマトリキサド200mg + テノホビルアラファミド25mg	【600mg】1回2錠 1日1回 (¥94,944) 【400mg】1回1錠 1日2回 (¥94,944)	なし	頭痛、掻痒感 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
		アイセントレス400mg +デシコピHT (DVY)   	ラテグラービル400mg × 2 + イマトリキサド200mg + テノホビルアラファミド25mg	1回1錠1日1回 HT (¥119,745)		
		テビケイ (DTG) + デシコピHT (DVY)  	ドルゲラビル50mg+イマトリキサド200mg+テノホビルアラファミド25mg	1回1錠 1日1回 (¥98,469) + 1回1錠 1日1回 HT (¥119,745)		
NRTI+NRTI	オデフシ (ODF)  RPV/TAF/FTCの配合剤	リルビリン25mg+テノホビルアラファミド25mg+イマトリキサド200mg	1回1錠 1日1回 (¥184,647)	食後	頭痛、嘔気、眠気、不眠症、浮動性めまい 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*	
PI+NRTI	シムツァ (SMT)  DRV/COBI/TAF/FTCの配合剤	ダルガビル800mg+ビシナタクト150mg+テノホビルアラファミド10mg+イマトリキサド200mg	1回1錠 (SMT) または 1回2錠 (PCX+DVY) 1日1回 (¥145,170)	食後	頭痛、下痢、発疹、嘔気、 リポジストロフィー 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*	
	プレジコピックス (PCX) + デシコピHT  					

* : HBVに対する効果が認められている

その他の推奨される組み合わせ		商品名・略名・服薬イメージ	一般名 (含有量)	用法・用量 (30日分薬価)	食事の影響	主な副作用と注意事項
INSTI+NRTI	3TC	ドウベイト  DTG/3TCの配合剤	ドルゲラビル50mg+ラミブジン300mg	1回1錠 1日1回 (¥144,249)	なし	悪心、下痢、頭痛、不眠 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
		ゲンボイヤ (GEN)  EVG/COBI/FTC/TAFの配合剤	イルビテグラービル150mg+ビシナタクト150mg+イマトリキサド200mg+テノホビルアラファミド10mg	1回1錠 1日1回 (¥211,215)	食後	悪心、下痢、異夢、頭痛 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*
NRTI+NRTI	TAF/FTC	ピフェルトロ (DOR) + デシコピHT  	ドレリン100mg+テノホビルアラファミド25mg+イマトリキサド200mg	1回1錠 1日1回 (¥64,434) + 1回1錠 1日1回 HT (¥119,745)	なし	頭痛、嘔気、浮動性めまい 腹部膨満感、皮膚変色 中止によるB型慢性肝炎の悪化*

* : HBVに対する効果が認められている

その他 (NRTIを含まない組み合わせ)		商品名・略名・服薬イメージ	一般名 (含有量)	用法・用量 (30日分薬価)	食事の影響	主な副作用と注意事項
NRTI+INSTI		ジャルカ  RPV/DTGの配合剤	リルビリン25mg+ドルゲラビル50mg	1回1錠 1日1回 (¥162,900)	食後	悪心、下痢、頭痛、嘔気、 不眠、浮動性めまい

錠剤はほぼ原寸大